

女三

六科準繩



女科準繩卷三

金壇王肯堂輯 瘦樵程永培校

雜證門下

痰飲

〔大〕婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於胸膈所成也人皆有痰少者不能為妨多者成患但胸膈

有痰飲停於胸中則令眼昏亦令頭眩頭痛者 藥隱老人評曰夫痰之為害多因外感五邪五邪者寒

也內傷七氣七氣者喜怒憂思驚恐患也

因五邪而得者得風為風痰得寒為寒痰得暑為暑痰因七氣所傷多因婦

人情性執著不能容忍而有此證豈特祇因風冷而成哉所以外感五邪內傷七氣則一身之中血液混

汗涕唾身中濕者敗濁變而成痰乘間而為害也經云清則運為精華濁則凝為痰飲此之謂也然有痰

涎飲沫四種相類宜子細詳辨調治因風而生痰者宜服三生飲

卒中暴厥

星香飲

雜病中風

痰丸雜病痰飲因寒冷而得者宜服降氣湯

雜病氣

黑錫丹

雜病頭痛

養正丹

頭目眩暈

因熱而得者宜服金沸草散雜病咳嗽

柴胡半夏湯

本條

因暑而得者消暑丸

雜病傷暑

因氣滯不調鬱結而成者宜服參蘇飲

雜病發熱

四七湯雜病氣

陳湯

雜病痰飲

痰在上者以瓜蒂散吐之在下者以控涎丹臂痛利之雖曰可吐可下亦要觀人之盛衰察脈之

虛實方可投之切記不可猛吐暴下所以初虞世有金虎碧霞之戒也〔薛〕前證若肝經悲怒用小柴

胡湯傷寒少陽肝經風熱用釣藤散頭目眩暈肝腎氣虛用川芎散眩暈脾經鬱結用濟生歸脾湯雜病健忘鬱怒傷肝脾

用加味逍遙散調經脾虛痰逆用白朮半夏天麻湯雜病眩暈脾氣虛弱用六君子益氣湯肺氣鬱滯用三陳雜病

痰飲貝母桔梗陰虧水泛用六味地黃丸雜病虛勞腎虛陰火加減八味丸雜病虛勞腎虛火不歸源八味丸雜病虛勞仍

與前證互相用之一婦人內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下或用化痰理氣藥前證益盛肢體或麻又用

祛風化痰藥肢體常麻手足或冷或熱此脾土不能生肺金也余用補中益氣湯加茯苓半夏炮薑二十

餘劑漸愈又用加味逍遙散三十餘劑全愈後因怒吐痰胸痞或用清氣化痰丸食少痰甚胸膈脹滿脈

或浮大或微細余以六君信用參朮少加木香而康一婦人咳嗽脇痛或用清肺化痰降火等劑久不

愈更加內熱晡熱若兩脇或小腹內熱其咳益甚小便自遺余曰此屬肝經血虛火動用六味丸加五味

子滋腎水以生肝血用補中益氣生脾土以滋肺金後尋愈

旋覆花湯治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶

旋覆花

枇杷葉去毛炙

川芎

細辛去苗

薑黃 藿香 熟地 歸身 白朮 茯苓 芍藥 甘草 大棗 蜂蜜

桂枝心卷三

枳殼去瓢炒

前胡去蘆

人參去蘆

半夏薑製各半兩

甘草

炙

羚羊角屑

赤茯苓

各七錢
半去皮

羌活

去蘆
半兩

右吹咀每服五錢水一盞半生

薑五片煎至一大盞去滓溫服食遠日進二服

天南星丸

治婦人風痰心膈壅滯

天南星

薑製

白附子

炮

皂角仁

炒黃

半夏麴

各一兩

白礬

枯五錢

右為細末酒

煮麵糊丸如梧子大每服二十丸煎生薑薄荷湯送下食後臨臥日進二服

大半夏湯

治痰飲脾胃不和咳嗽嘔吐飲食不入

半夏

白茯苓

生薑

各二錢

右薑水煎服胃痞加陳皮四七湯亦善

導痰湯

治痰涎壅胸膈痞塞或咳嗽惡心飲食少思

半夏

二錢

南星

枳實

麩炒

茯苓

橘紅

一錢

甘草

五分

右用薑十片水煎服

瓜蒂散

療病痰胸膈痞塞頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞鞭氣衝喉咽不得息者此為胸中有痰也

當吐之宜此法

柴胡半夏湯

治痰熱頭痛利膈除煩悶手足煩熱榮衛不調肢節拘倦身體疼痛嗜臥少力飲食無味

女科準繩

卷三

痰飲

咳嗽

三



上海中医药大学图书馆

兼治五嗽痰癖

柴胡 八錢

半夏 二兩半

人參 法蘆

甘草

黃芩

麥門冬 各二兩

白朮 二兩

右咬咀每服五錢水一盞半薑五片棗一枚煎至八分去滓服

咳嗽

〔大〕婦人咳嗽者由肌體虛外受於寒熱風濕所得也肺爲四臟之華蓋內統諸臟之氣外合於皮毛若爲寒熱風濕所傷邪氣自皮毛而入於肺中外皆傷故令咳也大抵治咳不可一槩治當以脈息辨之其脈浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澀者起於寒風者散之濕者燥之熱者涼之寒者溫之虛者補之未有不妥者也〔薛〕丹溪云春是木氣上升夏是火氣炎上秋是濕熱傷肺冬是風寒外來當發散行痰開腠理用二陳湯加麻黃桔梗杏仁痰飲隨證加藥勞嗽宜四物加竹瀝薑汁乾咳嗽難治此證乃痰鬱火邪也用苦梗開之夏用補陰降火不已則成勞上半年日多嗽者胃火也用貝母石膏午後嗽者陰虛也用四物加炒黑黃蘗知母黃昏嗽者火氣浮於肺也用五味子五倍子五更嗽者飲食之火流於肺也以貝母軟石膏肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血氣滯而病宜養血疎肝清痰用四物加桃仁訶子青皮竹瀝之類嗽而脇下痛宜疎肝氣以青皮挾痰實者白芥子之類血礙氣

作嗽者桃仁大黃薑汁丸服治嗽多用生薑以其辛散故也痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰以知

母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用清陰分之劑若嗽多用粟殼不必疑但要治病根此乃收後藥也竊謂前

證午前嗽屬胃火盛用竹葉石膏湯傷寒差後病胃氣虛用補中益氣雜病傷勞倦加炒山梔午後嗽屬陰血虛用

四物黃槩知母二味酒拌炒黑腎水虛用六味地黃丸雜病虛勞黃昏嗽用四物五味麥門并前丸五更嗽用六君子

雜病虛勞不得眠及兩脇下痛用六味地黃補中益氣若因氣虛腠理不密六淫所浸當祛外邪而實脾土若

因心火太過當伐肝木而滋肺金若肺金氣虛當補脾土而生肺氣若因腎水虧損虛火炎上當補肺腎

以滋化源大抵風邪胃火此實熱為患易治惟肺腎虧損此真臟為患最難調治 一婦人素勤苦冬初

咳嗽發熱吐血盜汗通身作痛或寒熱往來用化痰降火之藥口噤筋攣此血本虛而藥復損之耳余用

八味丸雜病虛勞為主佐以補中益氣麥門五味山藥年餘而愈 一婦人咳嗽發熱嘔吐痰涎日夜約五六

碗喘咳胸痞燥渴不食崩血如涌此脾土虛寒用八味丸及附子理中湯雜病中寒而愈 一婦人不得於姑

患嗽胸膈不利飲食無味此脾肺俱傷痰鬱於中也先用歸脾湯雜病健忘加山梔撫芎貝母桔硬諸證漸愈

後以六君加芎歸桔梗間服全愈 一婦人咳嗽早間吐痰甚多夜間喘急不寐余謂早間多痰乃脾虛

飲食所化夜間喘急乃肺虛陰火上衝用補中益氣加麥門五味而愈 一婦人患咳嗽脇痛發熱日晡

女 科 準 繩 卷三 咳嗽 三

益甚余曰此肝脾虛熱而傷肺也用加味道遙散

調經

加熟地黃治之而愈後因怒氣勞役前證仍作兼太

陽痛或寒熱往來或咳嗽遺尿此肺氣虛而尿脬失制也仍用前散及地黃丸而瘥

一婦人久咳嗽面

色痿黃或時眇眇肢體倦怠飲食少思稍多則瀉此脾土虛而不能生肺

金朝用補中益氣湯多用云君

子湯爲主間佐以八珍湯

雜病虛勞

三月餘漸愈後感寒邪喘嗽胸腹作脹飲食不入四肢逆冷此中氣尙虛

不能充皮毛肥腠理司開闔之所致也遂用大君加生薑桔梗而愈

初虞世曰經曰微寒爲嗽寒甚爲腸癖古人立方治嗽未有不本於溫藥如乾薑桂心細辛之屬以寒氣

入裏非辛甘不能發散以此準之未有不因寒而嗽也又曰熱在上焦因欬爲肺痿又實則爲肺癰虛則

爲肺痿此人其始或血不足或酒色滋味太過或因服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受邪脈數發熱咳

嗽膿血病至於此亦已危矣古人立方亦用溫藥如建中之屬今人但見寒熱咳嗽率用柴胡鱉甲門冬

葶藶等藥旋踵受弊而不知非可爲深戒就使不可進以溫藥亦須妙以湯丸委曲調治無爲鹵莽致傷

人命〔薛〕丹溪云陰分嗽者多屬陰虛肺脹不得眠者難治肺痿專主補氣養血清金肺氣有餘者宜

瀉之以桑白皮爲主半夏茯苓佐之瀉其有餘補其不足肺燥者當潤之屬熱者大力子桔梗知母雞子

清聲啞者屬寒也細辛半夏生薑肺虛者人參阿膠爲主陰不足者六味地黃爲要藥或知母茯苓湯

陰虛氣喘四物加陳皮甘草以降其氣補其陰竊謂前證嗽而鼻塞聲重風邪傷肺也用參蘇飲雜病發熱面

赤喘嗽火尅肺也人參平肺散雜病喘寒熱交作肝氣不和也四君加知母柴胡桔梗咳嗽短氣肺虛也人

參補肺湯喘滿體倦少食脾虛也參朮補脾湯本條口乾咽燥虛火上炎也六味丸大凡發熱喘嗽或咳唾膿

血飲食不入急補脾肺滋腎水多有得生者脈浮大而面色赤者皆難治脈浮短澀者可療

經曰感於寒微則爲咳甚則爲泄蓋肺主氣合於皮毛邪傷皮毛則咳爲肺病傳於各臟以時受邪肺爲

嫩臟邪易傷而難治其嗽有肺心脾腎肝風寒支飲膽之十種亦有勞嗽者華陀謂之邪嗽孫真人謂之

注嗽此因酒色過度勞傷肺經重者咯唾膿血輕者時發時瘥或先嘔血而後嗽或先咳嗽而吐血此又

挾邪傳注孫真人用通氣丸夢與鬼交用四滿丸蛤蚧以及桃柳枝安息香之類若肺中有蟲入喉痒嗽

須以藥含化其蟲卽死而嗽亦止薛仲景先生云咳而兩脇痛不能轉側兩脇滿屬於肝臟用小柴

胡湯咳而嘔苦水屬膽腑黃芩半夏生薑湯咳而喉中如梗狀甚則咽腫喉閉屬心臟桔梗湯咳而大便

失氣屬小腸腑芍藥甘草湯咳而右脇痛陰引肩背甚則不可動動則咳劇屬脾臟升麻湯咳而嘔嘔甚

則出長蟲屬胃腑烏梅丸咳而喘息有聲甚則唾血屬肺臟升麻湯咳而失尿屬大腸腑麻黃附子細辛

湯咳而遺溺屬膀胱茯苓半夏湯咳而不止三焦受之其狀腹滿不食涕唾面目浮腫氣逆異功散用之

對證其效如神 一婦人患前證晡熱內熱寒熱往來作渴盜汗小便頻數其經兩三月一行此肝脾氣血虛損用八珍湯六味丸六十餘劑諸證漸愈其經兩月一行仍用前二藥間以加味逍遙散各三十餘劑後患怒適經行去血過多諸證悉至飲食少思腹脹氣促用十全大補湯數劑漸愈仍用前藥調補漸安復因喪子胸腹不利食少內熱盜汗便血無寐用加味歸脾湯仍兼前藥而愈 一婦人患前證不時發熱或時寒熱或用清熱之劑其熱益甚盜汗口乾兩足如炙遍身皆熱昏憤如醉良久熱止方甦或晡熱至旦方止此陰血虛而陽氣弱也余朝用六味丸料夕用十全大補湯月餘諸證稍愈更兼以補中益氣湯兩月餘而愈

黃耆散 治虛中有熱咳嗽膿血口苦咽乾

黃耆 四兩

甘草 二兩

右爲細末湯點一二錢服日三服 一方甘草一兩黃耆六兩名黃

耆六一湯只咬咀水煎服

蛤蚧丸 治婦人咳嗽不止漸成勞氣

蛤蚧 一對 酥炙

紫苑

款冬花

鼈甲 炙

貝母 心法

皂角子仁 炒各 一兩

杏仁 炒去皮尖 一兩半

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸淡薑湯吞下

含化丹 昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞服此安

寇宗奭方

枇杷葉 去毛

桑白皮

款冬花

木通

紫苑

杏仁 各等分

大黃 減半

右爲細末煉蜜丸如櫻桃大食後夜臥含化一丸

貝母湯

本

治諸嗽久不瘥

貝母 生薑汁浸半日

北五味子

黃芩

乾薑 熟者減半

陳皮 各一兩

半夏

桑白皮

桂心

北柴胡 各半兩熟者加一半 木香

甘草 各二錢半

右爲粗末每服五錢水一盞半杏仁七枚去皮尖碎之生薑二片煎七分去滓熱服

黃師文云戊申冬有姓蔣者其妻積年嗽製此方授之一投而瘥以此治諸嗽皆愈

定喘湯 治丈夫婦人遠年近日肺氣咳嗽上氣喘急喉中涎聲胸滿氣逆坐臥不安飲食不下及治肺

感寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

半夏 麴炒

阿膠 炒

甘草 各錢半

鴛粟殼 製半兩

北五味子

桑白皮

麻黃 去節

人參 各二錢半

右咬咀每服三大錢薑三片烏梅半個水一盞半

煎至七分去滓漸溫服食後臨臥日二服方同和劑分兩加減不同有效



補肺湯 治證同前 滄州李官人宅 又名清金湯

鶯粟殼 製二兩

人參

粉草 各半兩

陳皮

茯苓

杏仁 製

白朮

明阿膠 炒

北五味子

桑白皮

薏苡仁

紫蘇莖 各一兩

右咬咀爲末每服三大錢水盞半薑三片棗二枚烏梅半個煎至

一盞臨臥溫服 更加百合貝母 去心半夏麴欬冬花各一兩 服之良驗

金不換散 治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿悶咳嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽睡

紅痰及遠年近日一切喘嗽諸藥不效者並治之

鶯粟殼 半兩製

杏仁 製

甘草 各三錢

枳殼 四錢

右咬咀每服三錢水一盞半薑

三片烏梅半個煎至八分食後臨臥漸漸熱服

許元林先生方乙卯年七月僕嘗治一婦人咳嗽不已服諸藥無效漸成癆瘵求予診之六脈濡弱以

愚考之此是血弱又因憂感太過而成斯疾合用當歸等藥治之必愈遂先用古今錄驗橘皮湯空心

服蘇子降氣湯徐用金釵煎熟地黃丸當歸丸調理得安 又治一婦人時行感熱咳嗽遂用小柴胡

湯去人參薑棗只加北五味子煎服愈



古今錄驗橘皮湯 療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中作聲上氣不得下頭痛諸證

陳橘皮

紫苑

麻黃 去根

杏仁 製

當歸

桂心

甘草

黃芩 各等分

右咬咀每服五錢水盞半煎至一盞去滓熱服

深師四滿丸 治上氣嗽飲嗽燥嗽冷嗽邪嗽謂之五嗽

乾薑 炮

桂心

躑躅花

芎藭

紫苑 各二兩

芫花根皮 五錢

蜈蚣 一條去頭足炙

細辛

甘草 炙

鬼督郵

人參

半夏 湯洗各一兩

右為末煉蜜丸大豆許每服五丸米飲下日三服未應加至七丸

丸

團魚丸 治骨蒸勞嗽累效

貝母

前胡

知母

杏仁

柴胡 各等分

生團魚 二個

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾為末用骨更煮汁一盞和藥丸梧子大

每服二十丸煎黃耆六一湯空心送下病既安仍服黃耆六一湯調理

參朮調中湯 瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食

黃耆 四分

桑白皮 五分

人參

炙甘草

青皮

白茯苓 各三分

五味子 各五分

白朮 二分

地骨皮

麥門冬

陳皮 各五分

右水煎服

噦化丸 自製方

清肺止嗽定喘化痰

薄荷葉 四兩

桑白皮

天門冬 去心

麥門冬 去心

知母 去毛

百部

貝母 去心

柿霜 各二兩

枇杷葉 去毛蜜炙

訶子肉

阿膠

橘紅

紫苑

款冬花 各一兩半

括蕢仁 去油

括蕢皮瓢

黃芩

杏仁 炒去皮尖油取淨霜

白茯苓

元明粉

鉛白霜

桔梗 各一兩

旋復花

馬兜鈴

五味子 各七錢半

硼砂 五分

冰片 一錢非真者勿用

右爲極細末梨膏爲丸如無梨膏則以白蜜竹瀝梨汁熬至滴

水不散爲度丸如龍眼大噦化一丸

參耆補脾湯 治肺證因脾氣虛弱咳唾膿涎中滿不食兼服此藥以補脾土生肺金

人參

白朮 各二錢

黃芩 各二錢半

茯苓

當歸



陳皮各一錢

升麻三分

五味子四分

炙甘草五分

右薑水煎服

喘滿

岐伯曰夜行則喘出於腎淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨當是之時勇者氣行則已怯者則著而為病也原疾之由皆本於肺與氣然感外邪則有太陽證脈浮無汗血喘者宜麻黃湯陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜承氣湯若表邪未解誤服下利藥利遂不止脈促喘而汗出者宜葛根黃芩黃連湯若微喘者桂枝厚朴杏子湯汗出而喘若無大熱者宜麻黃杏子甘草石膏湯若表邪未解心下停水發熱而喘或嘔者小青龍湯去麻黃加杏仁主之若陰證喘促者四肢逆冷脈息沉細或寸大尺小或六脈促疾或心下脹滿結鞭若冷汗自出或大便頻數上氣喘促或咽喉不利者此是本氣極虛內外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復而愈宜返陰丹主之以上諸方並見傷寒準繩大槩諸臟相乘而喘者用杏子散本條如感寒伏熱而喘者用華蓋散雜病九寶湯雜病若暴寒合火覆衣被過當傷熱肺實而喘促者其狀多有熱證宜洗心散雜病冷水調服若因氣宇不調痰盛喘促者宜四七湯雜病兼官局桔梗湯雜病薑煎服若涎多而喘者宜千縉湯雜病橘皮半夏湯本條若不得臥臥即喘者此由水氣逆行上乘於肺肺得水則浮而開使氣不得通流其脈沉大宜神祕

湯雜病喘

肺之積名曰息責在右脇下大如杯令人灑淅寒熱喘咳發癰疽宜棗膏丸本條若上氣喘者用肺

授湯本條

上盛下弱而喘促者宜用蘇子降氣湯雜病氣吞黑錫丹雜病頭痛尊年之人素來稟賦太厚不任熱藥

者不可輕投丹劑及諸熱藥但以祕傳降氣湯分心氣飲俱雜病氣論之梗槩不出於此矣惟素有脚氣而喘

者當作脚氣治之又有骨蒸勞喘自有專門不敢濫及〔薛〕東垣云肺金受邪由脾胃虛弱不能生肺

乃所生受病故咳嗽氣短氣上皮毛不能禦寒精神少而渴情慘不樂皆陽氣不足陰氣有餘也治法若

肺氣虛弱用四君子雜病虛勞

加枳殼半夏脾虛不能生肺補中益氣湯雜病勞倦七情氣結四七湯雜病氣脾經

結歸脾湯雜病健忘

脾氣虛弱人參補肺散肺經火盛人參平肺散腎水敗濁六味地黃丸雜病虛勞真陽虛損八

味丸虛勞

或兼小便利為害尤速非二丸不能救一婦人傷風寒作喘或用表散愈而復患仍用前藥

其證益甚飲食少思胸腹不利此因脾肺氣虛也予先用六君子湯加桔梗漸愈又用補中益氣湯而痊

一婦人患前證屬命門火虛不能生脾土用補中益氣湯八味地黃丸而痊後復患其喘益甚用前藥

不應遂用黑錫丹二服喘止仍用前二藥而諸證痊凡屬邪氣有餘者其證易識治效亦速其屬元氣不

足者變證不一效非可以旦夕期也

杏子散 治諸臟相乘喘急

杏仁

去皮尖雙仁麩炒黃細研如膏

右和勻煎橘皮湯調下二錢無時

橘皮半夏湯

和劑

治肺胃虛弱好食酸冷寒痰停積嘔逆惡心涎唾稠黏或積吐粥藥不下手足逆冷目

眩身重又治傷寒時氣欲吐不吐欲嘔不嘔昏憤悶亂或飲酒過多中寒停飲喉中涎聲乾噦不止

陳皮

去白

半夏

製各七兩

右剉爲粗散每服三錢生薑三片水二盞煎至一中盞去滓溫服不

計時留兩服滓併一服再煎服

棗膏丸

治息責在右脇下大如杯令人灑淅寒熱喘咳

甜葶藶

炒研

陳皮

苦梗

各等分

右爲末煮棗肉丸桐子大每服數丸白湯下許學

士云余常停飲水積食已必噎漸喘覺肺系急服此良驗

神授湯 治上氣喘急不得臥

橘紅

苦梗

紫蘇

人參

各一錢

五味子

杵炒二分

右薑水煎

服

治婦人喘促虛腫快利小便卽瘥

用生薑二兩取汁白麵三兩以薑汁搜作小劑大半夏十個打研入麵中作餅炙熟作黃色爲末溫熱



水調下一錢以小便通利爲度

天門冬丸

楊氏家傳

治婦人喘手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲面浮腫

天門冬

十兩去心秤

麥門冬

去心八兩

生地黄

三斤取汁熬膏

右二味爲末入地黄膏和丸如梧桐子大每

服五十丸逍遙散中去甘草加人參煎湯送下或服王氏博濟方中人參荊芥散亦可如面腫不已經

曰面腫曰風故宜汗麻黃桂枝可發其汗後服柴胡飲子去大黃故論曰治臟者治其俞治腑者治其

合浮腫治其經治俞者治其土也治合者亦治其土也如兵家圍魏救趙之法也

人參補肺湯 治肺癰腎水不足虛火上炎咳嗽膿血發熱作渴小便不調

人參

黃耆

炒

白朮

茯苓

陳皮

當歸

各一錢

山茱萸

去核

山藥

各二錢

五味子

杵

麥門冬

去心

甘草

炙各七錢

熟地黄

自製一錢五分

牡丹皮

一錢

右薑水煎服

人參平肺散 治心火剋肺金患肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽膈不利

人參

青皮

茯苓

天門冬

陳皮

地骨皮

各一錢

甘草

炙五分

知母

七分

五味子

十粒杵

桑白皮

炒一錢

右薑水煎

