

外科理例

上海千頃堂印行

未 1

34

共 4 册



外科理例

汪石山著

許半龍題



南京中医药大学图书馆版权所有

干頃堂書局商標



外科理例前序

外科者以其癰疽瘡瘍皆見於外故以外科名之然外科必本於內知乎內
求乎外其如視諸掌乎經曰膏粱之變足生大丁由膏粱蘊毒於內而生也又
曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫是癰腫由榮氣逆於肉理之內而生也有諸
中然後形諸外治外遺內所謂不揣其本而齊其末殆必已誤于人己尚不知
人誤于己人亦不悟嗚呼己雖不知天必知之人雖不悟神必識之異日明受
天責陰獲神譴不在于身則在于子孫矣予于是懼因輯此書名曰外科理例
蓋其中古人所論治無非理也學者誠倣其例而推廣之于焉而求古人不
言之妙旨庶幾小不悞己大不悞人抑亦有補於將來矣輯已成編復得新甫薛
先生心法發揮讀之觀其論治亦皆一本于理而予竊喜暗與之合于是復采
其說參于其中庶得以為全書而學者無復有遺憾矣是為序

嘉靖辛卯冬十一月長至日祁門汪機識

外科理例序

夫天下之事莫不有理然有正有偏有常有變不可以槩視也譬之兵馬聲罪致討者正也潛師掠境者變也常則按圖布陣而守據隱憑高之法變則殲顯出沒而有鬼神不測之機夫醫之道亦猶是焉故望氣聽聲審症切脉乃醫理之正軌方治病依分處劑乃醫學之偏按脉辨症審時製方分經絡別表裏此醫之處乎常也或憑脉而不憑症或憑症而不憑脉或因情性而處方或因形質而用藥此醫之達乎變也然正可守而偏可矯常可學而變難窮醫豈可易言哉何世之業外科者惟視外之形症瘡之腫潰而不察其脉理虛實之殊經絡表裏之異欲其萬全而無悞也難矣先生深為之惜故輯此書名曰外科理例蓋以其正偏常變之用各有其例而莫不同歸于一理學者誠能因是而求其未盡之旨擴其未能之妙知其臨病用藥必求諸理而不至猛治以殺人矣此先生作書之意也

嘉靖丁酉孟春朔旦

新安祁門石墅陳楠書

外科理例目錄

卷之一

一 癰疽脉

二 七惡五善

三 五逆

四 疽死地分

五 背上九處正面五處側面三處不可患癰

六 癰發有不可治

七 發背治之難易

八 占色候生死

九 癰之源有五

十 生癰所感不同

十一 肺肝腎癰症

十二 癰生原于藏府

十三 辨藏府內瘡

十四 明瘡瘍本末

十五 論陰滯陽滯

十六 癰疽分三治

十七 瘡腫分淺深

十八 癰與疽治法

十九 瘡名有三

十九 辨癰疽癰癰

二十 辨癰

二十一 瘡疽分虛實用藥

二十二 治瘡須分補瀉



二 男女癰疽治法不同

六 癰疽當分經絡

八 內托

十 潰瘍

十二 瘡瘍作渴

十四 瘡瘍寒熱用藥法

十六 論瘡瘍發寒熱或汗

十八 瘡瘍食肉

二十 潰瘡論

二十二 論惡肉

二十四 生肌止痛

二十六 附子餅 豆豉餅

二十八 灸法論

三十 灸刺分經絡論

一 小兒瘡疽

二 論內消

三 腫瘍

四 外施貼藥

五 嘔逆

六 瘡瘍面赤不得下

七 疽疾咽喉口舌生瘡

八 論氣血喜香惡臭

九 癰疽膿成十死一生

十 論蝕膿

十一 論瘻併治法

十二 隔蒜灸

十三 竹馬灸

十四 針法總論



五 二 螞針

五 四 槐花酒

卷之二

五 十六 味流氣飲

八 五 內托散

十 六 獨聖散

二 六 阿膠飲子

四 六 飛龍奪命丹

六 六 五香湯

八 六 論大黃

十 七 草麻子

皂角子 膏 麥飯石 膏 神異

二 七 論敗毒散流氣飲

四 七 汗之則瘡已

六 七 論痛

三 五 金銀花酒

五 五 八味丸治驗

七 五 十宣散

九 五 神仙追毒丸

一 六 柞木飲子

三 六 味車螯散

五 六 加味十全湯

七 六 防風通聖散

九 六 白蠟

一 七 論流氣十宣散

三 七 蠟礬丸

五 七 論須針法

七 七 論癰疽虛實



北京中醫藥大學圖書館藏

八七論附骨疽

九七論瘡疽所致之由

十論癰可治不可治

一八腫瘍

二潰瘍

三八潰瘍作痛

四潰瘍發熱

附五論寒熱

六七情所傷

七論精血

八論水腫

八論婦人病

九論婦人熱勞

一自汗忌利小便

二論下血

三論血崩

四論治病不可責效太速

五論寡婦病

六論痿與柔風脚氣相類

七論病犯不治

八論脚氣

九論表虛及小便多少

附肺癰肺痿

卷之二

百頭面赤腫

附升麻牛旁子散
耳面腮頰腫痛

中和湯



一百 瘰癧

二百 流注

三百 懸癰

四百 囊癰 附婦人隱內瘡

五百 下疳

卷之四

六百 便毒

七百 乳癰 附無乳男子乳癰

八百 腹癰

九百 疔瘡

十百 痔漏

一 鬚瘡

二 脇疽

三 胸瘍

四 腦疽

卷之五

五 臂疽

六 背疽

七 臂癰 附腿跳痛 腿癰 脚跟脚

八 腰疽

卷之六

九 脫疽

十 面瘡 附順毒



北京中医药大学图书馆藏

一 口齒

二 咽喉

三 諸哽

四 跌撲 附墜馬壓研

五 火瘡

六 卷之七

七 天庖瘡

八 班疹 附小兒丹毒

九 肺癰肺痿

十 腦疳

十一 蛔疳

十二 腎疳

十三 惡節風

十四 諸蟲傷

一 口舌瘡

二 附楊梅瘡咽痛

三 傷損脉法 附破傷風

四 杖瘡血熱作痛

五 漆瘡

六 楊梅瘡 有從咽喉患起者見咽喉門

七 腸癰

八 胃脫癰

九 肺疳

十 脊疳

十一 鬼擊

十二 瘡疥

十三 吞水蛭



六 蟲入耳

補遺

八 癰瘡

十 發背欲死

二 乳硬欲結膿

四 刀傷磕損血不止

七 血風瘡

附陰瘡 附陰腫 附參飯石膏

九 發背及癰毒

一 石癰堅如石不作膿者

三 癰瘡欲愈必瘡又治腎藏濕瘡



外科理例卷之一

新安祁門朴里汪 機省之編輯

同邑石墅門生陳 楠惟宜較正

瘡疽脉一

浮 主表症浮數之脉應發熱不發熱反惡寒癰疽也

洪 主血實積熱腫瘍洪大則瘡勢進膿未成宜下潰膿後洪大難治若自利

不可救

滑 主熱主虛膿未潰者宜內消膿潰後宜托裡所謂始為熱終為虛也

數 主熱仲景曰數脉不時見生惡瘡又曰肺脉俱數則生瘡諸瘡脉洪數裏

欲有膿結也

散 膿潰後煩滿尚未全退其脉洪滑麓散難治以正氣虛邪氣實也又曰肢

體沉重肺脉大則斃謂浮散也

芤 主血虛膿潰後見之易治

牢 按之實大而弦且沉且浮而有堅實之意瘰癧結核得之不可內消



實 久病虛人得此最忌瘡疽得此宜急下之以邪氣與臟腑俱實故也

弦 浮弦不時見為飲為痛主寒主虛弦洪相搏外緊內熱欲發瘡疽

緊 主痛瘡腫得之氣血沉澹

澹 主氣澹血虛膿潰後得之無妨

短 諸病脉短難治瘡腫脉短真氣短也

細 主亡陽陽氣衰也瘡腫脉來細而沉時直者裏虛欲變症也

微 主虛真氣復者生邪氣勝者危瘡腫潰後脉微而勻當自差

遲 痼疾得之則善新病得之主血氣虛憊瘡腫潰後得之自痊

緩 瘡腫潰後其脉澹遲緩者皆易愈

沉 水氣得之則逆瘡腫得之邪氣深

虛 脉虛血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫得之宜托裡和氣養血也

奘 瘡腫得之補虛排膿托裏

弱 主氣血俱虛形精不足大抵瘡家沉遲奘弱皆宜托裡

促 主熱蓄于裏下之則和瘡腫脉促亦急下之



代 諸病見之不祥瘡腫脉促結難治況代脉乎
動 動于陽陽虛發厥動于陰陰虛發熱

治瘡脉訣

身重脉緩濕勝除濕

身熱脉大心躁熱發腫乍來乍去除熱

諸痛眩暈動

搖脉眩去風

脉濇氣滯燥渴亡津液脉濇寫氣補血

寒勝則浮食不入便溺多惡寒脉緊

細寫寒水

數脉不時見當生惡瘡

諸浮數脉應發熱反洒淅惡寒

若有痛處當發癰

疽 脉滑而數滑則為實數則為熱

滑則為榮數則為衛榮衛相逢則結

為癰熱之所過則為癰膿

機按今之瘍醫多不診脉惟視瘡形以施治法蓋瘡有表裏虛實之殊兼有
風寒暑濕之變自非脉以別之安得而察識乎東垣云瘡瘍憑脉此之謂也
因詳列其脉之所主揭之于首學者宜加意焉

七惡五善二

醫瘡舉七惡五善此特謂腸胃之內藏府瘡疽之證也發背腦疽別有善惡載之於後

七惡者煩躁時嗽腹痛渴甚或泄利無度或小便如淋一惡也 膿血既泄腫焮尤甚膿色敗臭痛不可近二惡也 目視不正黑睛緊小白睛青赤腫子上看三惡也 喘粗短氣恍惚嗜卧四惡也 肩背不便四肢沉重五惡也 不能下食服藥而嘔食不知味六惡也 聲嘶色敗唇鼻青赤面目四駁浮腫七惡也

五善者動息自寧飲食知味一善 便利調勻二善 膿潰腫消水鮮不臭三善 神彩精明語聲清亮四善 休氣平和五善

五善之中乍見一二善證瘡亦回也七惡之內忽見一二惡證宜深懼之又

有證合七惡皮緊急而知善又或證合五善皮緩虛而知惡此又在人詳審大抵虛中見惡證有不可救實證無惡候者自愈

膿潰後尚煩疼 脉洪滑粗散者難治 微瀉遲緩者易痊 諸惡瘡五逆三

白睛青黑眼小 服藥而嘔 腹痛渴甚 肩項中不便 聲嘶色脫 是為
五逆其餘熱渴利嘔蓋毒氣入裏藏府之傷也

機按已上不治皆五藏氣已絕

定癰死地分四

一痰兔 二腓腓 三背 四五藏俞 五項 六腦 七髀 八髀 九顙
背上九處不可病癰五

第一入髮際為玉枕亦為舌本 第二頸項節 第三椎為崇骨 第四大椎
為五藏 第五脊骨兩邊肺俞穴 第六夾脊兩邊脾俞及肝俞 第七脊骨
兩邊腎俞二穴 第八後心鳩尾 第九鳩尾骨穴

附 正面五處不可患癰

第一喉骨為垂膺 第二當胸為神舍 第三心鳩尾 第四當兩乳穴 第
五臍下二寸為腸屈間

附 側面三處不可患癰

耳下近耳後牙車尖夾陷中為喉脉一穴 當膊下一穴為肩骨 承山上三

