

# 和解 2. 理氣 3. 理血 4. 祛風

1. 小柴胡湯 黃連湯 黃芩湯 芍藥甘草湯 括萎薤白白酒湯 溫胆湯 逍遙散 八和湯 藿香

清脾飲 痛瀉要方 黃連阿膠丸 姜茶飲 枳實湯 陰陽水 甘草黑豆湯

2. 補中益氣湯 烏龍順氣散 蘇子降氣湯 木香順氣湯 四磨湯 越鞠丸 七氣湯 四

代諸菴養陽 丁香柿蒂湯 橘皮竹茹湯 定喘湯

3. 四物湯 當歸補血湯 歸脾湯 養心湯 人參養榮湯 龍腦雞蘇丸 欬血方 蜀聖散 清咽太平丸

還元水 麻黃人參芍藥湯 厚角地黃湯 桃仁承氣 抵當湯 槐花散 秦艽白朮丸 芍藥湯

蒼朮地榆湯 小蘗飲子 復元羌活湯

4. 小續命湯 侯氏黑散 大秦羌湯 三生飲 地黃飲子 順風勻氣散 稀薹丸 寧正丸 (改容膏)

如聖飲 獨活湯 活絡丹 消風散 清室膏 胃風湯 上中下通用痛風丸 史國公酒方 蠲痺湯

三痺湯 祛風膏生湯 沉香天麻丸 通頂散 烏梅擦牙方

## 醫方集解

卷三



北京中醫藥大學圖書館版權所有

醫方集解

和解之劑

邪在表宜汗在上宜吐在裏宜下若在半表半裏則在  
治宜和解故仲景于少陽證而以汗吐下三者爲戒也  
賢云或熱病脈躁盛而不得汗者陽脈之極也死然有當  
和解之證汗之不得汗和解之力到汗自出而解慎勿錯  
認作死證也由是觀之和解之劑用以分理陰陽調和營衛顧不重歟

小柴胡湯

半表半裏○仲景

治傷寒中風少陽證往來寒熱胸脇痞滿默默不欲食心煩

喜嘔或腹中痛或脇下痛或渴或欬或利或悸小便不利口

苦耳聾脈弦或汗後餘熱不解及春月時嗽瘧發寒熱婦人

傷寒熱入血室

寒爲陰熱爲陽裏爲陰表爲陽邪客於半表半裏陰出與陽爭陰勝則寒陽入與陰爭陽



勝則熱陽不足則先寒陰不足則先熱又曰太陽行身之後  
屬膀胱寒水爲表陽明行身之前屬胃燥金爲表之裏邪在  
於中近後膀胱水則寒近前陽明燥則熱也寒熱有定時者  
爲瘧無定時者爲往來寒熱以熱在表而淺邪惡正故畏寒  
寒已復熱此邪未併於表裏故寒熱微而無定時也半表半  
裏屬足少陽膽脈行於兩脇手少陽三焦之脈絡心包風邪  
干之心氣不得宣暢故煩滿或攻胸脇故又胸脇痛也邪在  
表則呻吟不安在裏則煩而悶亂邪自表而方傳裏故默然  
靜也經曰陽入之陰則靜邪在表則能食入裏則不能食今  
在表裏之間是以不欲食未至于不能食也邪在表則不煩  
不嘔在裏則煩嘔表方傳裏故心煩喜嘔也裏虛協熱故或  
渴或利或腹中痛裏有停飲故悸而小便不利少陽膽脈絡  
于耳故耳聾膽氣上溢故口苦膽與肝皆屬木故脈弦春月  
時嗽少陽當令之時也血室衝脈也男女皆有之婦人傷寒  
七八日邪當傳裏值經水適來則邪不入腑乘虛而入血室  
或經水適斷表邪乘虛亦入血室熱與血搏結而不行致有  
寒熱如瘧暮則譫語如見鬼狀在男子則下血譫語皆爲熱  
入血室婦人傷寒與男子無異惟熱入血室妊娠傷寒爲不  
同也小柴胡在經上氣在臟主血故更能入血室經曰傷寒  
中風有柴胡證但見一證便是不必悉具又曰傷寒五六日

發熱而嘔醫以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯必蒸而振發熱汗出而愈或溼熱在半表半裏而發黃者仍與小柴胡湯和其表裏雖難證不能外也亦治傷寒五六日頭汗出微惡寒手足

冷心下滿不欲食大便鞭脈細者為陽微結

仲景曰汗出為陽微假令結陰

結不得復有外證脈雖沉緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭有汗故知非少陰也按三陰脈皆至頸胸中而還不上循頭程郊倩曰熱雖結而不甚也以有微惡寒之半表在至于脈沉雖似裏陰則又有頭汗出之證以別之凡脈細脈沉脈緊皆陽熱鬱結之證無關少陰也可見陽氣一結不但陽證似陰陽脈亦似陰矣

柴胡

八兩半夏半升人參

甘草

黃芩

生薑

三兩

大棗

十二枚

嘔逆加生薑陳皮

生薑散逆陳皮順氣

煩而不嘔去半夏人參加栝蘆

以蕩

鬱熱渴者去半夏加花粉

生津

若不渴外有微熱去人參加桂

枝覆取微汗

解肌

欬嗽去參棗生薑加五味子乾薑

欬為氣逆肺寒五味

斂肺乾薑散寒戴元禮曰少陽有嗽無喘有喘  
非少陽也陽明有喘無嗽有嗽非正陽明也  
虛煩加竹葉

粳米竹葉涼心  
粳米和胃齒燥無津加石膏齒燥屬陽明火  
石膏清胃止渴痰多如枯

樓貝母能去  
熱痰腹痛去黃芩加芍藥黃芩寒中芍藥  
合甘草和裏脇下痞硬

去大棗加牡蠣大棗甘令人滿  
牡蠣鹹能軟堅脇下痛加青皮芍藥脇為肝  
膽之部

痛屬肝火二藥平肝心下悸小便不利去黃芩加茯苓經曰太陽證飲  
水多心下必悸

水停心下故悸水畜不行故小便不利黃芩苦反堅腎茯苓淡能利水本經頭痛加川芎入肝  
活血

散鬱發黃加茵陳利  
溼除風

此足少陽藥也膽為清淨之府無出無入其經在半表半裏

不可汗吐下法宜和解仲景曰少陽中風耳聾目赤胸滿而  
煩不可吐下吐下則悸而驚釋曰邪

在半表半裏以吐除煩吐則傷氣氣虛者悸以下除滿下則  
亡血血虛者驚又曰傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽不可

汗汗之則譫語釋曰汗之亡津液少陽之邪因之入胃故譫語邪入本經乃由表而將至裏

當徹熱發表迎而奪之勿令傳太陰柴胡味苦微寒少陽生

藥以升陽達表為君黃芩苦寒以養陰退熱為臣陽不足則陰奏之故

發寒用黃芩降陰氣使不陷入陽中則不寒陰不足則陽奏之故發熱用柴胡升陽氣使不陷入陰中則不熱又曰柴胡

黃芩之苦寒以退熱半夏生薑之辛溫以退寒人參大棗甘草之甘溫以助正氣半夏辛溫能健脾

和胃以散逆氣而止嘔人參甘草以補正氣而和中使邪不

得復傳人裏為佐二藥固太陰使木邪不致剋土然必虛人方可用參邪在半表半裏

則營衛爭表屬衛裏屬營故用薑棗之辛甘以和營衛為使也李時珍曰

少陽證雖在半表半裏而胸膈痞滿實兼心肺上焦之邪心煩喜嘔默默不欲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手

足少陽相火黃芩亦少陽藥也昂按半夏止嘔和胃健脾亦通治煩嘔不欲食寒熱間作脾亦有之不獨少陽也小柴胡

三和解之劑

之用半夏以邪在半表半裏則陰陽爭用半夏和胃而通陰陽也靈樞經用治不眠亦同此意而仲景治喉痺咽痛及大小便秘皆用半夏取其辛能潤燥又能散也丹溪謂半夏能使大便潤而小便長今又專以半夏為除痰之藥稍涉燥證輒不敢用而半夏之功用不復見知於世矣徐忠可曰小柴胡能引清氣而行陽道能引胃氣上行而行春令能散諸經血凝氣聚故凡邪在表裏混雜者俱藉之以提出少陽俾循經而散以柴甘生薑為定藥餘則加減隨證耳陶節庵曰本經證心下飽悶未經下者非結胸也乃表邪傳至胸中未入于腑尚為在表只須小柴胡加枳桔不效就以本方對小陷胸加枳桔一服豁然其效如神喻嘉言曰傷寒分表裏中三治表裏之邪俱盛則從中而和之故有小柴胡之和法用人參甘草半夏生薑太棗助脾和中但帶柴胡一味透表黃芩一味透裏飲入胃中聽胃氣之升者帶柴胡出表胃氣之降者帶黃芩入裏一和而表裏之邪盡服未效者加工治之不相扞格矣又曰虛勞發寒熱者乃衛虛則惡寒營虛則發熱耳緩調營衛俾不亢戰寒熱自止若誤用小柴胡俾汗多而衛傷于外便溏而營傷于內虛熱轉加病益甚矣吳綬曰小柴胡為半表半裏之劑太陽經之表熱陽明經之標熱皆不能解也若夫陽氣虛寒面赤發熱脈沉足冷者服之立見危

殆及內有虛寒大便不實婦人新產發熱皆不可用也李  
材曰今人治傷寒不分陰陽表裏槩用此方去參投之以為  
平穩殺人多矣不獨峻劑也○李東垣曰若血受病亦先  
氣謂氣不調則血不行氣夫血婦也如婦人經病先柴胡以  
行經之表次四物以行經  
之裏亦先氣而後血也

本方以前胡代柴胡名小前胡湯崔氏治同  
胡洽云亦仲景方本方加

陳皮芍藥名柴胡雙解散節菴治同本方加芒硝名柴胡加芒

硝湯仲景見表裏門本方加桂枝名柴胡加桂枝湯仲景治傷寒六七

日發熱微惡寒支節煩痛微嘔心下支結外證未去者傷寒六七

日邪當傳裏支結者胸中支撐而結也喻嘉言曰謂結于心  
之邊旁也嘔而支結為將傳裏發熱惡寒骨節煩痛為外證  
未除宜和解昂按此兼太陽故加桂枝脈經曰發汗多  
亡陽譫語不可下宜此湯和其營衛以通津液自愈  
本方

除黃芩甘草加桂枝茯苓龍骨牡蠣鉛丹大黃名柴胡加龍

骨壯蠟湯

仲景

治傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利識語

身重不可轉側

傷寒入九日過經然後下之可謂慎矣孰知外邪未盡乘虛入裏煩滿者陽熱入胸也驚

者心惡熱而神不守也煩驚雖係乎心亦因膽虛為將軍之官失榮而多畏也小便不利裏虛而津液不行也識語胃熱也身重不可轉側陽氣不營于表也與柴胡湯以除煩滿加茯苓龍骨牡蠣鉛丹收斂神氣而鎮驚而茯苓牡蠣又能行津液利小便加大黃以逐胃熱止識語加桂枝以行陽氣合柴胡以散表邪而解身重因滿故去甘草按傷寒傳足不傳手其實原無界限此證邪熱于心神明內亂故致煩驚識語仲景加入心藥數種不專以足經之治治之也

本方

去半夏人參薑棗加桂枝乾薑花粉牡蠣名柴胡桂枝乾薑

湯

仲景

治傷寒汗下後胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭

汗出往來寒熱心煩者

頭汗寒熱而兼滿渴表裏皆有邪故除人參半夏而加桂枝以解太陽乾

薑以散滿花粉以生津牡蠣以

顛堅以此和解復津液而助陽亦治瘧發寒多熱少或但寒

不熱喻嘉言曰小柴胡本陰陽兩停之方可從寒熱以為進退此方加薑桂則進而從陽其加芩連以退而從陰可以類推李梴曰傷寒餘熱未盡重感六淫之氣變而為瘧治法與雜病不同寒多熱少或單寒者太陽邪變也柴胡桂枝湯熱多寒少或單熱骨節煩痛者陽明邪變也白虎湯寒熱相等或先熱者少陽邪變也小柴胡湯渴者去半夏加花粉知母寒熱大作戰慄汗出不散者太陽陽明合病也桂枝石膏湯服此後瘧愈甚者三陽合病也恐傳入陰經急用桂枝黃芩湯如傳入陰經從卯至午發而嘔吐人便閉者大柴胡湯下之從午至酉發而腹滿便閉者大承氣湯下之從酉至寅發而欲狂善忘便黑者桃仁承氣湯微利之不敢下者梔子升麻湯若挾痰食瘴氣治法與雜病略同附桂枝石膏湯桂枝一錢黃芩二錢石膏知母各三錢桂枝黃芩湯即小柴胡加石膏二錢知母二錢桂枝五分李梴曰二方以桂枝治太陽白虎治陽明柴胡治少陽意甚明顯挾痰合二陳食積合平胃瀝瀝合五苓便閉合大柴胡無汗加葛根蒼朮有汗加黃耆白朮夜發加白芍桃仁日

名柴胡去半夏加栝蒌根湯

金匱

治往來寒熱而渴及勞瘧

花粉

潤燥生津太陽小便不利而渴宜五苓陽明大便秘不利而渴宜調胃承氣大柴胡已利而渴宜白虎少陽寒熱往來而渴宜此湯遇勞即發名勞瘧本方去柴胡黃芩加厚朴名厚朴生薑半夏

草人參湯仲景治發汗後腹脹滿者凡吐下後腹滿者乃當汗

入裏邪氣盛則實之證也汗後表已解而脹滿者知非裏實緣脾胃氣虛陰氣內壅而為脹也法當補虛散滯本方

除半夏加當歸白芍大黃名柴胡飲子子治肌熱蒸熱積熱

汗後餘熱脈洪實弦數表為肌熱裏為蒸熱壅為積熱亦治瘧疾喻嘉言曰和法中

略施攻補本方加羌活防風名柴胡羌活湯治瘟疫少陽證

本方加桔梗名柴胡桔梗湯治春嗽本方合平胃散名柴平

湯治溼瘧身痛身重本方加青黛薑汁糊丸名清鎮丸潔古治

嘔吐脈弦頭痛及熱嗽本方一分加四物二分名柴胡四物

湯治婦人日久虛勞微有寒熱本方與四物各半名調經湯

黃連湯

升降陰陽○仲景

治傷寒胸中有熱而欲嘔胃中有寒而腹痛

成氏曰溼寒下後舌上有治者

是丹田有熱胸中有寒是邪氣入裏而為下熱上寒也此傷寒邪氣傳裏而為下寒上熱也胃中有邪氣使陰不得升而獨治于下為下寒腹中痛陽不得降而獨治于上為肺中熱欲嘔吐與此湯以升降陰陽

黃連

炒

乾薑

炒

桂枝

甘草

兩

人參

兩

半夏

半升

大棗

十二枚

此足陽明藥也黃連苦寒泄熱以降陽薑桂辛溫除寒以升陰人參助正祛邪半夏和胃止嘔甘草大棗調中止痛上中

二焦寒熱交戰以此和解之

喻嘉言曰溼寒下之舌上有胎者丹田有熱胸中有寒也仲景

亦用此湯何耶蓋傷寒分表裏中三治表裏之邪俱盛則從中而和之故有小柴胡之和法至于丹田胸中之邪在上下

而不在表裏即變柴胡為黃連湯以桂枝伐柴胡以黃連代黃芩以乾薑代生薑引入胃中聽胃氣之上下敷布故不問下寒上熱上寒下熱皆可治之也夫表裏之邪則用柴芩用生薑之辛以散之上下之邪則用桂連用乾薑之辣以開之仲景聖法灼然矣昂按上下未有不分表裏者大槩上焦屬表中下屬裏胸中與太陽為近故用桂枝嘉言著眼雖高而立言尚有未盡

# 黃芩湯

太陽少陽兩解○仲景

## 治太陽少陽合病自下利者

合病者謂有太陽之證身熱頭痛奇強又有少陽之證耳聾脇

痛嘔而口苦寒熱往來也自利者不因攻下而泄瀉也日利固多可溫然腸胃有積結與下焦客熱又非溫劑所能止或分利之或攻泄之可也成氏曰太陽陽明合病下利為在表與葛根湯以汗之少陽陽明合病下利為陽邪入裏與承氣湯以下之此太陽少陽合病下利為在半表半裏與黃芩湯以和解之

# 黃芩

兩

# 芍藥

# 甘草

兩

# 大棗

枚

此足太陽少陽藥也成氏曰虛而不實者苦以堅之酸以收

之黃芩芍藥之苦酸以堅斂腸胃之氣弱而不足者甘以補

之甘草大棗味甘以補腸胃之弱昂按二經合病何以不用

利是陽邪入裏則所重者在裏故用黃芩以徹其熱而以甘芍大棗和其太陰使裏氣和則外證自解和解之法非一端也○仲景之書一字不苟此證單言下利故此方亦單治下利機要用之治熱痢腹痛更名黃芩芍藥湯潔古因之加木香檳榔大黃黃連歸尾官桂更名芍藥湯治下痢仲景此方遂為萬世治痢之祖矣

本方加半夏升生薑三兩名黃芩加半夏生薑湯仲景治前證兼

嘔者嘔胃氣逆也加半夏生薑以散逆氣千金曰生薑嘔家聖藥是散其逆氣也金匱曰嘔家用半夏以去其水

去則嘔止是亦治膽腑發欬嘔苦水如膽汁胃氣逆則嘔苦下其痰飲也

本方除大棗名黃芩芍藥湯治火升鼻衄及熱痢外臺黃芩

湯黃芩人參乾薑

各三兩

桂枝

兩

半夏

半升

大棗

十二枚

治乾嘔下

痢

芍藥甘草湯

腹痛

治腹中不和而痛

此陰陽氣血不和肝木乘脾之故也腹痛有寒有熱有虛有實有食積有溼痰有死

血有蟲寒痛者痛無增減或兼吐利熱痛者時痛時止腹滿堅結實痛者痛甚脹滿手不可按虛痛者按之即止食痛者痛甚則利後痛減死血痛者痛有常處溼痰痛者脈滑痰氣阻礙不得升降蟲痛者時作時止面白唇紅大抵胃脘下大腹痛者多屬食積外邪遶臍痛者屬痰火積熱臍下小腹痛者屬寒或瘀血或溺澀

仲景用治誤表

發厥腳攣吐逆與乾薑甘草湯以復其陽厥愈足溫者更作

此湯以和其陰其腳即伸

酸甘相合用補陰血王海藏曰稼穡作甘甘者已也曲直作酸酸者

甲也甲已化土此仲景妙方也



北京中医药大学图书馆藏

白芍藥

甘草

炙各四兩

脈緩傷水加桂枝生薑脈洪傷金加

黃芩大棗脈瀦傷血加當歸脈弦傷氣加芍藥脈遲傷寒加

乾薑

此足太陰陽明藥也氣血不和故腹痛白芍酸收而苦泄能

行營氣炙草溫散而甘緩能和逆氣又痛為木盛尅土

諸痛皆屬

肝木白芍能瀦肝甘草能緩肝和脾也

虞天民曰白芍不惟治血虛大能行氣腹痛者

營氣不和逆于肉裏得白芍行其營氣又以甘草之甘緩和其逆氣此不治之治乃所以深治之也

本方去芍藥加乾薑

一兩炮

名甘草乾薑湯

仲景別見寒門

金匱用此

治肺痿肺冷吐涎沫小便數

以此溫之

本方加附子名芍藥甘草

附子湯

仲景別見寒門

本方加黃芩名黃芩芍藥湯

機要

治熱痢腹痛

醫方集解

枯蘖薤白白酒湯

和解之劑



後重身熱膿血稠粘及鼻衄不止脈洪數  
此即仲景之黃芩湯除大棗  
本

方加白朮名白朮芍藥湯  
機要治脾溼水瀉身重困弱  
保命集

不止或暴下者皆太陰受病故不可離芍藥人不受溼則不痢故須白朮四時下痢于白芍白朮內春加防風夏加黃芩秋加厚朴冬加桂附更詳外證治之如身困倦加白朮自汗逆冷氣息微加桂附以溫之如裏急後重膿血稠粘雖在盛冬于溫藥內亦加大黃

栝樓薤白白酒湯  
胸痺○金匱

治胸痺喘息欬唾胸背痛短氣  
胸中者心肺之分故喘息而欬唾諸陽受氣于胸中轉行

于背氣痺不行故胸背為痛而短氣

栝樓一枚薤白三斤  
白酒四斤

此上焦膈中藥也  
膈中兩乳中間經曰膈中者臣使之官喜樂出焉  
喻嘉言曰胸中