

外科正宗卷上



重訂外科正宗卷之十一

疔瘡第八十九

疔瘡乃風熱溼痰所生有冬溫後天時不正感發傳染者多兩腮腫痛初發寒熱以柴胡葛根湯散之外敷如意金黃散在裏肉熱日乾二便不利者四順清涼飲利之表裏俱解腫仍不消必欲作膿托裏消毒散膿成者即針之體虛人兼服補托自愈

柴胡葛根湯

見傷寒發願門

四順清涼飲

見湯發願門

痰包第九十

痰包乃痰飲乘火流行凝注舌下結而飽腫綿軟不硬有妨言語作痛不安用利剪刀當包剪破流出黃痰若蛋清稠粘難斷捺盡以水礪散搽之內服二陳湯加黃芩黃連薄荷數服忌煎炒火酒等件

加味二陳湯

加味二陳湯半夏
芩連薄荷薑三片

扶苓甘草共陳皮
痰飲生來服此宜

治痰飲流注舌下發腫作痛針刺已破者服之

陳皮

半夏

茯苓

甘草

黃芩

各八分

黃連

薄荷

各五分

水二鍾薑三片煎八分食前服

冰硼散

見咽喉門

癩風第九十一

癩風乃陽明溼熱沸騰於肌表或外受風寒侵襲而成其患初起水

泡作癢成瘡破流脂水瘡至徹骨久則成片傳及遍身好浴熱湯

形如風癩初起上體多者防風通聖散去硝黃加葱頭三莖發汗

以散外毒下體多者去麻黃以攻內毒久服祛風換肌丸初服消

風清燥湯外搽諸瘡一掃光成片流水者真君妙貼散皮膚頑厚



有蟲者麥飯散擦之

消風清燥湯消風清燥湯生地
花粉川芎兼白芍

川芎

當歸

白芍

黃連

天花粉

蟬蛻

苦參

生地

靈仙各一錢

防風

甘草

黃芩

水二鍾煎八分食後服

應用方

防風通聖散

見時毒門

真君妙貼散

見腫瘍門

溼腫第九十二

溼腫者皆脾氣受傷之病或飲食後驟受風寒所侵或飢渴時悞食生冷所滯寒積於中食不尅化其患胸膈不寬小水不利面目浮腫漸至偏身此土傷不能生化之故也宜用二蛟散疏通稼土溫

祛風換肌丸

見白屑風門

諸瘡一掃光

見疥瘡門



北京中醫藥大學圖書館版權所有

養脾元其小水自利浮腫自消此方百發百中之妙

二蛟散

二蛟散內用皮硝
涇腫糖湯調服下

陳米三年要炒焦
如蛟行水自然消

治生冷惱怒傷脾致胸膈不寬小水不利面目四肢浮腫諸藥不
效用三年老黃米炒焦黃色為末提淨芒硝三兩鍋內溶化炒乾
為末每用一平杯和勻再碾極細大人壯實者每服三錢小兒十
歲上下者一錢二分俱用赤砂糖三茶匙和白滾湯半茶鍾空心
調服至午大便一次至晚再便一次其疾先從眼胞消起日久元
氣虛者與加味胃苓湯間服至重者不過五服愈
加味胃苓湯加味胃苓湯木苓
澤瀉猪苓併厚朴
治脾胃受傷胸膈不寬兩脇膨脹小水不利面目四肢浮腫者服
之

陳皮

茯苓

白朮

各一錢

白芍

各二錢

藿香

人參

厚朴

山查

澤瀉

半夏

各五分

甘草

獐牙

各三分

香附

女人加一錢

薑三片燈心二十根水二鍾煎八分食前服

咬傷第九十三

人咬爲患良肉受傷但齒乃陽明胃經有餘臟腑多火多熱生穴於此凡食經此無不燐爛下咽又飲食炙燐之毒無不侵襲故傷人發腫其痛異常臭膿腐爛痛徹連心是感牙之毒也初咬時一日內衆撤熱小便浸傷處洗淨牙黃瘀血咬孔上蟾酥餅貼之膏蓋後出微膿漸愈如咬時未經此法致腫痛發疼甚者亦與童便浸洗挹乾用麝紙撚蘸麻油點火用烟焰薰腫痛止良久方佳以解牙毒仍以蟾酥條插入孔內膏蓋候腫消時換玉紅膏搽之長肉完口如有雜症相兼者亦隨症而治



蟾酥餅條

見疔瘡門

玉紅膏

見腫瘍門

葱白甘草湯

葱白甘草湯容易每日常將頻洗之

咬傷疼痛兼具穢消瘀散腫功全備

治咬傷瘀腫疼痛膿血淋漓臭穢腐爛者用葱白二兩粉草五錢水三碗煎至二碗每日洗淨傷處瘀腐膿血方用玉紅膏搽之黑膏蓋漸愈

風犬傷第九十四

風犬乃朝夕露臥非時不正之氣所感故心受之其舌外出肝受之其目昏朦脾受之其涎自流肺受之其音不出腎受之其尾下拖此五臟受毒成爲風犬乃稟陰陽肅殺之氣故經此必致傷人隨咬卽服救生散小便中行出血片忌諸口味發物赤豆等俱不可見百日乃安治之遲者毒大而小便難出必攻臟腑久則成形腹脹攻急人聲若犬眼神露白者俱爲不治有愈後復犯前禁觸之



仍死

救生散

救生散用七斑薑
杭粉一錢同作末

惟用全身翅足饒
空心酒服效偏高

治風犬咬傷用生斑薑七個去頭翅足杭粉一錢同研空心溫酒

酒調服一時許小便行出血片白脂乃惡物也如便疼煎甘草湯

飲之自利如毒未盡次早再一服以小便清白方為毒盡

又方治風犬咬有效其人項中必有紅髮一根急須拔去以追風如

聖散敷傷處抽毒氣服救生散

追風如聖散追風如聖散防風
白芷細辛蒼朮等

川草烏芎薄荷同
雄黃加上效無窮

治風犬咬傷隨調敷之其毒即可拔出

細辛

防風

川烏

薄荷

草烏

川芎

白芷

蒼朮

各一兩
雄黃四錢

共為末溫酒調敷傷處以紙蓋托早晚換二次

風犬傷之要靜居

諸麻赤豆大葷祛

百日之中都忌見

敢教患者樂年餘

女人面生鰐黑斑第九十五

鰐黑斑者水虧不能制火血弱不能華肉以致火爆結成斑黑色枯
不澤朝服腎氣丸以滋化源早晚以玉容丸洗面斑上日久漸退
兼戒憂思動火勞傷等件但此生於夫主不利疑事不決者常有
之

腎氣丸見肺癰門

玉容丸見雀斑門

鈕叩風第九十六

鈕叩風皆原風溼凝聚生瘡久則搔癢如癬不治則沿漫頂皆當以

冰硫散擦之甚者服消風散亦妙

冰硫散

水流散內用川椒
蘿蔔內藏煨熟藥

朝腦生蟻豈可饒
還將猪脂共相調



硫黃一兩

樟冰

川椒

生礬各一錢

共為末先用白蘿蔔一個摳空其內將藥填滿腹將原皮蓋之症紙包三四層灰火內煨半時許待冷取開用藥同熟猪油調稠搽患上自愈

消風散見疥瘡門

枯筋箭第九十七

枯筋箭乃憂鬱傷肝肝無榮養以致筋氣外發初起如赤豆大枯點微高日久破裂變出筋頭縫鬆枯槁多生胸乳間宜用絲藥線齊根繫緊七日後其患自落以珍珠散摻之其疤自收兼戒口味不發

絲藥線見癰瘡門

珍珠散見下

婦人腳了作癢第九十八

婦人腳了作癢乃從三陽風溼下流凝結不散故先作癢而後生溼

爛又或足底彎曲之處癢溼皆然

枯礬散

枯礬散中用石膏
四味將來為未慘

枯礬錢五

石膏煨

輕粉

黃丹

黃丹輕粉不相饒
腳了溼痒即時消
各三錢

右為末溫湯洗淨搽藥即愈

手足破裂第九十九

手足破裂破裂老乾枯之象氣血不能榮養故也因熱肌驟被風寒
所逼凝滯血脉以致皮膚漸枯漸稿乃生破裂白襲於風風熱相
乘故多作痛以玉肌散洗擦潤肌膏潤之甚者兼服當歸飲子為
妙

玉肌散

見雀
斑門

潤肌膏

見白
禿瘡門

當歸飲子

見疥
瘡門

眼丹第一百



眼丹脾經有風胃經多熱其結爲腫風多者則浮腫易消熱甚者則
堅腫難散初起宜用金黃散敷之有表症者荆防敗毒散裏症者
清胃散加大黃利之如後不散必欲作膿宜換膏貼之膿成者卽
針之遲則眼頭自破此乃精明穴內空難斂者成漏者多

荆防敗毒散

見時毒門

清胃散

見牙縫出血門

金黃散

見腫瘍門

黑子第二十一

黑子痣名也此腎中濁氣混滯於陽陽氣收束結成黑子堅而不故
凡人生此終爲不吉面部不善者去之宜細銅管將痣套入孔內
撚六七轉令痣入管一拔便去有痣浮淺不能拔者用針挑損痣
上搽冰蠟散少許糊紙蓋之三日自脫或灰米膏點之亦可落後
珍珠散乾搽生皮而愈忌醬醋無斑

灰米膏用成塊石灰蘸水調稠將白川米插入灰內留半米在外片

時許候米熟用米點痣上可落矣

水螬散見癰瘻門

珍珠散見下疳門

眼胞菌毒第一百二

菌毒者乃脾經蘊熱凝結而成其患眼胞內生出如菌頭大帶小漸長垂出甚者眼翻流淚亦致昏矇治宜用軟綿紙蘸水蘸之眼胞上少頃用左手大指甲佃於患根右手以披針尖頭齊根切下而出不妨隨用翠雲錠磨濃塗之其血自止內服涼膈清脾飲二服仍忌海腥煎炒椒薑火酒等件不發

涼膈清脾飲

涼膈清脾飲薄荷黃芩赤芍連翹等

荆防生地石膏圖甘草山梔豈可無

防風

荆芥

黃芩

石膏

山梔

薄荷

赤芍

連翹

生地

各一錢

甘草

五分

水二鍾燈心二十根煎八分食後服



翠雲錠治眼胞菌毒用針割後塗之枕粉五兩銅綠末二兩輕粉一錢共研極細用黃連一兩同川米百粒水一碗煎一半再熬拔去二分和藥作錠陰乾臨用清水少許淨硯上磨濃雞翎蘸擦患上又治爛弦風眼或暴赤腫痛者搗擦更效

體氣第一百三

體氣一名胡氣此因父母有所傳染者又有胡胎而受生者故不脫本來氣質凡此腋下多有棕紋數孔出此氣味常以五香散擦之內用蒜肚時常作饌食之亦可解其氣味可漸而退此法常敢效也

五香散

五香散內用沉檀檀香功更捷

一還有零零併木香敢教體氣不相妨

沉香

檀香

木香

零零香

錢各三

麝香分

共為細末每用五釐津調擦擦兩腋下三日一次或用香末二錢

紅袋盛貯挂於腋下亦效

蒜肚方用公猪肚一具入大蒜囊四十九枚去殼入肚內以線扎口
水煮極爛用鹽醋蘸肚隨便食之氣味甚者用癩蝦蟆一個入內
同煮肚爛去蝦蟆大蒜用熱酒食之洗浴發汗避風三日其氣頓
改

白禿瘡第一百四

白禿瘡因剃髮腠理司開外風襲人結聚不散致氣血不潮皮肉乾
枯發爲白禿久則髮落根無榮養如禿斑光潤不癢內血已竭以
薑蘸潤肌膏常擦其髮漸生禿斑乾枯作癢者內必有蟲宜用麥
錢散搽之蟲死風散髮生可愈後忌動風發物等件

麥錢散

見痘風
瘡門

治禿瘡頭毛脫落白斑如癬瘡痂壘壘叠起癢甚猶若蟲行蒸湯

洗淨瘡痂潔淨用麻油調搽以毡帽戴之隨後作疼發腫忍之二

日後其痂漸漸而脫愈之後不復作其髮一生戒諸發物

諸瘡一掃光

見疥瘡門

治禿瘡髮脫作癢本藥一錢加倒挂塵二分加燈窩宿油調搽自
愈

潤肌膏

潤肌膏內用麻油能搽禿瘡枯稿色

紫草當歸一處投加之黃蠟效應收

治禿瘡乾枯白斑作癢髮脫用麻油四兩當歸五錢紫草一錢同
熬藥枯瀘清將油再熬加黃蠟五錢化盡傾入碗內頓冷搽擦患
上漸愈矣

奶癬第一百五

奶癬兒在胎中母食五辛炙煖遺熱與兒生後頭面遍身發為
奶癬流脂成片睡臥不安搔癢不絕以蚊蛤散治之或解毒雄黃



散甚則翠雲散妙

蚊蛤散

蚊蛤散中輕粉末香油調搽門兒癰

川椒倍子炒須焦乳母宜將飲食調

蚊蛤兩

點紅川椒兩

輕粉五錢

先將蚊蛤打成細塊鍋內炒黃色次下川椒同炒黑色烟起為度入罐內封口存性次日人輕粉碾為細末罐收貯香油調搽奶母

戒口為妙

解毒雄黃散

見血風瘡門

翠雲散

青釭汁調搽見楊梅瘡門

蟾拱頭第一百六

蟾拱頭俗名腦猪是也患小而稟受悠遠皆父精母血蓄毒而成生後受毒者只發一次其患腫高破之又腫皆稟受時原有衣膜相裹毒雖出而膜未除故愈又發腫甚膿熟者用針刺破以三品一條鎗插入孔內化盡內膜自愈又有不腫而不收口者此必淫襲