

三

吳黼堂
評註

陳無擇三因方

上海棋盤街
文瑞樓印行

有中醫藥學會書藏

南京中醫藥大學圖書館
11-185 $\frac{3}{8}$



三因極一病源論粹方卷之六

宋陳言著

閩吳錫璜評註

弟錫琮珣甫校

敘疫論

夫疫病者。四時皆有不正之氣也。春夏有寒清時。秋冬亦有暄熱時。一方之內。長幼患狀。率皆相類者。謂之天行是也。若春時應煖而清折之。則責邪在肝。病曰青筋牽。夏時應暑而寒氣折之。則責邪在心。病曰赤脈攢。秋時應涼而熱氣抑之。則責邪在肺。病曰白氣狸。冬時應寒而煖氣抑之。則責邪在腎。病曰黑骨瘟。土無正形。因火而名。故附金木火水而變。病曰黃肉隨。其天行之病。大則流毒天下。次則一方一鄉。或徧着一家。悉由民庶宿業所致。故天地靈祇。假茲不正之

氣而行責罰。且人命有遭逢。時有否泰。故有徧着一家者。天地既有斯害氣。還以天地所生之物而防備之。命曰賢人知方。

四季疫證治

病者發熱。腰痛強急。脚縮不伸。肝中欲折。目中生花。或瀉瀉憎寒。復熱。頸外雙筋牽。不得屈伸。項直背強。眼赤黃。欲轉動。合目回側。病名青筋牽者。由春三月。其源從厥陰涉足少陽。少陽之氣始發。少陰之氣始衰。陰陽怫鬱於腠理。藏府受厲而生。若腑虛則為陰邪所傷。故發熱。若臟虛則為陽毒所損。故憎寒。

治青筋牽 肝腑臟溫病。陰陽毒。胆腑虛為陰邪所傷。腰脇強急。脚

縮不伸。肝中欲折。目中生花。色蒼蒼者。

紫胡

五兩
去苗

茯苓

梔子仁

半夏

大青

各三兩

桂心

竹茹

香豉

炙草

各一兩

右呖咀每服五錢水二盞薑五片煎七分去渣空心服

治青筋牽肝腑臟溫病陰陽毒肝臟實為陽毒所傷漉漉惡寒翕翕發熱頸外雙筋牽不得屈伸項直背強眼赤黃轉動則合身回側色蒼蒼者

玄參

一兩

細辛

二兩

梔子仁

黃芩

升麻

芒硝

各二兩

石

膏

煨八兩

右剉散每服五錢水二盞入車前草三葉淡竹葉七片煎七分去滓空心服

病者脈促身顫掉不能禁或內熱口乾舌破咽塞聲嘶病名赤脈攢者以夏三月其病從少陰太陽之氣相搏而停則榮衛不通皮肉痠起太陽發動少陰淫邪之氣因而作癰則藏府隨時受其疫病也若腑虛為陰所傷則寒戰若臟實為陽毒所侵則內熱

治赤脈攢心府藏溫病陰陽毒心藏實則為陽毒所傷內熱口乾舌破咽塞聲嘶色焦赤者

天門冬

麥門冬

各去心

車前子

炒

梔子仁

黃芩

升麻

炙草

寒水石

煨各等分

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

病者身重頸直皮肉強痺或蘊而結核起於喉頸之側布熱毒於皮膚分肉之間上散入髮際下貫顛顙隱隱而熱不相斷離病名黃肉隨以四季各十八戊己日其病從太陰陽明相格寒濕不調關節格滯若府虛則皮肉強痺若藏實則布毒熱發於皮膚

治黃肉隨脾府藏溫病陰陽毒胃府虛則為陰邪所傷頭重頸直皮

肉強痺膜脹色黃黑者

厚朴

薑汁炒一兩半

白朮

陳皮

各一兩

炮薑

紫蘇

炙草

半夏



湯炮各
三分

右為剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

治黃肉隨藏府溫病陰陽毒藏實為陽毒所傷蘊熱結核起于喉頸
之側布毒熱於皮膚分肉之中散入髮際下貫顳顬畜熱不散色

黃者

葛根

蒼朮

泔浸一宿
去粗皮

升麻

白芷

桔梗

青皮

各一兩

大

黃
半兩

右剉散每服五錢水二盞煎七分去渣食前服

病者乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆或體熱發斑喘咳引氣名白氣
狸以秋三月其源從陽明係手太陰受疫淫邪之氣若府虛為陰邪
所傷則乍寒乍熱若臟實為陽毒所傷則體熱發斑

治白氣狸肺腑臟溫病陰陽毒太腸府虛為陰邪所傷寒熱互作上



醫學大學圖書館藏

氣欬逆。大腸飧泄。皓皓白者。

白朮

人參

各一兩

炮薑

麥蘖

炒各五分

白茯苓

五味子

肉

豈菟

草果

烏梅

炙草

各五錢

右剉散。每服五錢。水盞半。煎七分。去渣食前服。

治白氣狸。肺腑臟溫病。陰陽毒。藏實為陽毒所傷。體熱。肌膚發斑。氣

喘引飲。色昏白者。

紫苑茸

一兩

梔子仁

升麻

前胡

各三分

葶藶

炒一錢

杏仁

去皮

炙草

各五錢

石膏

煨半兩

右剉散。每服五錢。水二盞。煎七分。去渣食前服。

病者裏熱外寒。意欲守火。而反引飲。腰痛欲折。或胃脇切痛。類如刀刺。不得轉動。熱彭彭。食冷多則洞瀉。病名黑骨溫。以冬三月。其源從足太陽少陰相搏。蘊積壅塞。若府虛為陰毒所傷。則內熱外寒。若臟

實為陽毒所損則彭彭發熱

治黑骨瘟腎府藏溫病陰陽毒腎府虛為陰邪所傷則裡熱外寒煩

渴引飲反喜守火或腰脇滿痛小便赤黃面與脚俱黑

附子

炮去皮臍

茯苓

各一兩

山茱萸

細辛

山藥

澤瀉

各半兩

麻黃

三分

杏仁

一分去皮尖

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

治黑骨瘟腎府溫病陰陽毒腎藏實為陽毒所傷腰脇切痛不能轉

動大小便秘澀腹脹食冷則洞泄色重黑

吳茱萸

黑牽牛

炒

大黃

蒸

草薢

杜仲

薑汁炒去絲

桃仁

各半

分去皮尖

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

料簡諸疫證治



醫藥大學圖書館

凡春分以前。秋分以後。天氣合清涼。忽有溫暖之氣折之。則民病溫疫。春分以後。秋分以前。天氣合濕熱。忽有清涼之氣折之。則民病寒疫。治之各有法。不可拘以日數汗下。皆宜據方論一體而分。既有寒溫二疾。風濕亦宜備論。如己未年京師大疫。汗之死。下之死。服五苓散則愈。此無他。溫疫也。以此為法。每年遇有不正之氣。即當紀而用之。假令如冬合寒。而有溫暖之氣。則春必患溫疫。春合溫。而有清涼之氣。則夏必患燥疫。夏合熱。而有寒氣折之。秋必患寒疫。秋合晴。而反淫雨。冬必病濕疫。此亦一途而推之。更須以時斟酌。不可偏執。況疫之所興。或溝渠不泄。滯其穢惡。薰蒸而成者。或地多死氣。鬱發而成者。或官吏枉抑。怨讟而成者。世謂獄瘟。傷瘟。墓瘟。廟瘟。社瘟。山瘟。海瘟。家瘟。竈瘟。歲瘟。天瘟。地瘟等。不可不究。古法辟之用屠蘇酒。務成子螢火圓。李子建殺鬼煎。老君神明散。皆辟溫法。惟劉根別傳。今於州

治太歲六合處穿地深三尺。潤亦如之。取淨沙三斛。實之以醇酒。三升沃其上。俾使君祝之。此亦濟人除疫之良術。所謂太歲六合者。歲泄氣之所在。故以壓禳。

屠蘇酒

辟疫氣。令人不染。及辟溫病傷寒。

大黃

桔梗

川椒

白朮

桂心

各一兩

烏頭

炮去皮
尖六錢

援藥

一兩
三錢

右剉散。縫袋盛。以十二月晦。日日中。懸沉井中。令至泥。正月朔旦。乃出藥置酒中。煎數沸。於東向戶中飲之。先從少起。多少任意。一方有防風一兩六錢。

太乙流金散

辟溫氣

雄黃

雌黃

殺羊角

炮各
二兩

鬼羽箭

枯礬

各一
兩半

右末。以縫袋盛一兩。帶心前。并掛門戶上。若逢大疫之年。以月旦。

青布袋一刀圭中庭燒之溫病人亦燒之薰

敗毒散

治傷寒溫疫風濕頭痛目昏眩四肢疼痛憎寒壯熱項強

眼睛痛尋常風眩拘急風痰並宜服之

羌活

獨活

人參

甘草

柴胡

前胡

茯苓

枳殼

川

芎

桔梗

各等分

右剉散每服四錢匕水一盞薑三片薄荷五葉煎七分去渣熱服
寒多則熱服熱多則溫服傷濕加白朮脚痛加天麻本方為細末
點服亦可初虞世究其方知出道藏乃敘云自非異人傑出志與
神會則莫之敢為良可嘆服烟瘴之地或溫疫時行或人多風多
疾多氣或處卑濕脚弱此藥不可缺也世人不師古故常務於新
奇蔽於俗學故備論之此藥治脚氣下注焮熱赤腫加大黃棋子
大併煎進兩服立效



應夢人參散 治傷寒體熱頭疼及風壅痰嗽咯血

白芷 乾葛 青皮 桔梗炒 白朮 人參各三分

炙草一分

炮薑

一錢三字

右末每服二錢水一盞薑三片棗二枚煎七分通口服如傷寒人

豉數粒同煎熱服大有效不拘時崇寧癸未米芾為太常博士始

造待漏冒寒得疾痰嗽如膠有血更三醫不退一日謁太尉蔡元

度取人參散一貼并棗見授繼歸有客承議郎薛道至留食藥熟

進一服良久痰嗽立止而客怪曰公氣色頓快何藥也為道其由

求方蔡公又送一貼越三日病全除往見蔡公公曰此藥僧伽方

也元祐中泗守劉士彥病八日不汗女求僧伽甚確夜夢告曰翌

日塔中取藥遂於大士鉢中取得此藥題印云太平州楊家人參

散今太醫局中亦賣無甘草乾葛無分兩疑非真方

喝起散

石膏

煨三兩

蒼朮

泔浸

麻黃

荊芥

各二兩

大黃

兩半

括囊

根 乾葛

芍藥

白芷

甘草

各一兩

右為末。每服二錢。水盞半。薑三片。葱白三寸。煎七分。空心服。

入溫家令不相染法

明雄黃研細末。水調。以筆濃蘸。塗鼻竅中。與病人同床。亦不相染。初洗面後。及卧時點之。凡疫家自生惡氣。聞之即入上元宮。遂散百脈。而成斯病。宜以紙撚探鼻。嚏之為佳。如以雄黃點鼻。則自不聞。并辟諸惡夢神良。

聖散子 東坡敘云。昔嘗觀千金方。三建散於病無所不治。而孫思邈著論。以為此方用藥。節度不近人情。至於救急。其驗特異。乃知神物效靈。不拘常制。至理關感。智不能知。今余所得聖散子。殆此類。



也。自古論病。惟傷寒至為危急。表裡虛實。日數症候。應汗應下之
法。差之毫釐。輒至不救。而用聖散子。一切不問。陰陽兩感。男女相
易。狀至危篤者。連飲數劑。則汗出氣通。飲食漸進。神宇完復。更不
用諸藥。連服取差。其病輕者。額微汗。正爾無恙。藥性小熱。而陽毒
發狂之類。入口即覺清涼。此殆不可以常理詰也。時疫流行。平日
輒煮一釜。不問老少良賤。各飲一大盞。則時氣不入其門。平居無
病。能空腹一服。則飲食快美。百病不生。真衛生濟世之寶。其方不
知所從來。故巢君數世寶之。以治此疾。百不失一。余既得之。謫居
黃州。連歲大疫。所全活者。至不可數。巢初所惜此方。指江水為
盟。不傳與人。余切隘之。乃以傳新水龐君安常。龐以醫聞於世。又
善著書。故以傳之。且使巢君之名。與此方同不朽也。用藥如後。

草豆蔻

十箇

猪苓

去皮

石菖蒲

茯苓

獨活

高良薑

炒切

吳茱萸 柴胡

附子

炮去
皮臍

麻黃

去節

厚朴

薑汁
炒

藁本

芍藥

枳殼

麩炒

白朮

蒼朮

泔浸

半夏

澤瀉

藿香

防風

細辛

各半
兩

甘草

炙一
兩

右剉散每服五錢水盞半煎七分去滓空腹熱服此藥似治寒疫

因東坡作序天下通行辛未年永嘉瘟疫被害者不可勝數往往

頃時寒疫流行其藥偶中抑未知方土有所偏宜未可考也東坡

便謂與三建散同類一切不問似太不近人情夫寒疫亦自能發

狂蓋陰能發躁陽能發厥物極則反理之常然不可不知今錄以

備療寒疫之用宜審之不可不究其寒溫二疫也辛巳年余嘗作

指治至癸巳復作此書見石林避暑錄亦曰宣和間此藥盛行於

京師太學生信之尤篤殺人無數醫頓廢之然不妨留以備寒疫

無使偏廢也

凡例

夫疫雖以三事鍾成。若天行。多假六淫反錯。鬱折而致之者。既有寒溫兩疫。風濕其可不辨。但證似傷濕。而脈色不同。與夫一方相染。長幼同病。即當作疫治。除辟法外。治濕用五苓散。加炙甘草。治風用桂枝湯。加黃芩。無不愈者。其如淫邪交結互織。當以類推之。

五苓散 治傷寒溫熱病。表裡未解。頭痛發熱。口燥咽乾。煩渴引水。水入即吐。或小便不利。及汗出表解。煩渴不止者。宜服之。

又治霍亂吐利方。見傷暑門。加炙甘草一兩。

桂枝黃芩湯 治風疫。脈浮數而不弱。頭項痛。腰脊痛。發熱惡風。其證皆如太陽傷風。但脈浮不弱。相傳染為異耳。

桂枝

去皮

芍藥

黃芩

各一兩半

炙草

一兩

右剉散。每服五錢。水盞半。薑三片。棗一枚。煎七分。去滓。食前服。

沃雪湯 治傷寒溫疫濕疫熱疫

蒼朮

炙草

炮薑

各六兩

防風

乾葛

厚朴

薑汁炒

芍藥

各四兩

右剉散每服三錢半水二盞煎七分服

吳黼堂曰。瘟疫之病。時代不同。病情亦不同。從古無一定之治法也。陳無擇所敘疫病。近世少見。其治法亦未可施諸今日。自海禁大開。醫學愈發明。而疫癘亦愈劇烈。若霍亂疫痧鼠疫。殺人如麻。良可歎息。推原其故。皆由我國下等社會居多。於公共衛生。漫不加意。以致疫癘蔓延。死者動以萬計。講求消毒方法。皆吾黨之責。奉勸各社會。注意於消毒事件。衛人即以自衛也。

瘧敘論

夫瘧備內外不內外三因。外則感四氣。內則動七情。飲食飢飽房室勞逸。皆能致之。經中所謂夏傷暑。秋瘧瘧者。此則因時而序耳。不可