

增訂痘症慈航



增訂痘症慈航



医药大学图书馆版

丁巳仲夏
飲井凶人募刊



增訂痘症慈航自序

自泰西引痘之法盛行而吾國痘科學不講久矣一遇天行痘疫多傳染
夭亡委之氣數殊可哀已回憶十年前戊申之歲天花痘發吾省城台各
鄉罹是疫者男女死亡之數如恒河沙甚至有滅門絕嗣者尤堪憫惻今
歲又逢天符明年戊午更逢太乙天符勿謂歲運不足憑而可置之度外
也不觀乎入春以來各省痘疫如廣州香港山東杭州徐州揚州及上海
等處皆有發現而吾閩患天花不起者亦多且有已種洋痘而重出者日
有所聞但祝彼蒼悔禍少萌即退不至蔓延則杞憂差慰耳然痛定思痛
而欲使天下赤子無夭殤之患非人人具有知識不可蓋天行之痘非用
昔賢相傳之古方良法必不能起死而回生矧看護之學非病家之婦女
講究亦曷克有濟迺檢明季歐陽氏所著痘症慈航此書根據聶久吾活

幼心法折衷羣言叅以閱歷簡明純正似無庸再增奈流傳世間甚少今
欲重刊故不妨再將古今痘書十數種就管見所及手錄而增補之惟是
疹厲之氣既危且險必須廣爲傳布或有補蒼生恨綿力單薄未能普及
幸承 慈善家贊助以印施之其功德良足多矣蒙世習內科於痘症一
門愧未專精還望 海內方家匡所不逮存國粹而保人種當馨香禱祀
以求之增訂既竣謹書緣起於簡端

中華民國六年歲次丁巳仲春花朝

福州鄭奮揚肖巖識于袖海廬

時年六十
有九

增訂痘症慈航目錄

● 上卷 原本

諸家學說折衷 二則

辨虛實寒熱 一則

晰氣血盈虛消長之理 一則

初發熱至痘齊數日調治法並方

痘齊起發灌漿調治法並方

漿足至回水結痂調治法並方

兼症補遺方

孕婦出痘論

炮製用藥之法

目錄

二

啓明印刷公司印



南京中醫藥大學圖書館藏

附紫草考正辨

治痘醫案

● 下卷 新增

運氣論說 四則

先哲格言 七則

名論摘要 六則

預防方法

避忌方法

推拿手法

驚搖瘁法

怪痘須知

異痘形狀

驗方備用



南京中醫藥大學圖書館藏

增訂痘症慈航

明歐陽調律原著 郭士珩崑山叅訂

◎諸家學說折衷

治痘之家多矣。劉河間悉用寒涼。偏害非小。至於錢仲陽立方。亦以解毒爲主。而多用寒涼。少用溫補。張潔古王海藏咸宗之。此其意俱本於內經。諸瘍瘡皆屬心火之一言。故以寒涼瀉心火也。厥後陳文中立方力矯其偏。專主溫補。凡痘已出未出之間。悉用十二味異功散。其意歸重於太陰之一經。蓋以手太陰肺主皮毛。足太陰脾主肌肉。肺經惡寒。脾土惡濕。故用丁香官桂以治肺之寒涼。附半夏以治脾之濕。此方用之得當。其效固大。然不分寒熱虛實。而一概用之。則宜於虛寒。不宜於實熱。其偏害又可知也。朱丹溪解之是矣。至丹溪立論矯陳氏之偏。而取錢氏之長。主於解

毒和中安表。以爲的當。舉世用之數百年。無有議其失者。余則以爲治絕証。丹溪多妙論。至於治痘。則孟浪而未盡其妙。倘亦千慮一失乎。蓋其矯偏於陳氏。而不敢輕用木香桂附等藥。似乎因噎而廢食。其取長於錢氏。而必用芩連牛子之類。以監製參朮朮附補劑。似乎任將而中制。因兵而外監也。其失亦泥於內經諸瘍屬心火之一言。而未透其理也。不知痘疹雖屬心火。却與諸瘍不同。諸瘍之毒。當其初發而未成形。可用藥解散而愈。及至已形而未成膿者。又可用藥逐散而愈。痘毒發自五臟。必借血氣送出於皮膚。運化之而成膿。收結之而成痂。而後收全功也。可解散而愈乎。可未膿而愈乎。故諸瘡以解毒爲主。能解毒於早。則輕。不能解毒於早。則重。痘毒以血氣爲主。血氣能送毒。以灌膿結痂。則生。血氣不能送毒。以灌膿結痂。則死。解毒之藥多損胃氣。不顧血氣之虧損而急於解毒。是猶

可見其稟賦壯實胃氣好飲食如常者其血氣自旺自能送毒氣以成功其痘自始至終多順症此不必解毒也若其稟賦素弱脾胃又弱出痘之時飲食又少或渴或瀉或腹脹或手足冷或氣短促或失聲或痘出不快或根窠不紅活或色白而頂陷或當灌膿而不灌膿當結痂而不結痂皆由血氣不能送毒氣此不可解毒者也當速用溫補以扶胃氣而助血氣若用參芪歸朮等而力不及即加入丁香木香桂附佐之亦不為過又何可參入芩連牛子等涼品以監制溫補之力而損氣血乎所以丹溪未盡其妙者也丹溪又教人用犀角地黃湯以解痘毒後人沿其說失其初意因習而用之以為奇妙而不知其害蓋心者血之主心之所以能主血者以其屬火也痘屬心火正借心火以運用一身之血而成功豈其可瀉而去乎蓋

是皆賦

秉薄弱

之所在

氣血不

足之所

致寒涼

之法得

宜乎非

溫補不

足以回

生

改毒清

並參之

以活氣

血養氣

可見痘

之皆出

人身之血溫則流行寒則凝滯犀角地黃湯涼心經而瀉心火心經既涼心火既瀉則一身之血俱凝滯不行何以運化毒氣成膿結痂乎故內攻之患作而竟以告斃者瀉心火之藥實殺之而人不知也醫者亦竟不悟也可慨也夫余謂痘已出之後未結痂之前凡一切涼心之藥如犀角地黃湯之類姑禁絕不用待痘結痂後用之解餘毒可也或曰若然則未收結之前毒俱不可解乎曰奚爲不可若其血氣與毒氣俱盛者脈必洪數或初出即帶紫黑或既出而稠密紅紫內則煩悶燥渴小便赤澀大便秘結此則屬實熱宜速用清涼之劑以解毒如大便久秘者量入酒炒大黃微利之可也若其毒氣雖盛而血氣未旺者則以解毒爲主而兼活血養氣參芪歸芍之類亦未可離也臨症時須細心審之

近世痘方多宗黃西邱其書自始至終俱分順逆險而立說其謂順者不

全持正
其賦秉
之氣血
然用大
黃似非
盡安

必服藥謂險者宜以保元湯調治。猶近理也。至謂逆者俱不可治。治之徒
勞無功。是教人袖手待斃也。其言不仁之甚。此爲俗醫圖利計則甚便。而
於救濟生成之術則甚乖也。蓋醫者仁術。聖人以之贊助造物之所不及
所貴扶危救困起死回生耳。若治其易治而棄其難治。何以醫爲。惟俗醫
意在圖利。又恐壞名。見有不順者。輒譏棄之。彼誠恐利未必得而徒冒不
識症之名。若是仁人君子當爲死裏求生。豈忍坐視其死而不治乎。故曰
西邱之言便於俗醫而非所以救世也。且其所指逆症多端稠密者多有
之。如發熱而驚悸吐瀉。報痘而先發於天庭司空印堂等處。初出而根巢
無暈。既出而色白灰陷。或發水泡。或癢塌。或當行漿而不行漿。或瀉未落
而寒戰咬牙。皆其所謂逆而不治者也。余每治之而得生者多矣。奈何悉
謂治之無益而戒人勿治乎。唯初出而形如蠶種。既出而紫黑乾枯者。難

寒在虛 實望問 聞切不 持以見 辨之宜 精其他 多科且 可忽略 哉
虛有表 虛裡虛 實有表 實裡實 虛則補 實則實

以灌漿多不可救耳。然明知救之而不活，亦不忍坐視而不救也。

◎辨寒熱虛實之症

凡治病必先辨明寒熱虛實。望聞問切，無非辨此四者而已。四者了然胸中，則用藥取效，其應如響。四者不能分辨，鮮有不悞者。即或中病而愈，亦幸而偶中也。至於痘症之寒熱虛實，尤爲緊要。辨之不明，多致敗事。何歷代治痘之家，著書立方，互相異同。至于虛實寒熱，多略而不辨，或辨而不明，致令檢方者漫無下手處，竟不知某症屬虛寒，某症屬實熱，當用某方。則雖千百妙方，千百妙論，無益於用也。無怪乎自古及今，治痘之家多迷途。而慈幼之術疎也。且痘之虛實寒熱，與諸症之虛實寒熱，固自有辨。諸症有虛者，元氣虛也，宜補之。痘有表虛有裏虛，亦元氣虛也，宜補之。此其相同者也。諸症有實者，邪氣實也，宜瀉之。痘有表實有裏實，此則元氣完。



此處六
用寒涼
總之言
之得其
所宜而
施之

固毒氣不能爲害不可瀉亦不必瀉也此其不同者也諸症有虛之甚者
陰有餘而陽不足則寒自虛生宜溫熱之劑補之也痘有虛之甚者亦陰
有餘而陽不足而寒自虛生亦宜溫熱之劑補之也此其相同者也諸症
有寒自外入者外感也當其在表宜發散之久而入裏則鬱爲熱宜清解
之痘出而風寒外襲宜溫而散或外寒入內而爲吐瀉諸症則宜溫之而
已外不可發汗內不可清解也諸症有虛熱者元氣虛精液竭而火從虛
生補之則熱自除不必解熱也痘亦有虛熱者元氣虛而毒氣肆也當以
補元氣爲主而略兼解毒可也三者皆同有不同也諸症有實熱者血氣
未虧而邪氣壅盛單用寒涼之藥瀉之可也痘亦有實熱者稟氣強血氣
盛而毒氣亦盛亦單用清涼解之可也此又其相同者也今自發熱之初
以至還元之後俱先辨痘之虛實寒熱而各立方於後令人細心審症而

戶音靜
路飲食
大小便
利洩
醫者之
點的

後用藥庶不致虛。虛而實實乎不致於損不足而補有餘乎。不致於以水益寒。而以火益熱乎。然痘之虛實寒熱較之他症尤顯而易察。蓋自見點以致結痂其形其色既昭昭然而可觀。又聽其聲音觀其靜躁視其飲食之多少大小便之利澁三歲以上切其脈之遲數洪細辨虛實寒熱當於黑白之分明而後用藥取效易矣。

◎晰氣血盈虛消長之理

痘瘡全憑氣血以成功。而氣血之盈虛消長其理甚微。不可不透也。蓋氣體天而親上。血體地而親下。痘之出也其高處之泡氣之位也上也。氣宜充焉。其四暈根脚血之位也下也。血宜附焉。泡尖而色白潤是氣尊而居其親上之位也。四圍有暈而色紅活是血附而安其親下之分也。氣居其尊而血安其分。氣血和順而載毒出外此最吉之症。可勿藥而愈也。頂陷

此後却
係氣虛
不能統
血諸者
大宜着
眼

而氣反親下。此氣虧而不能充也。法當補氣。四圍根脚無紅暈。此血虧而不能附也。法當補血。此其理尤易明也。其有通頂紅色成血泡者。血反親上也。此症最險。必不能成漿。至八九日則癢塌而死。然此非獨血盈乃由氣虧而失其居尊之常。故血得以妄行而僭居其位也。急宜大補其氣。氣充則能統血。血自不得泛溢妄行而泡轉白矣。世人不識此理。見其泡紅則謬認爲血熱而用涼血行血之劑。致令氣愈虧而斃愈速也。不亦悲乎。故氣血盈虧之理。微妙而難識也。至於調理氣血。其氣獨虛者。固宜專補其氣。而不宜補血。蓋陽不能從陰。陰愈長則陽愈消也。其有血虛者。多由胃氣損傷。元氣不足所致。則補血宜兼補氣。蓋陰必從陽。陽生則陰長也。黃汝言明醫雜著。乃謂血虛而用參耆以補氣。則陽旺而陰血愈消。甚矣其不明於陰陽消長之理。而立此言爲世大害也。余每治婦人產後去血。

治宜溫
暖而不可
稍寒痘
溫中宜
通中不
可過暖
心不可寒

過多而發大熱婦人血虛崩漏而下血不止以及便血之虛滑者俱用參
耆姜附而佐以血藥與升提藥皆獲奇效安得謂血虛不可補氣乎若小
兒痘瘡以胃氣為主則補血必先補氣故氣血消長之理不可不深明也

◎初發熱至痘出齊數日調治法

大凡調治痘瘡自發熱之初見點之時即當思及如何起發如何灌漿如
何收結一動手用藥便顧首顧尾慎其初以善其後然後次第調治可保
萬全也發熱之初若身熱和緩或熱或退神清氣爽則不必用藥發汗但
戒葷禁風調護而已不必服藥蓋痘有順而不必治者不輕治即所以治
之也其或憎寒壯熱頭痛咳嗽鼻流清涕者多因外感不可不發散也當
視其強弱用藥發散見體質壯實者用加味升麻葛根湯微汗之體質怯
弱者宜用加味參蘇飲汗之然皆不可出汗太多恐慮其表後難起脹灌