

論文選輯

(下集)

福建省中醫研究所編印
人民醫院



婦 科

目 錄

婦 科

中医对妇女月經病的認識及治療.....	(445)
中藥治療痛經一〇三例臨床報告.....	(448)
治療月經過多症八十六例初步報告.....	(454)
治療崩漏一〇八例的初步總結.....	(456)
中医中藥治療婦女經閉總結.....	(459)
一〇七例帶下病的治療.....	(463)
用“增減完帶湯”治療白帶的点滴体会.....	(466)
以草藥山苡米根为主治療白帶三十三例.....	(468)
妊娠惡阻治療總結.....	(469)
紫斑病的認識.....	(472)

兒 科

治療乳幼兒消化不良症一百八十九例臨床治療的觀察和体会.....	(477)
治療乳兒“馬牙”六十例報告.....	(481)
治療小兒慢性胃腸炎介紹.....	(482)
加味麻杏石甘湯治療小兒肺風痰喘一百七十八例.....	(485)
加味小膏龍湯配合野花生合劑治療小兒哮喘三十三例臨床觀察.....	(487)
小兒麻痺症二例療效介紹.....	(490)

外、傷、骨科

論外科的內治法.....	(491)
中西医協作治愈不同类型的嚴重破傷風病例.....	(493)
中医治療癱瘓病一百二十三例.....	(496)
潰瘍型癱瘓(附八例報告).....	(500)
介紹祖傳癱瘓療法.....	(502)
中医治愈疔瘡三十七例臨床療效.....	(503)
紫蘇流氣飲治療“腎氣游風”八.....	(506)
治療頭癰病二十八例療效報告.....	(508)
草藥治愈二十六年陰囊濕疹.....	(510)
草藥治療疝氣五十一例初步報告.....	(511)
“凍瘡”及其療法.....	(514)
軀干部挫傷、扭傷二百八十三例治療報告.....	(515)

中醫治療骨折初步總結·····	(518)
骨折中醫療法初步報告·····	(522)
草藥與外敷治療新舊傷四十例初步總結·····	(527)
草藥治療“漏肩風”五十例初步總結·····	(530)
治療蛇傷三十一例初步總結·····	(532)
介紹毒蛇咬傷的療法·····	(535)

眼、五官科

對五輪、八廓的名稱和排列的商榷·····	(537)
治療砂眼二〇四例初步報告·····	(540)
治療砂眼五〇七例初步報告·····	(544)
治療眼外傷二〇九例初步報告·····	(549)
治療天行赤眼二三八例初步總結·····	(552)
治療“白陷”(角膜潰瘍)一三七例初步報告·····	(555)
麻杏石甘湯加地龍干治療鼻淵(慢性鼻竇炎)十一例·····	(558)

痔瘡科

祖國醫學有關痔瘡的記載·····	(561)
作“灰皂散枯痔法”治療核的初步經驗·····	(567)
用“灰皂散枯痔法”繼續治療痔核一七〇例分析報道·····	(571)
枯痔釘治療內痔核二二六八例初步報告·····	(577)
挂錢療法治療肛直腸瘻一〇四例初步報告·····	(583)
血栓外痔七十六例治療初步總結報告·····	(589)
嵌頓性內痔核的處理·····	(592)
明矾壓縮療法附四十例報告·····	(594)
人造肛瘻治療肛門狹窄十三例效果報告·····	(596)

經絡、針灸

針灸補瀉的我見·····	(601)
談十二經井、榮、俞、經、合及其治病範圍·····	(602)
釋傷寒經義，用針灸療法的商榷·····	(603)
經絡的起源與發展·····	(605)
經絡現象及其實質問題的初步觀察與探討·····	(608)
躍進型經絡測定器對一一〇三名健康青年人十二經原穴平均值的觀察·····	(627)
躍進型經絡測定器對三九七例肺結核病人十二原穴測定的觀察·····	(633)
針灸治療八六五例風濕性關節炎的初步報告·····	(639)
針刺配合藥電燙治療四十五例風濕性關節炎臨床初步觀察·····	(646)
針灸治療十二指腸潰瘍病的療效初步觀察·····	(649)
針刺治療神經衰弱三百七十六例·····	(653)
針灸治療三十二例偏頭痛的初步報告·····	(655)
針灸治療八十七例頭痛症·····	(658)

針灸治療五十四例顏面神經麻痺的觀察報告.....	(362)
針灸治療二十三例慢性蕁麻疹報告.....	(366)
在廈工地的針灸療法.....	(669)
針刺代導尿一例的治驗.....	(671)
小便失禁針灸治療一例.....	(672)
針治瘰癧二例.....	(673)
腰痛針灸療法經驗介紹.....	(675)
針灸關元穴治療無精虫症一例.....	(677)
針灸治愈室女經閉一例.....	(679)
針灸治愈遺精一例.....	(680)
我对量針的認識和体会.....	(681)
針灸電療器的構造及其應用.....	(684)

按摩氣功

內功和壓痛點在治療上的作用初步探索.....	(689)
對按摩治近視眼的理論探討.....	(691)
內功按摩方法與按摩治療近視簡介.....	(694)
按摩療法治療四十九例近視眼的初步介紹.....	(697)
按摩療法治療近視眼的繼續觀察.....	(700)
按摩療法治療乙型腦炎後遺症精神失常一例報告.....	(703)
視神經萎縮的按摩療法介紹.....	(705)
內功按摩治療遺尿症.....	(703)
內功按摩治療風濕性關節炎三例.....	(708)
針刺按摩治愈坐骨神經炎一例報告.....	(710)
氣功療法對十二指腸潰瘍合併胃下垂及神經衰弱的療效.....	(712)
感冒的民間療法——“刮痧”.....	(714)

中藥

野生植物殺蚊蠅幼蟲篩選試驗小結.....	(717)
九十一種中藥對降壓作用的初步總結報告.....	(721)
炒杜仲和生杜仲的藥理實驗報告.....	(730)
闊葉十大功勞中小藥礮（黃連素）提取經過的初步報告.....	(733)
中藥對結核桿菌的抑菌試驗.....	(735)
幾種民間外用植物性中藥在試管中殺滅陰道滴蟲作用的觀察.....	(736)
三十六種草藥對痢疾桿菌抗菌效能的初步報告.....	(739)
民間草藥“萬年青”對傷寒桿菌、副傷寒A桿菌、副傷寒B桿菌和類屬O型桿菌的抑菌 實驗初步觀察.....	(742)
四季春草.....	(743)
介紹民間治痢草藥——龍芽草.....	(744)
連錢草與積雪草的辨別.....	(745)
紫草與紫草茸的考証.....	(746)

中藥紫草根、紫草茸与紫草片的辨識.....	(748)
关于紫珠与紫荆的名实問題.....	(749)
石胡荽与天胡荽.....	(750)
关于鹽虫和煎虫的分辨.....	(751)
黄(紅)升丹及白降丹中汞化合物的測定方法.....	(752)
“白降丹”的制法及其臨床应用.....	(754)
种植“无患子”樹可以滅螺.....	(757)

中医护理

中医內科病房护理特点.....	(758)
麻疹的中医护理.....	(761)
对痢疾的觀察与护理.....	(763)
湿溫病的护理.....	(765)
慢性腎炎的中医护理認識及体会.....	(767)
黃疸病中医护理点滴体会.....	(770)
骨折中医护理的点滴体会.....	(771)
中医治療痔瘻的护理.....	(774)
中風的中医护理.....	(776)

其 他

中藥代替檢驗試剂的介紹.....	(778)
牡蠣白芨胶混剂代替銀餐經驗介紹.....	(780)

附 录

中医对妇女月經病的認識及治療

仲景樓內科 曾益謙

祖國醫學史載名醫扁鵲作帶下醫，他是我國醫學史上最早有名的婦科。其次太倉公（原姓淳于名意，因為做過太倉長，世稱太倉公）為濟北王侍醫女月事不下醫，也是婦科的傑出人材。因此可見古代醫學家對於婦科的重視，並且歷代名醫關於婦科方面的著作也相當豐富。筆者研究婦科有年，僅以管見所及介紹如下：

月經的生理

遠在我國二千年前，黃帝內經素問上古天真論說：“女子七歲腎氣盛，齒更髮長；二七而天癸至，任脈通，太沖脈盛，月事以時下，故有子；七七任脈虛，太沖脈衰少，天癸竭，地道不通，故形懷而无子”。這是說明健康女子到了十四歲為性成熟期，每月有一次多量稠粘的血液，從生殖器官內排泄出來，叫做月經，直到經絕時期，約在四十九歲為止。同時也可見古人已知道月經是女子生理常態，並且與生育有關係的。

女子的月經除在妊娠期外，每月都有一定的時間來潮一次，所以中醫書籍中也有叫做月信或月水，這是生理的常態。如隔月不來，或一月來了兩次，或每月不能按一定時間，這是異常的月經，就是病態了。此外中醫籍中也有記載生理的變態，就是兩月一行，沒有發生病狀的，是名“并月”，三月一行是叫“居經”（俗稱按季），一年一行就是“避年”，一生不行能夠受孕者，這就叫做“暗經”，這都是生理性變化的現象。

月經病的原因

月經不能按時或者來時發生病變，這都叫做異常月經，如經期到時發現衄血、吐血的病征，是名倒經。月經閉止不行名叫閉經。月經連來不止，是名崩漏。經來錯亂無有定期，是名亂經。如果懷孕之後仍有排紅，就名漏紅（胎漏）。這些都是月經異常的病變。經病原因可分三點，概述如下：

（1）由於外來之因素引起的叫做外因。例如由於風、寒、暑、濕、燥、火六淫的邪氣對機體的影響，造成月經異常。

（2）由於機體內在的因素，叫做內因。如憂、思、悲、怒、恐、懼等七情的刺激，而引起月經不調的病變，如素問陰陽別論說“二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月”。所謂不得隱曲，就是精神抑鬱的意思。

（3）不屬於六淫和七情的影響者，叫做不內外因，這是由於內傷飲食，或性欲過度，或生產太多，損傷陰血，以及子宮本身種種病變等。

月經病的診斷

中醫在臨床診斷，主要用望、聞、問、切——四診和陰、陽、表、里、寒、熱、虛、實——八綱，進行辨證，茲略述如下：（1）血熱：血熱月經多數先期而至，我們更當審察病人體質、脈象及各種見症，以別虛熱實熱。如果體實、脈象弦滑、月經量多而色赤，飲食畏熱喜冷，這是屬實熱的表現，須與清火涼血之藥；如體虛、脈象微數、月經量少而色紫黑，這就是屬虛熱的表現，須與補血涼血之藥。（2）血寒經遲：血寒月經病多數過期，是由於素體虛寒，陽氣不足，寒甚血滯所致。經來量少色

滯，脈微細，怕冷喜熱，宜投以溫養血氣之藥。(3)血虛經亂：血虛經期多數不定，或前或后，或過期不來，或來后腹痛增劇，血少色淡，精神疲倦，腰腿如折，脈息微弱，神色不佳，宜投以補血調氣之藥。(4)血滯經閉：經閉就是月經閉止不行。此病系為瘀血積蓄，新血不生所致。多見於虛損勞瘵及嚴重貧血之人，俗名叫做“干血癆”。除原因治療外，并參以補血、通經逐瘀之藥。(5)血枯經閉：婦女多因心情抑郁，或房勞不節，或生產過多，營養不良，致月經逐漸稀少，甚至枯滯不行。病者有時有潮熱、疲倦、懶食等症狀，宜用宣郁補血通經之藥。(6)經行腹痛：痛在經后為氣血虛弱，痛在經前為氣血凝滯，多見小腹脹滿疼痛，宜用溫補氣血或行氣活血之藥。

月經病的治療原則

如先病而后經不調者，當先治病，病去而經自調。先經不調而后病者，當先調經，其病自愈。但是調經的方法，以養血為主，養血又必以調氣為先。血熱者佐以涼血之藥，血寒者佐以溫經之劑，虛者補之，實者瀉之，這就是治療月經病的原則。

月經病常用的方劑：

1. 四物湯：主治婦人月經不調，臍腹痠痛，腰中疼痛，或崩中漏下。

藥品組成：熟地、當歸、川芎、白芍。

2. 溫經湯：主治氣血虛損，月經不調，或經來過久，或過期不行。

藥品組成：吳萸、當歸、川芎、白芍、人參、桂枝、阿膠、丹皮、甘草、生姜、半夏、麥冬。

3. 四制香附丸：主治婦人女子經候不調，有調經、養血、順氣、受孕之效。

藥品組成：香附、當歸、熟地、白芍、川芎、譚蘭叶、白朮、陳皮、黃柏、甘草。

4. 艾附煖宮丸：主治婦人經水不調，小腹時痛，赤白帶下，子宮寒冷。

藥品組成：香附、艾叶、當歸、川芎、白芍、生地、元胡、甘草。

5. 牛膝散：主治月水不利，臍腹作痛。

藥物組成：牛膝、桂心、赤芍、桃仁、元胡、當歸、木香、丹皮。

6. 先期湯：主治經水先期而來，解涼血調經。

藥物組成：當歸、白芍、生地、黃柏、知母、黃芩、川連、川芎、阿膠、艾叶、香附、炙甘草。

7. 過期飲：主治經水過期不行屬於血虛，氣滯者，此方有補血行氣之功。

藥品組成：當歸、白芍、熟地、香附、川芎、紅花、桃仁、莪朮、木通、炙草、肉桂。

8. 膠艾湯：主治勞傷氣血，沖任虛損，月水過多，淋瀝不止。

藥品組成：熟地、白芍、當歸、艾叶、阿膠、川芎、炙草。

9. 四生丸：主治陽盛陰虛，血熱妄行或吐或衄。

藥品組成：側柏叶、艾叶、生地黃、荷葉。

10. 龍胆瀉肝湯：主治肝濕熱郁滯，脅痛、口苦、耳聾、筋癢、白帶、洩血、或腹中作痛，小便澀滯，陰腫痛等。

藥品組成：龍胆草、生梔子、黃芩、澤瀉、柴胡、車前、木通、生地黃、當歸、甘草。

11. 黑歸脾湯：主治思慮傷脾，不能攝血，致血妄行，或怔忡健忘、驚悸、盜汗、發熱體倦、食少不眠等，此方能引血歸經。

藥品組成：人參、酸棗仁、遠志、木香、炙草、白朮、黃耆、龍眼肉、熟地黃、當歸、抱木神。

12. 八珍湯：主治氣血兩虛，能調和陰陽。

藥品組成：人參、茯苓、白朮、炙甘草、當歸、熟地、白芍、川芎。

13. 人參養榮丸：主治脾肺兩虛，發熱惡寒，肢體疲倦，食少作瀉，口干心悸，自汗等症。

藥品組成：肉桂、黃耆、當歸、白芍、熟地、人參、茯苓、炙甘草、遠志、陳皮、五味、白朮。

14. 逍遙散：主治婦人經水不調，血虛火旺，仰郁不樂，兩脅作痛，骨蒸勞熱，咳嗽潮熱，往來寒熱等。

藥品組成：柴胡、當歸、白芍、白朮、茯苓、甘草、加煨姜、薄荷、再加丹皮、梔子，名丹梔逍

遙散。

15. 越鞠丸：主治痰、食、湿、气、血諸般郁結，胸脅痞悶，吞酸嘔吐，飲食不消等症。

藥品組成：香附、川芎、蒼朮、梔子、神麴。

16. 琥珀散：主治婦人月經壅滯，小腹疼痛不可忍，及產后惡露不快，氣上搶心，迷悶不省，絕欲死者。

藥品組成：三稜、莪朮、赤芍、當歸、劉寄奴、丹皮、熟地、肉桂、烏藥、元胡。

17. 烏藥湯：主治血滯疼痛。

藥品組成：烏藥、香附、當歸、木香、甘草。

18. 加味烏藥湯：主治婦人經水欲來，臍腹疼痛。

藥品組成：烏藥、縮砂、木香、元胡、甘草、香附、檳榔。

19. 失笑散：主治產后心腹絞痛欲死，或胞衣不下。

藥品組成：蒲黃、五靈脂。

20. 大補陰丸：主治降陰大補腎水。

藥品組成：龜板、熟地、黃柏、知母。

中藥治療痛經一〇三例臨床報告

婦 科

痛經是婦科月經病的一種症狀，為婦科臨床上所恆見，嚴重影響婦女健康。中醫古籍對本病病因病理有很詳細的認識。王海藏曰：經事行，臍腹絞痛者血澀也。朱丹溪曰：經將行，腹痛屬氣滯，又曰：經將來，腹中陣痛乍痛乍止者，血熱氣實也。傅青主曰：經水未來腹先痛，是熱極而火不化。夫肝屬木，其中有火舒則通暢，郁則不揚，經欲行而肝不應則抑拂其氣而疼生。陳良甫曰：經來腹痛，由於風冷客于胞絡，傷于沖任。戴元禮曰：經事來而腹痛，不來而腹亦痛，皆血之不調故也。張景岳曰：婦人經行，腹中作痛挾虛者多，全實者少，即在腹之拒按與否。朱丹溪曰：經水過後作痛是氣血俱虛也，虛中有熱，經後亦疼痛。張景岳曰：虛者痛于既行之後，血去而痛未止或血去而痛益甚有氣虛血虛之分也，根據臨床辨證本病有寒熱虛實之分。①“寒”血本陰性，得寒則凝，得熱則行，設遇風冷乘虛客于胞門寒濕，傷于沖任，多見腹中絞痛如刺，寒熱交作或下黑豆汁液。②“熱”婦人性多忿郁肝郁生火血藏于肝，火熾則血熱，熱則紫黑凝塊，氣為血帥，氣行血亦行，氣郁不暢血不運行則腹疼痛。③“虛”素常氣血虧損經行之後，血愈虛而氣，愈滯或虛中有熱氣，血不諧則生腹痛。④“實”瘀血凝聚痰氣，食積寒冷外襲，胞絡閉塞而生腹痛。關於本病治療原則，還要根據四診方法八綱准繩，本寒者溫之，熱者寒之，虛者補之，實者瀉之等方法來治療。茲結合月經過程中，疼痛發生時期分為“經前腹痛”、“經來腹痛”、“經後腹痛”等三類型分述于下：

（一）經前腹痛

寒型症狀：經水未潮臍腹絞痛，口中和喜煖飲或寒熱交作或但寒無熱，或四肢厥冷，二便如常。

脈象：沉澹，濡細。

舌苔：白滑，淡白。

病因：風冷客于胞門，寒濕傷及沖任，沖為血海，任主胞胎，為婦人血室，經事欲來，邪與血爭故作腹痛。

治法：溫經、散寒、活血、調氣。

熱型症狀：胸室脅滿兩乳，脹痛口苦，咽干五心發熱，性情急躁，腹部疼痛便結澀熱。

脈象：弦急，弦滑。

舌苔：黃燥，淡赤。

病因：肝屬木喜疏泄舒則通暢，郁則不揚，郁火內燃氣血失調，故生腹痛。

治法：疏肝解郁清火調氣。

虛型症狀：經候欲行，四肢痠楚，面色不榮，精神倦怠，腹疼痛喜按揉。

脈象：細軟，虛弦。

舌苔：薄白，光潤。

病因：肝脾兩虧，氣血不足，或血虛內熱，經氣滯澀而生腹痛。

治法：補肝脾調氣血。

實型症狀：腹部脹痛，而拒按或痛引兩脇，肢末麻痺，或手足心發熱。

脈象：弦澹，沉遲。

舌苔：薄白，淡黃。

病因：血滯氣滯，留瘀不行，胞宮受阻遂致腹痛。

治法：行气活血宣郁通瘀。

（二）經來腹痛。

寒型症狀：月經來潮，小腹疼痛，唇青面白，或手足寒冷，經色淡紅，或如黑豆汁。

脈象：迟弱，沉澹。

舌苔：白滑，淡白。

病因：寒濕外乘胞脈，受阻血海本喜正氣相通，最惡邪氣侵犯，寒濕相搏，氣血運行不暢，宜乎小腹疼痛而肢冷。

治法：散寒活血調氣溫經。

熱型症狀：小腹刺痛，經色紫黑，凝塊，痛引兩脇或迫吐衄口苦心煩，手足心發熱。

脈象：弦緊，弦滑。

舌苔：淡赤，黃燥。

病因：肝氣郁結，郁則生火氣熱則血熱，氣滯則血滯紫者，氣之熱黑者，熱之甚故小腹刺痛，火性炎上故迫吐衄。

治法：清熱和血疏氣順經。

虛型症狀：經潮量多，精神疲憊肢體無力，面色無華，食慾不振，腹痛喜按大便稀溏。

脈象：濡細，虛軟。

舌苔：淡滑，薄白。

病因：脾氣虛弱，血液不足，氣滯不暢，故腹痛而喜按。

治法：健脾補血，調氣定痛。

實型症狀：經量澀少，或有小塊宿血，腹痛拒按之脹，鞭而痛劇。

脈象：沉實，弦緊。

舌苔：薄白，淡滑。

病因：寒濕乘適氣血失調，積瘀停聚不易下行，致使腹痛拒按，經量澀少。

治法：活血通瘀，調氣行經。

（三）經后腹痛

寒型症狀：月經行后，腹中綿綿走痛，面色蒼白，四肢疲憊，常見惡寒，喜食溫煖，食慾不振，便滑洩利。

脈象：細弱，濡軟。

病因：經后血虛寒氣外乘，脾陽不振，血行而氣滯，故腹中綿綿走痛。

治法：健脾補血，調氣散寒。

熱型症狀：

經后腹中疼痛，口干咽燥，喜冷飲五心發熱，心悸而煩便結澀赤。

脈象：弦數，虛弦。

舌苔：質紅無苔，淡赤。

病因：肝旺血熱，氣失條達，致使腹中疼痛而諸恙兼見。

治法：柔肝清熱，養血疏氣。

虛型症狀：腹中疼痛，喜按喜揉則感舒適，腰痠如折，肢體無力，面色不榮，精神疲憊。

脈象：沉細，濡軟。

病因：氣血俱虛腎水虧，肝氣滯，故腹痛而喜按。

治法：補氣血，養肝腎稍寓調氣。

實型症狀：

經雖淨止，潮而不暢，腹痛拒按肢痺腰疼。

脈象：弦數，沉弦。

舌苔：淡黃，薄白。

病因：經氣滯滯血行未暢，胞絡失調，致腹痛拒按。

治法：行氣活血，通調胞絡。

通过臨床实践对于經前腹痛，經來腹痛，經后腹痛，虽分三型，按其寒熱虛實略舉脈，因証治至于寒中有熱，熱中有寒，虛中有實，實中有虛，虽以縷析，更須察其形氣稟質，兼而辨之当以察意言不悉也。

療 效 統 計

類 型	病 例		全 愈		基 本 治 愈		其 他	
	例 數	百分比%	例 數	百分比%	例 數	百分比%	數 目	占本类%
經前腹痛	53	51.46	24	45.28	24	45.28	5	9.44
經來腹痛	38	36.89	20	52.63	16	42.11	2	5.26
經后腹痛	12	10.65	7	58.33	4	33.33	1	8.34
總 計	103	100	51	49.51	44	42.72	8	7.77

病 例 介 紹

楊淑金 女性 二十八歲 住山東嶺 1959年3月9日。

症狀：結婚八載未生育，于三年來每月經前便感兩乳脹悶，手足心熱，四肢疲憊，小腹疼痛，潮時痛劇，經色紫黑，二便如常。

脈象：弦滑，舌苔淡赤。

病因：厥陰木郁則生火氣失榮血不運行，致使經前乳脹小腹劇痛，經包紫黑經量滯少。

治法：解肝郁泄肝火清血熱以通經擬以宣郁通經湯加減主之。

處方：軟毛柴一錢五分，白芍二錢，丹皮一錢五分，生梔一錢，真以郁一錢，當歸一錢五分，枯芩一錢五分，金鈴三錢，元胡索二錢，甘草一錢，服二劑。

復診日期：1959年3月11日。

服藥后乳脹腹痛見瘳月經將屆周期仍以前法繼治。

處方：鯀血柴一錢五分，赤白芍四錢，丹皮一錢五分，生梔二錢，金鈴三錢，北丹參三錢，大烏豆八錢，當歸二錢，郁金一錢，甘草一錢服二劑。

復診日期：1959年4月6日

前月服藥四劑兩乳脹減。月經潮時小腹無劇痛有顯著減輕經色較見鮮紅現距經期尚有數天乳脹腹痛比前減瘳，脈象弦舌淡赤仍宜解郁清熱。

處方：北丹參三錢，赤白芍四錢，當歸五錢，魯豆六錢，鯀血柴一錢，蘇丹皮五錢，生梔二錢，金鈴三錢，生地黃三錢，台烏藥二錢，甘草一錢，服二劑

復診日期：1959年4月9日

腹痛輕而未除乳脹已不感覺

處方：丹皮五錢，生梔二錢，赤芍二錢，白芍二錢，金鈴三錢，香附五錢，丹參三錢，魯豆八錢，當歸二錢，生地三錢。

復診日期：1959年4月13日

症狀如上述

處方：丹參三錢，魯豆六錢，鯀血柴一錢，赤白芍四錢，當歸五錢，金鈴三錢，生地三錢，云茯苓四錢，粉甘草一錢。

復診日期：1959年5月8日

前月經潮均感舒適腹痛全癒，現近經期再予療治。

處方：丹梔逍遙散一兩五錢 丹參三錢 烏豆八錢 川練子三錢 烏藥二錢 服三劑

吳三妹 女性 二十二歲 住鯊峯坊 日期1959年1月6日

症狀：去年3月間月經適潮突患，腹部劇痛以後按月均如是昨夜經潮腹痛如刺經色淡

脈象：沉澹 舌苔：白滑

病因：寒氣客于胞門冲任二脈受阻

治法：溫經散寒調氣活血

處方：十二味溫經湯二兩 艾叶一錢 香附二錢 烏藥三錢 服二劑

復診日期：1959年1月8日

服藥後腹痛緩解經色轉見鮮紅經量不多仍宜調氣活血

處方：四物片十六片 丹參三錢 松香一錢 春砂一錢 艾叶五錢 香附二錢 金鈴三錢 烏藥三錢 服二劑

復診日期：1959年1月11日

腹痛止經已淨四肢疲憊

處方：婦科八珍丸一兩 服三劑

復診日期：1959年2月4日

本早經潮腹痛不如以往之劇

經量如恆。脈象：濡緩 舌苔：薄白

處方：艾叶五錢 香附二錢 四物片十六片 金鈴三錢 丹參三錢 松香一錢 砂仁一錢 服一

劑復診日期：1959年2月5日

腹痛更輕，經色鮮紅

處方：四物湯一兩二錢 益母草五錢 香附一錢五分

復診日期1959年4月7日

前月經行無腹痛昨夜來潮腹部亦感舒適惟見肢痠無力經量正常

處方：婦科八珍丸一兩二錢 烏藥二錢

洪玉霞 女性 三十三歲 住中平路 日期1959年3月16日

症狀：二年來月經來潮甫淨腹部疼痛，潮劇喜按揉則舒適面色不榮，四肢疲乏腰痠如折，大便隔日通，小溲如常。

脈象：濡弱 舌苔：淡白

病因：肝脾腎交虧氣血虛弱故經後腹痛腰痠如折

治法：調養氣血，益肝補腎健脾

處方：柴芍六味湯二兩 當歸一錢五分 阿膠三錢 金鈴三錢 烏藥三錢 淮山四錢

復診日期：1959年3月18日

腹痛已減腰痠亦瘳

處方：照上方再服二劑

復診日期：1959年3月21日

腹痛已止精神舒適

處方：歸脾湯二兩 生熟草一錢 生熟芍三錢

復診日期：1959年4月20日

本月14日經潮約五天淨止無腹痛惟四肢無力，腰痠仍以前法續治

處方：歸脾湯二兩 山黃三錢 杜仲五錢 續斷五錢

方 劑 分 析

宣郁通經湯

功能：疎肝降火調氣補血解郁通經

藥物：丹皮 生梔 當歸 白芍 黃芩 柴胡 香附 郁金 甘草

逍遙散

功能：解肝郁而泄熱清火，益營血以養肝，助土德以升木

藥物：柴胡 白芍 當歸 白朮 茯苓 甘草（姜薄酌用）

加味逍遙散即原方加丹皮 生梔

大溫經湯

功能：溫經散寒補血行血

藥物：川芎 當歸 白芍 人參 生姜 桂心 吳萸 阿膠 丹皮 半夏 麥冬 甘草

小溫經湯

功能：溫經散寒調氣活血

藥物：當歸 附子

四物湯

功能：補血虛滋陰血

藥物：川芎 當歸 白芍 熟地

艾附丸

功能：解氣結行經脈

藥物：蘼艾 香附 當歸

婦科八珍丸

功能：調氣補血培養中土

藥物：人參 白朮 茯苓 甘草 川芎 當歸 白芍 地黃 香附 羌附子

柴芍六君湯

功能：疎木培土祛濕化痰

藥物：柴胡 白芍 人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏 甘草

柴芍六味湯

功能：調肝氣以達郁壯腎水以制火

藥物：毛柴胡 白芍 熟地 山萸 云茯苓 澤瀉 淮山 丹皮

柴芍歸脾湯

功能：健脾陽交心腎疎肝郁調諸氣

藥物：人參 白朮 黃耆 茯神 遠志 棗仁 木香 龍眼 當歸 甘草 柴胡 杭芍

調肝湯

功能：平肝調氣補腎壯水

藥物：當歸 白芍 山藥 山萸 巴戟 阿膠 甘草

地黃湯

功能：補血虛清肉熱

藥物：川芎 當歸 白芍 生地 白朮 黃柏 炙甘草

丹參飲

功能：活血行氣去瘀生新

藥物：丹參 松香 砂仁

金鈴子散

功能：引火下行活血定痛

藥物：金鈴 元胡

小 結

①通過治療痛經一百零三例認識中藥對於本病確有療效，惟按患病時日新久有所不同，新患者奏

效易久患者根治难必須每月經前服藥治于未痛之先予以調節，由于此病月只一次一般妇女恆多忽略久而久之治不免療程增長或治未全功而中止。

②以上所列方剂在臨床上随症加減灵活应用。

③为着保障妇女身体健康，本科同人在党的教育培养下，今后更应努力钻研提高治療效率为人民保健事業而奋斗。

治療月經過多症八十六例初步報告

婦 科

前 言

月經過多，人多忽視，揆其原因，由損傷經脈，沖任之氣虧損，不能制其經血所致，這是婦科最常見的疾患。不但會影響婦女工作、學習和身體健康，尤甚者會發展崩中漏下，致使面目萎黃嚴重貧血或絕子不產，更甚者且有生命的危險。我院婦科最近治療本症八十六例，收效尚佳，特初步報告如下：

病 名

月經過多在古代文獻里記載很早，如內經陰陽別論曰：“陰虛陽搏謂之崩”。巢氏病源崩漏條云：“出血過多是損傷沖任之脈，謂之崩中。沖任氣虛，不能約制經血，故忽然崩下”。又有“時崩時止，淋漓不斷，名曰崩漏”。總而言之均屬於月經過多範疇。

症 狀

月經過多症概括可分二個類型，即血虛與血熱兩種。（1）血虛屬陰症，症見面色萎黃，四肢酸楚，怔忡不寐，神倦嗜睡，脈虛弱細軟，血色鮮紅或成塊。（2）血熱屬陽症，症見面赤心煩，口苦舌絳，咽干，腰腹酸痛，大便燥，血色紫暗成塊，脈弦數。

治 疗 与 方 剂

因脾胃虛弱不能統血者，屬血虛類型，用歸脾湯加味“參、朮、茯神、耆、遠志、木香、炙草、棗仁、龍眼、金櫻、芡實”以養血扶脾；若肝經熱熾，迫血妄行者，屬血熱類型，用加減四生丸加味（生地、側柏、地榆、貫眾、梅蓉）以涼血清熱。倘出血過多者，加三七止血；虛甚者加路黨、仙鶴草、杜仲、續斷；熱甚加生地、龜板、知母、黃柏等隨症加減。

治 疗 結 果

八十六例中，屬於血虛用歸脾湯加味者五十一例，全愈十四例，基本治癒三十六例，不明一例；屬於血熱用加減四生丸者三十五例，全愈十二例，基本治癒十七例，原因不明五例，無效一例。但治癒有快慢，一般服藥三至六次可逐漸消失，病重者一般服藥七至十次或十至十五次。所謂全愈者，指血止，體力恢復；基本治癒者，以血止，體力較差；不明者，指來診一次未再復診；無效指原有症狀未減，茲將治療效果列表如下：

有 效 次 數	3次以內	4—6次	7—10次	11—16次	共 計	百 分 比
例 數	23	33	15	9	80	100
全 愈 例 數	3	9	10	4	26	30.2
基 本 全 愈 例 數	17	27	5	4	53	61.6
不明和未療效例數	6	0	0	1	7	8.1