

2012

全国护士执业资格考试

通关必练880题



策划◎文都医学考试研究中心
编著◎吴瑞



中国时代经济出版社

2012

全国护士执业资格考试

通关必练880题



中国医学出版社
中国医学出版社



中国医学出版社

00635099

 文都教育TM

2012

全国护士执业资格考试

通关必练880题

策划◎文都医学考试研究中心

编著◎吴瑞



14100006350997



 中国时代经济出版社



图书在版编目(CIP)数据

全国护士执业资格考试通关必练 880 题/ 吴瑞编著. —北京:

中国时代经济出版社, 2012. 2

ISBN 978-7-5119-1033-2

I. ①全… II. ①吴… III. ①护士—资格考试—习题集 IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 002726 号

书 名: 全国护士执业资格考试通关必练 880 题
编 著: 吴瑞

出版发行: 中国时代经济出版社

社 址: 北京市丰台区右安门外玉林里 25 号

邮政编码: 100069

发行热线: (010) 83910203

传 真: (010) 83910203

网 址: www.cmepub.com.cn

电子邮箱: zgsgdjj@hotmail.com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京长阳汇文印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16

字 数: 100 千字

印 张: 8

版 次: 2012 年 2 月第 1 版

印 次: 2012 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5119-1033-2

定 价: 22.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系更换

版权所有 侵权必究

致读者

根据《护士条例》《护士执业资格考试办法》(2010年卫生部、人力资源社会保障部令第74号令)精神,护士岗位实行准入制度,护士必须通过护士执业资格考试才能申请执业注册。护士执业资格考试实行统一大纲、统一命题、统一合格标准的国家统一考试制度。考试原则上每年举行一次,自2011年起,护士执业资格考试由原来四个科目变为专业实务和实践能力两个科目,一次考试通过两个科目为成绩合格。考试内容也打破原来的内、外、妇、儿、基五大板块的划分,变成将疾病按系统、器官分类,增加了精神障碍、中医基础知识及部分临床疾病以及护理管理、人际沟通、护理伦理与法规等社会人文的内容。

本书是贯彻护士执业资格考试相关文件精神,依据最新考试大纲,深入总结历年考试的命题规律后精心编写而成。全书共分21章,在编著的过程中遵循严谨、科学的原则,提炼总结出历年考点,然后编写对应习题,题型全面,题量丰富,便于考生迅速牢固的掌握知识点,把握命题方向。

本书配有教学光盘,精讲考点与答题技巧。与本书配套出版的还有《护士执业资格考试通关必备》,能让考生在认真做完本书习题后可以对照知识点,举一反三,以点带面,巩固所建立的知识体系,从而更好的复习。

预祝您经过刻苦学习,一举通关!

编辑部敬上

2012.1

目 录

第一章	基础护理知识和技能	(1)
第二章	循环系统疾病病人的护理	(10)
第三章	消化系统疾病病人的护理	(17)
第四章	呼吸系统疾病病人的护理	(27)
第五章	传染病病人的护理	(34)
第六章	皮肤及皮下组织疾病病人的护理	(40)
第七章	妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理	(43)
第八章	新生儿及新生儿疾病的护理	(50)
第九章	泌尿生殖系统疾病的护理	(54)
第十章	精神障碍病人的护理	(61)
第十一章	损伤、中毒病人的护理	(65)
第十二章	肌肉骨骼系统和结缔组织疾病病人的护理	(72)
第十三章	肿瘤病人的护理	(76)
第十四章	血液、造血器官及免疫疾病病人的护理	(83)
第十五章	内分泌、营养及代谢疾病病人的护理	(88)
第十七章	生命发展保健.....	(103)
第十八章	中医基础知识.....	(108)
第二十章	护理伦理.....	(114)
第二十一章	人际沟通.....	(115)

第一章 基础护理知识和技能

考点:护理程序

1. 下列哪项不是有关“护理程序”概念的叙述
 - A. 是一系列有目的、有计划的护理活动
 - B. 具有决策和反馈功能的过程
 - C. 是以解决问题论为框架
 - D. 是一个综合,具有决策和反馈功能的过程
 - E. 对护理对象进行主动、全面的整体护理
2. 护理评估的作用,错误的叙述是
 - A. 是护理程序的开始,并贯穿于整个护理过程之中
 - B. 护士通过与病人的交谈、观察、护理体检等方法进行
 - C. 随时评估病人住院期间出现的新问题
 - D. 有目的、有计划、客观地收集护理资料
 - E. 为护理活动提供可靠的依据
3. 以下属于主观因素的是
 - A. 食欲不振
 - B. 心脏吹风样杂音
 - C. 口唇青紫
 - D. 青霉素皮试阳性
 - E. 肉眼血尿
4. 为住院病人进行护理评估时,收集资料的关键在于
 - A. 护士的经验
 - B. 护士的观察能力
 - C. 取得病人的信任

D. 护士的态度

E. 护士的沟通技巧

5. 关于护理诊断的陈述,不妥的是
 - A. 自理能力缺陷:与手术创伤和伤口疼痛有关
 - B. 胸痛:与冠心病有关
 - C. 皮肤完整性受损:与长期卧床有关
 - D. 睡眠形态紊乱:与睡眠环境改变有关
 - E. 便秘:与生活方式改变有关

考点:医院和住院环境

6. 保持病区环境安静,下列措施哪项不妥
 - A. 白天病区较理想的声音强度应维持 35 ~ 40dB
 - B. 病室的门、窗及桌、椅脚应加橡皮垫
 - C. 医护人员说话应附耳细语
 - D. 工作中要做到“四轻”
 - E. 推车的轮轴定时加注润滑油
7. 病室的相对湿度为 75% 时,病人可出现的表现是
 - A. 多汗,烦躁
 - B. 肌肉紧张
 - C. 咽干、口渴
 - D. 闷热、排尿增多
 - E. 食欲减退
8. 管理急救物品应做到“五定”的内容不包括
 - A. 定数量品种
 - B. 定点安置、定专人保管
 - C. 定期消毒、灭菌
 - D. 定期检查维修
 - E. 定时使用

(9~10 共用题干)

患者李警官,男性,30 岁。在执行任务与歹徒搏斗中致右上肢及胸部多处外伤,送至急诊见患者伤处大量出血、呼吸急促、意识模糊。

9. 急诊护士在紧急处理中不妥的是

- A. 询问外伤原因
- B. 迅速测量生命体征
- C. 抢救记录要及时、准确、字迹清晰
- D. 请陪伴者留下
- E. 安排观察病床,等待医师到来

10. 李警官所在病室适宜的温、湿度应为

- A. $16 \sim 18^{\circ}\text{C}$, $20 \sim 30\%$
- B. $18 \sim 22^{\circ}\text{C}$, $50 \sim 60\%$
- C. $22 \sim 24^{\circ}\text{C}$, $40 \sim 50\%$
- D. $16 \sim 18^{\circ}\text{C}$, $50 \sim 60\%$
- E. $18 \sim 24^{\circ}\text{C}$, $60 \sim 70\%$

考点:入院和出院病人的护理

11. 下列属于一级护理的是

- A. 严重创伤
- B. 器官移植
- C. 昏迷患者
- D. 慢性病
- E. 大面积灼伤

12. 出院护理不正确的一项是

- A. 整理出院病历,体温单放在最后一页
- B. 床垫、枕芯等在日光下暴晒 4 小时
- C. 传染病人需按传染病终末消毒法处理
- D. 征求患者及家属意见
- E. 热情护送患者出院

13. 患者张某,因车祸致颈椎骨折需要送往医院,将患者移到平车时,正确的做法是

- A. 采用三人搬运法
- B. 移动的顺序是上身、臀部、下肢
- C. 车上垫木板

D. 平车上坡时,头在低处

E. 宜采用四人搬运法

14. 患者高女士,25 岁。因羊水早破入院,对其卫生处置不正确的措施是

- A. 嘱其沐浴、更衣
- B. 不需用的物品交家属带回
- C. 住院处护士,护送患者入病区
- D. 护送过程中注意安全和保暖
- E. 必要时治疗(如输液、吸氧)不能中断

考点:卧位和安全的护理

15. 十二指肠引流的病人应采取的卧位是

- A. 去枕平卧位
- B. 半坐卧位
- C. 左侧卧位
- D. 头高足低位
- E. 头低足高位

16. 患者刘某,男性,40 岁,因休克昏迷,采取中凹卧位,不正确的护理是

- A. 保持各引流管通畅
- B. 记录 24 小时出入量
- C. 中凹卧位头胸部抬高 $20 \sim 30^{\circ}$
- D. 中凹卧位下肢抬高 $20 \sim 30^{\circ}$
- E. 头胸部抬高 $10 \sim 20^{\circ}$

17. 患者李先生,68 岁,慢性肺心病 10 余年,近日来,劳累后心悸、气促。入院时发绀明显,呼吸困难,咳粉红色泡沫样痰,应取的卧位是

- A. 侧卧位
- B. 头低足高位
- C. 膝胸位
- D. 半坐卧位
- E. 端坐卧位

18. 下列疾病除采取头低足高位,还须取左侧卧位的是

- A. 十二指肠引流
- B. 肺部分泌物引流
- C. 心包积液
- D. 胎膜早破和空气栓塞
- E. 跟骨及胫骨结节牵引

19. 患者刘某,72岁,肾病综合征、心功能Ⅳ级,入院一个月余。护士为其更换体位时不正确的做法是
- A. 采用两人法帮助病人翻身
B. 协助翻身前应先多种导管安置妥当
C. 背部、胸部、两膝间放置软枕
D. 护士注意节力原则
E. 记录皮肤受压情况,无需记录翻身时间
- 考点:医院内感染的预防和控制
20. 用于浸泡金属不耐热的医疗器械的高效消毒剂是
- A. 0.5% 氯己定
B. 2% 戊二醛
C. 75% 乙醇
D. 37~40% 甲醛
E. 3% 过氧化氢
21. 煮沸法杀灭破伤风杆菌芽孢,为增强杀菌效果,提高沸点,且去污除锈,应加入的碳酸氢钠为
- A. 2~4% B. 5%
C. 1~4% D. 2%
E. 1~2%
22. 对铜假单胞菌感染伤口换下的敷料,正确的处理方法是
- A. 焚烧
B. 清洗后消毒
C. 先浸泡消毒再灭菌
D. 两次灭菌
E. 灭菌后再清洗
23. 现有长 6M,宽 3.5M,高 3M 房间,用 2% 过氧乙酸进行空气消毒,其用量是
- A. $410\text{ml}/\text{m}^3$ B. $480\text{ml}/\text{m}^3$
C. $504\text{ml}/\text{m}^3$ D. $564\text{ml}/\text{m}^3$
E. $605\text{ml}/\text{m}^3$
24. 配制 0.1% 苯扎溴铵(新洁尔灭) 4000ml,需用 5% 苯扎溴铵量为
- A. 50ml B. 60ml
C. 70ml D. 80ml
E. 100ml
25. 无菌技术操作中,正确的是
- A. 用无菌持物钳夹取油纱布换药
B. 浸泡无菌持物钳的液面需没过轴节的 2/3
C. 保持钳端向下,不可倒转向上
D. 注射室的无菌容器应每周更换一次
E. 干燥存放应每 24 小时更换一次
26. 使用无菌物品,其有效期错误的是
- A. 无菌持物钳干燥放置有效期为 4~6 小时
B. 未开包的无菌物品有效期是 7 天
C. 已开包的无菌物品有效期为 24 小时
D. 铺好的无菌盘有效期为 4 小时
E. 无菌持物钳及容器浸泡放置有效期为 7~14 天
27. 穿隔离衣时的注意事项不正确的是
- A. 长短要合适,须全部遮盖工作服
B. 保持隔离衣内面及领部清洁
C. 穿隔离衣后,不得进入治疗室
D. 隔离衣挂在走廊,清洁面向内
E. 隔离衣有潮湿或污染,应立即更换
28. 接触传染病人后刷手,正确的顺序是
- A. 前臂、手腕、手背、手掌、手指、指缝、指甲
B. 手腕、前臂、手掌、手背、手指、指甲
C. 手指、指缝、手背、手掌、手腕、前臂
D. 前臂、手腕、指甲、手背、手掌
E. 手腕、手掌、手指、指甲、指缝、前臂
29. 应执行严密隔离的疾病是
- A. 结核 B. 乙型脑炎

- C. 病毒性肝炎 D. 痢疾
E. 霍乱

考点:病人的清洁护理

30. 如遇头发打结时,可先乙醇湿润后再梳顺,选用乙醇的浓度为
A. 20% ~ 30% B. 30%
C. 50% D. 75%
E. 95%
31. 适宜盆浴的病人是
A. 极度衰弱者
B. 严重心脏疾患
C. 阑尾炎术后 7 日
D. 妊娠 28 周后
E. 严重创伤
32. 灭头虱药注的正确配制比例是
A. 百部 30g 加 50% 乙醇 100ml,再加 100% 乙酸 1ml
B. 百部 30g 加 75% 乙醇 100ml,再加 100% 乙酸 1ml
C. 百部 30g 加 50% 乙醇 10ml,再加 100% 乙酸 10ml
D. 百部 30g 加 50% 乙醇 100ml,再加 100% 乙酸 10ml
E. 百部 30g 加 30% 乙醇 100ml,再加 100% 乙酸 1ml
33. 李老太,66 岁。偏瘫半年余,入院时查体,见患者骶尾部有 $3 \times 2\text{cm}$ 创面,深达肌层,有脓性分泌物,创面周围有黑色坏死组织,创面处理的正确方法是
A. 用 50% 乙醇按摩创面及周围皮肤
B. 用生理盐水冲洗并紧贴新鲜鸡蛋膜
C. 剪去坏死组织,用双氧水冲洗并置引流纱条
D. 暴露创面,紫外线每日照射 1 次
E. 涂厚层滑石粉包扎
34. 骨折患者做床上擦浴时,穿脱衣服的顺序正确的是

- A. 先脱远侧,后脱近侧
B. 先穿健肢,再穿患肢
C. 穿脱都是选近侧再远侧
D. 先脱健侧,再脱患侧
E. 穿脱都是先健肢后患肢

35. 患者男性,45 岁,使用抗生素 2 个月
后,其口腔粘膜出现创面,可考虑为
A. 病毒感染 B. 真菌感染
C. 铜假单胞菌感染 D. 寄生虫病
E. 口腔粘膜白斑

考点:生命体征的评估

36. 患者李某,女性 32 岁,近 3 日出现发热,体温持续在 $39 \sim 40^{\circ}\text{C}$ 左右,日差不超过 1°C ,其热型应该是
A. 不规则热 B. 弛张热
C. 稽留热 D. 间歇热
E. 低热
37. 间歇脉多见于
A. 心动过速
B. 心动过缓
C. 窦性心律不齐
D. 房室传导阻滞
E. 洋地黄中毒
38. 混合性呼吸困难多见于
A. 喉头异物 B. 哮喘
C. 大片肺不张 D. 喉头水肿
E. 呼吸中枢衰竭
39. 下以病情与呼吸异常不相符的是
A. 疼痛 - 呼吸过速
B. 颅内压增高 - 呼吸过速
C. 脑肿瘤 - 呼吸过慢
D. 呼吸机麻痹 - 呼吸浅快
E. 昏迷病人 - 鼾声呼吸
40. 用成人血压计袖带给幼儿测血压时,其测量的数值

- A. 偏低
C. 脉压差小
E. 无太大影响
- B. 偏高
D. 脉压差大

41. 患者李先生,52岁,冠心病病史十余年,血压偶有轻度升高,下列叙述中,对血压生理性变化,错误的描述是
- A. 过度疲劳和睡眠不佳时,血压稍增高
B. 清晨血压偏低
C. 高热环境中血压略升高
D. 右上肢略高于左上肢
E. 兴奋时,血压升高

考点:病人饮食的护理

42. 以下属于治疗饮食的是
- A. 普食
C. 高脂饮食
E. 低盐饮食
- B. 流食
D. 吸碘饮食
43. 禁用鼻饲法的病人是
- A. 拒绝进食者
C. 胃肠减压术者
E. 口腔疾患
- B. 昏迷
D. 早产儿
44. 肾病综合征的正确饮食为
- A. 低蛋白饮食
B. 低盐饮食
C. 低胆固醇饮食
D. 优质高蛋白饮食
E. 低脂饮食
45. 以下不是潜血试验饮食忌食的是
- A. 猪肝
C. 含铁药物
E. 粉丝
- B. 鸭血
D. 菠菜
46. 甲亢病人预做放射性同位素检查,不属于60天禁食的食物是
- A. 海带
C. 淡菜
E. 豆腐
- B. 紫菜
D. 海蜇

考点:冷热疗法

47. 面部危险三角区感染时禁用热疗的原因
- A. 加重病人疼痛
B. 引起局部出血
C. 掩盖病情
D. 造成面部烫伤
E. 导致颅内感染
48. 禁忌用冷的部位不包括
- A. 枕后
C. 腹股沟
E. 足底
- B. 阴囊
D. 心前区
49. 乙醇拭浴方法错误的步骤是
- A. 以离心方式拍拭,每侧3分钟
B. 将冰袋放置于头部,以防头部充血
C. 将热水袋放置足底,提高散热效果
D. 拭浴顺序为从上而下,从外到内
E. 拭浴温度为35~40℃
50. 红外线灯使用中正确的是
- A. 灯距为20~30cm
B. 照射时间为15~20分钟
C. 胸腹、腰背部用250W为宜
D. 出现桃红色的均匀红斑,为合适剂量
E. 皮肤出现紫红色,涂凡士林后继续照射
51. 小张男性,30岁,高温作业6小时出现胸闷、口渴、面色苍白、出冷汗,体温38.9℃,脉细弱,血压80/50mmHg。不正确的护理措施是
- A. 头部置冰袋,四肢冰水敷拭
B. 立即搬至阴凉通风处
C. 取平卧位
D. 口服含盐饮料
E. 建立静脉通路

考点:排泄护理

52. 对尿失禁病人的护理中不妥的是

- A. 入睡前可适当限制饮水量
B. 白天摄入水分不超过 1500ml
C. 白天每隔 1~2 小时送一次便器
D. 训练有意识的排尿
E. 进行收缩和放松盆底肌锻炼
53. 留取中段尿的正确方法是
A. 尿量不宜太多,3ml 即可
B. 女性病人须取坐位
C. 尿内勿混入消毒液
D. 必须留取晨起第一次尿
E. 用干燥试管留取尿液
54. 休克病人留置导尿的目的是
A. 测量尿量及密度,了解肾脏供血
B. 排空膀胱,避免尿潴留
C. 保持床单清洁干燥,防止压疮发生
D. 引流尿液促进内毒素排出
E. 留尿作细菌培养协助诊断
55. 上消化道出血量达到多少毫升可产生黑便
A. 5ml B. 30ml
C. 50ml D. 60ml
E. 100ml

考点:药物疗法和过敏试验法

56. 以下哪项不是口服给药法的注意事项
A. 服磺胺类药的宜多喝水
B. 先服止咳糖浆再服其他药物
C. 助消化药饭后服用
D. 退热药服用后多喝水
E. 服强心苷药物应先测心率及心律
57. 下列 1ml 液含量正确的是
A. 青霉素:50U
B. 链霉素:250U
C. 细胞色素 C:0.75mg
D. 破伤风抗毒素:1500U
E. 普鲁卡因:0.25mg
58. 发生青霉素过敏反应,病人最早出现

的症状是

- A. 意识丧失 B. 喉头水肿
C. 寒战 D. 发热
E. 血压下降
59. 抢救过敏性休克病人,以下不妥的是
A. 立即皮下注射肾上腺素 0.5~1mg
B. 吸氧
C. 立即停药,送抢救室抢救
D. 根据医嘱给予抗过敏药物
E. 密切观察病情变化
60. 患者男性,因外伤急诊治疗,给予破伤风皮试后,为阳性,为患者采取脱敏注射法正确的是
A. 第一次 0.2mlTAT + 0.9% 生理盐水 1ml
B. 第二次 0.1mlTAT + 0.9% 生理盐水 0.9ml
C. 第三次 0.2mlTAT + 0.9% 生理盐水 0.8ml
D. 第四次,余量加 0.9% 生理盐水至 1ml 肌肉注射
E. 最后一次 0.4mlTAT + 0.9% 生理盐水 0.6ml

考点:静脉输液和输血法

61. 下列治疗要求滴速不正确的是
A. 一般成人输液为 40~60 滴/分
B. 一般儿童输液为 20~40 滴/分
C. 膀胱冲洗为 80~100 滴/分
D. 心功能不全为 20~30 滴/分
E. 化脓性骨髓炎开窗引流为 50~60 滴/分
62. 严重低渗性脱水,首先输入的是
A. 5% 葡萄糖溶液
B. 5% 葡萄糖氯化钠溶液
C. 5% 碳酸氢钠溶液
D. 5% 氯化钠溶液

E. 5% 氯化钾溶液

63. 患者李先生, 39 岁。术后一天常规输液补液及抗炎治疗, 现需要将 1500ml 的液体, 6 小时内输完, 应调节的滴速为

- A. 50 滴/分 B. 60 滴/分
C. 62 滴/分 D. 75 滴/分
E. 80 滴/分

64. 溶血反应的出现为输入多少毫升血液即可出现。

- A. 5ml B. 10ml
C. 10 ~ 15ml D. 15 ~ 20ml
E. 20ml 以上

65. 以下对 10% 葡萄糖酸钙错误的用法是

- A. 输库存血 1000ml 以上, 注射 5ml
B. 用于对抗钾离子对心肌的抵制作用
C. 用于甲状旁腺误切预防抽搐
D. 用于链霉素过敏减轻毒性症状
E. 用于硫酸镁中毒

考点: 标本采集

66. 作尿蛋白定量检查应加入防腐剂是

- A. 甲醛 B. 95% 乙醇
C. 浓盐酸 D. 甲苯
E. 稀盐酸

67. 镜下脓尿是指离心沉淀后的尿沉渣在每高倍视野中见到白细胞数量为

- A. 2 个 B. 3 个
C. 4 个 D. 5 个
E. 6 个

考点: 病情观察和危重病人的抢救

68. 双侧瞳孔缩小见于

- A. 颅内压增高
B. 阿托品中毒
C. 脑疝
D. 硬脑膜下血肿

E. 乐果中毒

69. 吸氧浓度为 37%, 每分钟氧流量为

- A. 1L/min
B. 2L/min
C. 3L/min
D. 4L/min
E. 5L/min

70. 气管内吸痰每次时间不易超过 15 秒, 主要原因是

- A. 吸痰器工作时间过长易损坏
B. 吸痰管通过痰液过多易阻塞
C. 引起病人缺氧和发绀
D. 引起病人刺激性呛咳
E. 吸痰用托盘暴露时间过久引起感染

考点: 临终病人的护理

71. 临床死亡期的特征为

- A. 血压、脉搏测不到
B. 心跳停止、各种反射消失
C. 呼吸心跳停止、各种反射消失
D. 呼吸停止、各种反射消失
E. 瞳孔散大

考点: 医疗和护理文件的书写

72. 住院病案不包括

- A. 病区报告
B. 化验单
C. 临时医嘱
D. 重症护理记录
E. 长期医嘱单

73. 关于病案的保管, 下列哪项不妥

- A. 要求整洁、完整
B. 不能破损、污染
C. 不得擅自带出病区
D. 不能随意拆散
E. 病人希望查看, 应满足其要求

第一章 基础护理知识和技能答案

1. C

2. D

考点:护理评估的作用

解析:有目的、有计划、系统地收集护理的资料,为护理活动提供可靠依据。

3. A

4. C

5. B

考点:护理诊断的陈述方式

解析:在护理诊断的陈述中注意避免与医疗诊断相混淆。冠心病属医疗诊断,其护理诊断应是护理措施所能够解决的问题,而冠心病引起的胸痛不属于该范畴内。

6. C

考点:病区的物理环境

解析:医护人员说话附耳细语易使患者产生怀疑、误会等。

7. D

8. E

9. E

10. B

11. C

12. B

13. E

14. A

15. E

16. C

17. E

18. D

考点:头低足高位适应范围

解析:胎膜早破、空气栓塞病人除头低足高位,还须取左侧卧位。

19. E

20. B

考点:化学消毒剂的适用范围

解析:2% 戊二醛溶液加入 0.3% 碳酸氢

钠,成为 2% 碱性戊二醛,用于浸泡器械、内镜等,消毒需 10 ~ 30 分钟,灭菌需 7 ~ 10 小时。

21. E

22. A

23. C

考点:空气消毒常用消毒剂

解析:2% 过氧乙酸 8 ml/m^3 , 30 ~ 120 分钟。用量为: $(6 \times 3.5 \times 3) \times 8 = 504 \text{ ml}$ 。

24. D

考点:溶液的配制

解析:需用 5% 苯扎溴铵的量为 $(0.1\% \times 4000) / 5\% = 80 \text{ ml}$ 。

25. C

26. B

27. D

28. A

29. E

30. B

31. C

32. A

33. C

34. D

35. B

考点:口腔护理

解析:长期使用抗生素可导致真菌感染。

36. C

37. D

38. C

考点:混合性呼吸困难的原因

解析:混合性呼吸困难是指由于广泛性肺部病变使呼吸面积减少,影响换气功能而产生。患者在吸气与呼气时均感费力,呼吸频率也增加,可见于重症肺炎、广泛性肺纤维化、大片肺不张、大量胸腔积液或自发性气胸等。

39. B

40. A

考点:测量血压,排队除袖带的干扰

解析:袖带过宽过紧,测量血压偏低,袖带过窄过松,测得血压偏高。用成人袖带给幼儿测血压,显然袖带过宽了。

41. C

考点:血压的生理性变化

解析:高温环境中因血管扩张,血压将偏低。

42. E

43. C

44. D

考点:治疗饮食

解析:肾病综合征常常伴随蛋白尿,体内蛋白大量流失,应该在食物中补充大量优质蛋白,但植物蛋白不合适。

45. E

考点:潜血试验饮食

解析:潜血试验饮食忌一切暗红色或绿色食物。

46. E

47. E

考点:面部危险三角区的治疗

解析:热疗可使该处血流量增多,细菌及毒素进入血液循环,促进炎症扩散,导致颅内感染。

48. C

49. E

50. D

51. A

52. B

53. C

54. A

考点:留置尿导的目的

解析:尿量与血压是判断休克病人病情变化的主要指标。
55. D

考点:上消化道出血失血量判断

解析:上消化道出血时,粪便隐血试验阳性,表现24小时失血量大于5ml;柏油便表明24小时失血量为60ml~100ml左右。因此消化道出血在60ml以上即可表现为黑便。

56. B

57. C

58. B

59. C

60. D

61. C

62. B

63. C

考点:输液速度的计算

解析:每分钟滴数=液体总量(ml)×滴系数/输液时间(分)。滴系数一般为15,故滴速为: $1500 \times 15 / 6 \times 60 = 62.5$ 。

64. C

65. A

66. D

67. D

68. E

考点:瞳孔大小的观察

解析:双侧瞳孔扩大常见于颅内压增高;双侧瞳孔缩小,常见于有机磷农药、吗啡、氯丙嗪等药物中毒;双侧瞳孔大小不等,提示有颅内压迫性病变。

69. D

考点:氧流量与氧浓度

解析:吸氧浓度公式为 $21 + 4 \times \text{氧流量}$

70. C

71. C

72. A

73. E

第二章 循环系统疾病病人的护理

考点：循环系统解剖生理

1. 下列对心脏四个腔室的叙述错误的是
 - A. 左心房室之间有二尖瓣
 - B. 右心房室之间有三尖瓣
 - C. 左右心之间互不相通
 - D. 左心室和肺动脉相通
 - E. 心瓣膜具有防止心房和心室在收缩或舒张时出现血液反流的功能
2. 毛细血管又称为
 - A. 阻力血管
 - B. 容量血管
 - C. 功能血管
 - D. 大血管
 - E. 静脉血管

考点：心功能不全病人的护理

3. 以下对心功能Ⅲ级的叙述正确的是
 - A. 体力活动不受限
 - B. 体力活动轻度受限
 - C. 体力活动明显受限
 - D. 体力活动完全受限
 - E. 有重度脏器淤血体征
4. 慢性心衰的诱发原因中以下哪个系统的感染最为常见
 - A. 泌尿系统
 - B. 呼吸系统
 - C. 消化系统
 - D. 循环系统
 - E. 神经系统
5. 慢性心衰的特定体征是
 - A. 紫绀
 - B. 心悸
 - C. 呼吸困难
 - D. 乏力
 - E. 水肿
6. 左心衰最典型的呼吸困难是
 - A. 劳力性呼吸困难
 - B. 吸气性呼吸困难

C. 呼气性呼吸困难

D. 阵发性夜间呼吸困难

E. 混合性呼吸困难

7. 处理洋地黄中毒不正确的措施是
 - A. 减少洋地黄用量
 - B. 停用排钾利尿药
 - C. 及时与医师取得联系
 - D. 应用利多卡因对症治疗
 - E. 快速纠正心律失常

考点：心律失常病人的护理

8. 房颤急性期首选的治疗是
 - A. 维拉帕米
 - B. 非同步直流电除颤
 - C. 心脏电复律
 - D. 心电监护
 - E. 心脏起搏器
9. 有可能导致危及生命的心律失常是
 - A. 心房颤动
 - B. 阵发性室上性心动过速
 - C. 窦性心动过缓
 - D. 阵发性室性心动过速
 - E. 频发单源性室性期前收缩
10. 治疗室性期前收缩最常用的是
 - A. 倍他乐克
 - B. 硝酸甘油
 - C. 利多卡因
 - D. 普鲁卡因
 - E. 维拉帕米
11. 以下哪些不是心脏电复律的护理要点
 - A. 适用于室颤
 - B. 适用于持续性室性心动过速
 - C. 洋地黄中毒者禁用
 - D. 功能为 300 ~ 350J

E. 病人需俯卧于绝缘床上

12. 房颤病人应主要观察

- A. 病人的主诉
- B. 心室率的改变
- C. 血压的变化
- D. T 波的变化
- E. 脉搏的变化

考点:先天性心脏病病人的护理

13. 以下对小儿循环解剖生理特点的叙述错误的是

- A. 胚胎发育 10 周为心脏形成的关键期
- B. 2 岁以后小儿心脏由横位逐渐转成斜位
- C. 新生儿时期心率为 120 ~ 140 次/分
- D. 年长儿以风湿性心脏病多见
- E. 婴幼儿以先天性心脏病为主

14. 法洛四联症属于

- A. 左向右分流型
- B. 无分流型
- C. 持续分流型
- D. 右向左分流型
- E. 间歇分流型

15. 室间隔缺损听诊可闻及

- A. 收缩期喷射性杂音
- B. 舒张期吹风样杂音
- C. 全收缩期反流性杂音
- D. 全舒张期反流性杂音
- E. 收缩期连续性机器样杂音

16. 法洛四联症可出现

- A. 桶状胸
- B. 杵状趾
- C. 板状腹
- D. 角弓反张
- E. 颈项强直

17. 法洛四联症缺氧发作首要的处理是

- A. 立即给予吸氧
- B. 吗啡皮下注射

C. 将小儿置于膝胸位

D. 纠正酸中毒

E. 镇静

考点:高血压病人的护理

18. 以下对高血压危象的描述正确的是

- A. 短暂性脑缺血发作
- B. 属于 I 级高血压
- C. 单纯性收缩期高血压
- D. 血压可达 260/120mmHg 以上
- E. 可造成脑水肿

19. 治疗高血压急症的首选药是

- A. 卡托普利
- B. 硝苯地平
- C. 硝普钠
- D. 阿替洛尔
- E. 维拉帕米

20. 护理高血压病患者,哪项措施不正确

- A. 协助用药,尽快将血压降至较低水平
- B. 避免重体力劳动,保证足够睡眠
- C. 减轻体重,特别是向心性肥胖
- D. 限制钠摄入 < 6g/d
- E. 避免突然改变体位

21. 有关高血压病的健康指导,错误的是

- A. 指导病人自己控制情绪
- B. 冬天外出时注意保暖
- C. 正确用药,按时服药
- D. 不随意增减和中断用药
- E. 发现高血压应立即就医服药

考点:冠状动脉粥样硬化性心脏病病人护理

22. 心绞痛发作时首要的护理措施是

- A. 心电监护
- B. 指导病人放松情绪
- C. 让病人立即停止活动,休息
- D. 迅速建立静脉通路
- E. 电复律

23. 急性心肌梗死的致死原因是

- A. 室扑