

療瘧醇濃湯方

中医古籍出版社

◆ 主編 曹洪欣

◆ 副主編 鄭金生 柳長華

常山兩  
農荷根三  
兩

右六味切以水六升煮取一升曰醇未發時須頓服更以  
三分煮取一升曰醇至發不斷復頓服甚良別方說發日  
旦服醇一升以醇著頭邊若欲發便服解良二說不同



海外 中醫古籍善本集萃 (7)  
回歸

主編 曹洪欣  
副主編 鄭金生 柳長華  
顧問 馬繼興 真柳誠(日) 黃龍祥  
編委 萬芳 王咪咪 蕭永芝

# 海外回歸中醫古籍善本集粹(7)

中醫古籍出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

子  
目  
太  
平  
聖  
惠  
方

海外回歸中醫古籍善本集粹

# 太平聖惠方(六)

宋·王懷隱等

本書據日本國獨立行政法人  
國立公文書館藏本影印

聖惠方

卷七十七之八

漢書門類	
一	二二三三號
二	一八函
三	四架
四	五册



12233

51 40

695 49

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cm

太平聖惠方卷第七十七

九十四門

病源十四首

方共計百九十五道

治妊娠胎上逼心諸方 六道

治妊娠驚胎諸方 三道

治妊娠後血不止諸方 二十三道

治妊娠墮胎後血不止諸方 四道

治產難子死腹中諸方 二十五道

治妊娠墮胎胞衣不出諸方 八道

治妊娠胎動安不得却須下諸方 十一道

治婦人腹內有鬼胎諸方 八道

治妊娠中惡諸方 七道

治產難諸方 五十三道

治數日不產諸方 一十七道

治胞衣不出諸方 二十三道

治逆產諸方 二十六道

治橫產諸方 二十一道

治妊娠驚胎諸方

夫妊娠驚胎者是懷妊月將滿或將產其胎神識已具外有勞傷積動而胎在內驚動也

治妊娠因用力執作覺胎動心腹急痛而青汗出頭仰氣喘欲絕服諸藥安胎無效又名驚胎宜服茯苓散方

白茯苓

桔梗

頭去蘆微剉

生乾地黃

人參

頭去蘆

桂心

當歸

頭去蘆微剉

釣藤

獨活

桑寄生

赤芍藥

赤頭去蘆微剉

石膏

一兩上各

右件藥擣篩爲散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠端然有所見驚胎流下不安若跳動心中痛安胎桑寄生散方

桑寄生

芎藭

半兩微剉

白朮

當歸

頭去蘆微剉

右件藥擣龜羅爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分蜜三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠數月已來舉重驚胎小腹疼痛不可思熟乾地黃散方

熟地黃

阿膠

擣碎炒  
令黃燥

艾葉

微炒

芍藥

杜仲

去皮炒  
微黃剉

當歸

剉微炒  
上各二兩

右件藥擣鹿羅爲散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠胎動不安因用力勞乏腰痛面青冷汗出氣息欲絕由勞動驚胎所致釣藤散方

釣藤

茯神人參

去頭

當歸

剉微炒

桔梗

去頭

桑寄生

上各一兩

右件藥擣鹿羅爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白七寸煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠被驚胎動向下不安小腹連腰痛當歸散方

當歸

剉微炒

芍藥

剉微炒

阿膠

擣碎炒  
令黃燥

人參

頭

去

蘆

白茯苓

上各一兩

艾葉

半兩

微炒

右件藥擣篩爲散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

治胎上逼心諸方

夫妊娠將養得所則氣血調和故兒在胎則安當產亦易若節適失宜則血氣乖理兒在胎則亟動至產育亦難而子上逼於心者由產難用氣力胎動氣逆胎上衝逼於心也凡胎上逼心則悶絕胎下乃蘇甚者至死也

治妊娠胎上逼心下血不止阿膠散方

阿膠擣碎炒黃燥 芍藥炒微 當歸炒微 熟地黃各一兩 銀一斤以水一升煎至五升

右件藥擣篩爲散每服四錢以銀汁一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治胎動逼心煩悶欲絕安胎止痛桑寄生散方

桑寄生當歸炒微 芍藥炒微 人參去蘆 甘草各二兩 上各二兩

右件藥擣篩爲散每服四錢以水一中盞入葱白七寸煎至六

分去滓不計時候溫服

治胎上逼心煩悶委頓當歸散方

當歸 一兩剗微炒

甘草 一兩微赤剗

阿膠 一兩擣碎炒令黃燥 人參 一兩去蘆頭 右件藥擣篩爲散母服四錢水煎入急

白七十煎至六分去滓

不計時候溫服○治胎上逼心痛熱下血方

右取麵半斤擣碎和熟水絞取汁三中盞

不計時候分溫五服

治胎上逼心煩悶方右取葱白梔限多至濃煮汁飲之

治胎不順胎上逼心方

右取烏心血少步飲之當下

治妊娠墮胎後血下不止諸方

夫墮胎後復損於經脉經脉既虛故下血不止也下血多者徒致

煩悶乃至死矣

治妊娠損胎下血不止腹內疼痛地榆散方

地榆 三分剗

乾薑 一分裂剗

當歸 三分剗

芎藭 三分

艾葉 半兩微炒

阿膠 三分擣碎炒令黃燥

龍骨 三分

兩

蒲黃 半兩

黃牛角腮

一兩  
燒灰

白朮 半兩

烏賊魚骨

三分  
燒灰

右件藥擣細羅爲散不計時候以粥飲調下二錢

治姪娠損胎後下血不止當歸散方

當歸

三分  
炒微炒  
剉

龍骨

三分  
燒灰

地榆

半分  
剉

艾葉

半兩

阿膠

三分  
炒令黃燥  
剉碎

牛角腮

二兩  
燒灰  
炮

熟乾地黃

三分  
剉

芎藭

三分  
剉

白芍藥

半兩  
剉

乾薑

半兩  
剉  
炮

黃耆

半兩  
剉

柏葉

三分  
微炙

右件藥擣細羅爲散不計時候以粥飲調下二錢  
治姪娠損動血下不止腹痛宜服此方

阿膠

一兩  
炒令黃燥  
剉碎

艾葉

半兩  
剉

右件藥以水一大盞煎至六分去滓食前分溫二服

治姪娠損動血下不止方

甘草

一兩  
微赤剉

阿膠

三兩  
炒令黃燥  
剉碎

鷄子一枚

右件藥以水二大盞煮甘草取一盞三分去滓次下鷄子及膠

右件藥以水二大盞煮甘草取一盞三分去滓次下鷄子及膠

候膠銷熟攬不計時候分溫三服

治墮胎後惡物下四體虛因悶不能自勝艾葉散方

艾葉

三分

地榆

一兩

乾薑

三分炮

當歸

一兩

赤石脂

三分

右件藥搗細羅爲散每於食前以淡竹瀝調下二錢

白膠

二兩炒今黃燥

人參

去頭蘆

半夏

湯洗七偏去滑

秦艽

去苗

甘草

炙微赤剉已上各一兩

此紫葳

右件藥搗鹿羅爲散每服三錢以水一中盞入芒硝白芷煎至六分去滓不計時候溫服

治姪娠損胎後下血不止當歸散方

當歸

三分炒

熟乾地黃

一兩

鹿茸

三分去毛金酥炙

白膠

一兩炒今黃燥

艾葉

二兩微炒

甜葶苈根

三分

附子

半兩炮裂

黃芩

半兩

右件藥搗細羅爲散每服食前以粥飲調下二錢

治因損娘下惡血不止龍骨散方

龍骨

二分

當歸

三分

地榆

三分

艾葉

半兩

微炒

三分

屏角屑

三分

阿膠

三分  
炒令黃  
擣碎

熟乾地黃

一兩

蒲黃

半兩

屏角屑

三分

右件藥擣細羅爲散每於食前以粥飲調下一錢  
又方 右取桑蠅蟲燒灰細研於食前以溫酒調下一錢

又方

丹參

二兩  
剉

右件藥以酒一大盞半煎至一盞去滓食前分溫二服  
治姪娠墮胎下血不盡苦煩滿欲極時時寒熱任閑方  
鹿角

二兩  
灰細研

右以水一大盞煎取一合取汁六分分爲三服每服調下散二  
錢日三四服

治姪娠落胎下血不止方

右研取生地黃汁一小盞調代赭末一錢日三四服

治姪娠下血疼痛不止方

右以家鷄毛燒灰細研以溫酒調下一錢如人行五里再服以效為度

姪娠數墮胎諸方

夫陽施陰化故得有胎榮衛和調則經養周足故胎得安則能成長若血氣虛損者子臟爲風冷所居則血氣不足故不能養胎所以墮胎數也其姪娠而腰疼者喜墮胎也

治姪娠數墮胎皆因氣血虛損子臟風冷致令胎不堅固頻有所傷宜服卷柏圓方

卷柏

鍾乳粉

鹿角膠

擣碎炒  
令黃燥

紫石英

細研水  
飛過

陽起石

細研水  
飛過

桑螵蛸

微炒

熟乾地黃

炒微

禹餘粮

醋淬七  
分上各  
兩

杜仲

去鹿皮  
微黃剉

芍藥

當歸

剉微

桂心

牛膝

去苗

桑寄生

五味子

地寐人

牡丹

三錢各

右件藥搗羅爲末都研令勻鍊蜜丸圓如梧桐子大每服空

心及晚食前以溫酒下三十圓

治婦人風冷在子宮致有子怕落且服補益紫石英圓方

紫石英

細研水飛過

天門冬

去心焙

五味子

燒醋淬

禹餘根

七偏燒酒浸

浮

川椒

去目及微炒去浮

卷柏

鹿皮去根微剉

烏賊魚骨

燒酒浸

桑寄生

燒酒浸

石南

杜仲

鹿皮去根微剉

當歸

剉微

澤鴻

燒酒浸

桂心

石斛

鹿皮去根微剉

柏子仁

燒酒浸

人參

頭去蘆半兩

肉蓯蓉

酒浸宿剉去皮皮炙

辛夷

半兩炙

雲母粉

二兩

遠志

去心半兩

川烏頭

半兩炮裂去皮

甘草

半兩炙微赤剉

右件藥

擣羅爲末研了藥含

金釀蜜和擣三晉杵圓和梧桐

子大

每於食前以溫酒

下三十圓

治懷胎數落而不結實者

此是子宮虛冷所致熟乾地黃散方

熟乾地黃

半兩吳茱萸

半兩陽浸七遍培乾

乾薑

半兩炮裂剉

甘草

半兩炙微赤剉

芎藭

半兩羌活

人參

半兩去蘆頭

白朮

半兩

當歸

一兩剉微炒

黃耆

二兩剉

右件藥擣細羅爲散每服食前以溫酒調下二錢

又方 赤小豆一升於濕地種  
金牙生裸乾

右擣細羅爲散每於食前以溫酒調下二錢

治產難子死腹中諸方

夫產難子死腹中者多因驚動過早或觸犯禁忌致令產難產難則穢汙下產時未到穢露已盡而胎枯燥故子死腹中候其產婦舌青黑及胎上冷者子已死也故產處坐臥須順四時方面並避五行禁忌若有觸犯多招災禍也

治妊娠經三五箇月胎死在腹內不出  
遠來散方

遠來半兩

滑石三兩

當歸一兩炒

赤芍藥三兩

榆皮

三兩

大腹子三兩

葵子半兩微炒

甘草半兩微赤剉

子芩半兩

赤茯苓半兩

右件藥擣鹿羅爲散每服四錢以水一盞煎至六分去滓

水