



2012^年

李永乐·李正元

考研数学 ③

数学

数学三

【经济类】

复习全书

● 主编 北京大学 刘西垣
清华大学 李永乐
中国人民大学 袁荫棠

赠送《全书习题全解》

特殊防伪 盗版书将丢失重要信息

国家行政学院出版社



2012 年李永乐·李正元考研数学③

数 学 复 习 全 书

【 数 学 三 】

经济类

主 编 北 京 大 学 刘西垣
 清 华 大 学 李永乐
 中 国 人 民 大 学 袁荫棠

编 者 (按姓氏笔画)

北	京	大	学	李正元		
清	华	大	学	李永乐		
北	京	大	学	刘西垣		
中	国	人	民	大	学	严 颖
北	京	大	学	范培华		
中	国	人	民	大	学	袁荫棠

国家行政学院出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

数学复习全书. 数学三/刘西垣,李永乐,袁荫棠主编. —北京:国家行政学院出版社,2009.9
ISBN 978-7-80140-713-9

I. 数… II. ①刘… ②李… ③袁… III. 高等数学-研究生-入学考试-自学参考资料
IV. 013

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 171216 号

书 名 数学复习全书【数学三】
作 者 刘西垣 李永乐 袁荫棠
责任编辑 李锦慧 樊克克
出版发行 国家行政学院出版社
(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)
电 话 (010)82771887
经 销 新华书店
印 刷 北京市朝阳区印刷厂
版 次 2011 年 2 月北京第 2 版
印 次 2011 年 2 月北京第 1 次印刷
开 本 787 毫米×1092 毫米 16 开
印 张 33.25
字 数 900 千字
书 号 ISBN 978-7-80140-713-9/O·57
定 价 53.80 元

新版前言

本书出版、修订多年来,深受全国广大考生的好评和厚爱,受到专家同行的肯定,认为本书在编写体例上有“特色”,在内容讲解、试题分析与解答上详尽、透彻、易懂,较“适合考生的需要”。我们从反馈的信息中获悉,除报考硕士研究生的考生将本书用作应试复习参考书外,文科类在读大学生也将本书作为数学的学习辅导资料,而教师则作为主要的教学参考用书之一。这既是对我们工作的肯定和鼓励,也是一种鞭策,促使我们对本书进行一次全面修订,以便及时反映当前研究生最新考试信息,更好地适应和满足广大考生和读者考试复习的需要。2012年版《数学复习全书》将以更高的质量和新的面貌呈现在广大学生的面前。

本书2012年版是在2011年版的基础上进行修订的,更加完善,更具有针对性和适用性。

微积分部分:按考试大纲的要求及绝大多数考生系统复习的需要,本书进行了调整,宗旨是重点内容重点讲解,如:求极限的方法,求积分(一元、多元函数)的方法,牛顿-莱布尼兹公式及其应用,二重积分的计算与应用,数学建模,求幂级数的收敛域或收敛区间,幂级数的求和,求函数的幂级数展开式等单独分离出来进行举例讲解,同时调换并增加了若干典型例题,并修改了部分例题的解法,使之更简捷,更易掌握。另外,对一元函数泰勒公式及其简单应用精编若干例题进行讲解。

线性代数部分:主要是针对一些重点概念和公式的运用,调换并增加了若干例题进行讲解,使考生对这些重点概念和公式能彻底理解、吃透,对一些常考题型,如:抽象行列式的计算,有关伴随矩阵的命题, n 阶矩阵的特征值和特征向量以及线性相关与无关的证明、基础解系的证明等题型的解题方法和技巧进一步作了较详尽的归纳总结,并给典型例题进行讲解,消除考生对这些重要概念和公式的运用和常考题型解题方法的疑惑,以便考生在考试中应对自如,提高应试水平。

概率统计部分:与微积分部分一样也进行了调整,调整后更适合考生进行系统复习,同时对重点概念、公式和常考题型从多角度命制典型例题进行讲解,以提高考生运用概念、公式综合分析能力,从而取得好成绩。

特别需要强调的是,本书题型训练均给出了详细解答(见赠书)。

本书的微积分部分由北京大学刘西垣、范培华修改完成,线性代数部分由清华大学李永乐修改完成,概率论与数理统计部分由中国人民大学袁荫棠、北京大学范培华共同修改完成。

编者

2011年2月

前 言

为了使考研同学能在较短时间内全面复习数学,达到硕士学习阶段应具备的数学能力,提高考研数学应试水平,以合格的数学成绩任国家挑选,作者根据教育部制订的《数学考试大纲》的要求和最新精神,深入研究了近年来考研命题的特点及动态,并结合作者多年来数学阅卷以及全国大部分城市“考研班”辅导的经验,编写了这本《考研数学复习全书》(经济类)及其姊妹篇《考研数学全真模拟经典400题》。在编写时,作者特别注重与学生的实际相结合,注重与考研的要求相结合。

本书每章均由以下四个部分构成:

一、内容概要与重难点提示——编写该部分的目的主要使考生能明确本章的重点、难点及常考点,让考生弄清各知识点之间的相互联系,以便对本章内容有一个全局性的认识和把握。

二、考核知识要点讲解——本部分对大纲所要求的知识点进行了全面地阐述,并对考试重点、难点以及常考点进行了剖析,指出了历届考生在运用基本概念、公式、定理等知识解题时普遍存在的问题及常犯的错误,同时给出了相应的注意事项,以加深考生对基本概念、公式、定理等重点内容的理解和正确应用。

三、常考题型及其解题方法与技巧——本部分对历年统考中常见题型进行了归纳分类,归纳总结了各种题型的解题方法,注重一题多解,以期开阔考生的解题思路,使所学知识融会贯通,并能综合、灵活地解决问题。

四、题型训练及详解——本部分精选了适量的题型训练,并附有详解。只有适量的练习才能巩固所学知识,复习数学必须做题。为了让考生更好地巩固所学知识,提高实际解题能力,作者特优化设计了与真题相仿的实战训练题编写在《考研数学全真模拟经典400题》一书中,以供考生选用。

特别需要强调的是,在'98北大百年校庆之际,我们北大数学系63届校友聚会于北大燕园,畅谈中得知我们当中许多同学都在从事本科及研究生数学教学与数学研究工作,并有多年考研辅导的经验以及参加研究生入学考试阅卷的经历,对各类院校的考生有广泛的接触与了解,深知考生在考研数学备考中所面临的困惑。为了帮助考生全面系统并有针对性地复习,在大家的一致建议下,由我们执笔编写了这本《考研数学复习全书》(经济类)及其姊妹篇《考研数学全真模拟经典400题》,期望对广大考生备考能有所裨益。

本书是考研应试者的良师益友,也是各类院校的学生自学教学、提高数学水平和教师进行教学辅导的一本极有价值的参考书。

由于时间仓促,书中疏漏之处在所难免,诚请专家和读者指正。

编 者

2000年3月于北大燕园

目 录

第一篇 微积分

第一章 函数、极限、连续

内容概要与重难点提示	(1)
考核知识要点讲解	(1)
一、极限的概念与性质	(1)
二、极限存在性的判别 (极限存在的两个准则)	(3)
三、求极限的方法	(4)
四、无穷小及其比较	(14)
五、函数的连续性及其判断	(18)
六、连续函数的性质	(21)
常考题型及其解题方法与技巧	(23)
题型训练	(39)

第二章 一元函数微分学

内容概要与重难点提示	(43)
考核知识要点讲解	(44)
一、一元函数的导数与微分	(44)
二、按定义求导数及其适用的情形	(49)
三、基本初等函数导数表, 导数四则运算法则与复合函数微分法则	(50)
四、复合函数求导法的应用——由	

复合函数求导法则导出的微分法则	(52)
五、分段函数求导法	(55)
六、高阶导数及 n 阶导数的求法	(58)
七、微分中值定理	(59)
八、利用导数研究函数的性态	(61)
九、微分学的几何应用与经济应用	(66)
十、一元函数的最大值与最小值问题	(69)
十一、一元函数的泰勒公式	(71)
十二、带皮亚诺余项的泰勒公式的求法	(71)
十三、一元函数泰勒公式的应用	(73)
常考题型及其解题方法与技巧	(77)
题型训练	(111)

第三章 一元函数积分学

内容概要与重难点提示	(115)
考核知识要点讲解	(115)
一、原函数与不定积分的概念及基本性质	(115)
二、不定积分的计算	(117)
三、定积分的概念与基本性质、基本定理	(130)

四、定积分的计算	(135)
五、反常积分(广义积分)	(139)
六、定积分的几何应用	(142)
七、定积分的简单经济应用	(145)
常考题型及其解题方法与技巧	(146)
题型训练	(169)

第四章 多元函数微积分学

内容概要与重难点提示	(172)
考核知识要点讲解	(172)
一、极限与连续	(172)
二、偏导数与全微分	(174)
三、多元函数的极值	(181)
四、多元函数的最大值与最小值问题	(183)
五、二重积分的概念与计算	(185)
常考题型及其解题方法与技巧	(189)
题型训练	(215)

第五章 无穷级数

内容概要与重难点提示	(218)
考核知识要点讲解	(218)
一、常数项级数的概念与基本性质	(218)
二、正项级数敛散性的判定	(221)
三、交错级数的敛散性判别法	(223)
四、绝对收敛与条件收敛	(223)
五、幂级数的收敛域	(224)
六、幂级数的运算与和函数的性质	(225)
七、函数的幂级数展开式	(226)
常考题型及其解题方法与技巧	(228)
题型训练	(245)

第六章 常微分方程与差分方程

内容概要与重难点提示	(247)
考核知识要点讲解	(247)

一、基本概念	(247)
二、一阶微分方程	(247)
三、线性微分方程解的性质与 结构	(249)
四、二阶常系数齐次线性微分方程	(251)
五、二阶常系数非齐次线性微分方 程	(251)
六、含变限积分的方程	(252)
七、差分的概念及其性质	(253)
八、一阶常系数线性差分方程	(253)
常考题型及其解题方法与技巧	(254)
题型训练	(266)

第二篇 线性代数

第一章 行列式

内容概要与重难点提示	(269)
考核知识要点讲解	(269)
一、行列式的概念、展开公式及其 性质	(269)
二、有关行列式的几个重要公式	(273)
三、关于克莱姆(Cramer)法则	(274)
常考题型及其解题方法与技巧	(274)
题型训练	(285)

第二章 矩阵及其运算

内容概要与重难点提示	(287)
考核知识要点讲解	(287)
一、矩阵的概念及几类特殊方阵	(287)
二、矩阵的运算	(289)

三、矩阵可逆的充分必要条件	(291)
四、矩阵的初等变换与初等矩阵	(292)
五、矩阵的等价	(293)
常考题型及其解题方法与技巧	(293)
题型训练	(311)

第三章 n 维向量

内容概要与重难点提示	(313)
考核知识要点讲解	(313)
一、 n 维向量的概念与运算	(313)
二、线性组合与线性表出	(314)
三、向量组的线性相关与线性无关	(315)
四、线性相关性与线性表出的关系	(316)
五、向量组的秩与矩阵的秩	(316)
六、矩阵秩的重要公式	(317)
七、Schmidt 正交化	(318)
常考题型及其解题方法与技巧	(318)
题型训练	(335)

第四章 线性方程组

内容概要与重难点提示	(338)
考核知识要点讲解	(338)
一、线性方程组的各种表达形式 及相关概念	(338)
二、基础解系的概念及其求法	(338)
三、齐次方程组有非零解的判定	(339)
四、非齐次线性方程组有解的判定	(339)
五、非齐次线性方程组解的结构	(340)
六、线性方程组解的性质	(340)
常考题型及其解题方法与技巧	(340)

题型训练	(355)
------	-------

第五章 矩阵的特征值与特征向量

内容概要与重难点提示	(358)
考核知识要点讲解	(358)
一、矩阵的特征值与特征向量的 概念、性质及求法	(358)
二、相似矩阵的概念与性质	(360)
三、矩阵可相似对角化的充分必 要条件及解题步骤	(361)
常考题型及其解题方法与技巧	(362)
题型训练	(382)

第六章 二次型

内容概要与重难点提示	(384)
考核知识要点讲解	(384)
一、二次型的概念及其标准形	(384)
二、正定二次型与正定矩阵	(386)
三、合同矩阵	(386)
常考题型及其解题方法与技巧	(387)
题型训练	(399)

第三篇 概率论与数理统计

第一章 随机事件和概率

内容概要与重难点提示	(401)
考核知识要点讲解	(401)
一、随机事件的关系与运算	(401)
二、随机事件的概率	(403)
三、事件的独立性与独立重复试验	(407)
常考题型及其解题方法与技巧	(409)
题型训练	(417)

第二章 随机变量及其分布

内容概要与重难点提示	(420)
考核知识要点讲解	(420)
一、随机变量及其分布函数	(420)
二、离散型随机变量与连续型随机变量	(421)
三、常见的离散型、连续型随机变量及其概率分布	(425)
四、随机变量函数的分布的求法	(231)
常考题型及其解题方法与技巧	(233)
题型训练	(444)

第三章 多维随机变量的分布

内容概要与重难点提示	(446)
考核知识要点讲解	(446)
一、二维随机变量的联合分布函数与边缘分布函数	(446)
二、二维离散型随机变量	(447)
三、二维连续型随机变量	(450)
四、两个常见的二维连续型随机变量的分布	(452)
五、二维随机变量的独立性	(454)
六、两个随机变量函数的分布	(455)
常考题型及其解题方法与技巧	(458)
题型训练	(473)

第四章 随机变量的数字特征

内容概要与重难点提示	(475)
考核知识要点讲解	(475)

一、随机变量的数学期望	(475)
二、随机变量的方差	(477)
三、协方差与相关系数	(478)
四、随机变量的矩	(480)
常考题型及其解题方法与技巧	(480)
题型训练	(492)

第五章 大数定律和中心极限定理

内容概要与重难点提示	(494)
考核知识要点讲解	(494)
一、大数定律	(494)
二、中心极限定理	(495)
常考题型及其解题方法与技巧	(496)
题型训练	(501)

第六章 数理统计的基本概念

内容概要与重难点提示	(503)
考核知识要点讲解	(503)
一、总体与样本	(503)
二、统计量	(504)
三、抽样分布	(505)
常考题型及其解题方法与技巧	(508)
题型训练	(513)

第七章 参数估计

内容概要与重难点提示	(515)
考核知识要点讲解	(515)
一、估计量的概念	(515)
二、求估计量的两种常用方法	(515)
常考题型及其解题方法与技巧	(518)
题型训练	(523)

第一篇 微积分

第一章 函数、极限、连续

内容概要与重难点提示

1. 微积分中研究的对象是函数 函数概念的实质是变量之间确定的对应关系. 变量之间是否有函数关系, 就看是否存在一种对应规则, 使得按照这个对应规则, 当其中一个变量或几个变量的取值确定后, 余下的另一个变量的取值也就被唯一确定, 前者是一元函数, 后者是多元函数.

函数这部分的重点是: 复合函数、反函数、分段函数、函数记号的运算及基本初等函数与其图象. (这部分内容贯穿全书, 不另行复习.)

2. 极限是微积分的理论基础 微积分中的重要概念, 如连续、导数、定积分等都是用不同类型的极限来定义的, 由此可见极限的重要性. 本章的重点内容是极限. 既要准确理解极限的概念、性质和极限存在的条件, 又要能准确地求出各种极限. 求极限的方法很多, 综合起来主要有:

- ① 利用极限的四则运算与幂指数运算法则;
- ② 利用函数的连续性;
- ③ 利用洛必达法则;
- ④ 分别求左、右极限;
- ⑤ 利用变量替换与两个重要极限;
- ⑥ 数列极限转化为函数极限;
- ⑦ 利用夹逼定理;
- ⑧ 利用导数的定义求极限;
- ⑨ 利用泰勒公式.

3. 无穷小就是极限为零的变量 极限问题可归结为无穷小问题. 要理解无穷小的概念, 掌握无穷小的比较方法, 会确定无穷小的阶数, 并会用重要的等价无穷小替换求极限.

4. 我们研究的对象是连续函数或除若干点外是连续的函数 由于函数的连续性是通过极限定义的, 所以判断函数是否连续及函数间断点的类型等问题本质上仍是求极限. 要掌握判断函数连续性 (特别是分段函数在分界点处的连续性) 以及求间断点的方法, 会判别函数间断点的类型.

5. 有界闭区间上连续函数的基本性质 函数的许多重要性质都与连续性有关. 因此, 我们要了解有界闭区间上连续函数的重要性质, 包括: 有界性定理, 最大值、最小值定理和介值 (中间值) 定理, 并掌握这些定理的简单应用.

考核知识要点讲解

一、极限的概念与性质

(一) 极限的定义

【定义 1.1】 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正整数 } N, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 有 } |x_n - A| < \varepsilon.$

若 x_n 存在极限 (有限数), 又称 $\{x_n\}$ 收敛, 否则称 $\{x_n\}$ 发散.

【定义 1.2】 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正数 } X, \text{ 当 } |x| > X \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$

类似可定义: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A.$

【定义 1.3】 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正数 } \delta, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$

类似可定义 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的右极限与左极限:

$$f(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A, \quad f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A.$$

【注】 定义中的条件“ $0 < |x - x_0|$ (即 $x \neq x_0$)”必不可少.

(二) 极限的基本性质与两个重要极限

► 1. 数列极限的基本性质

【定理 1.1】(极限的不等式性质) 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = b.$

若 $a > b$, 则 $\exists N$, 当 $n > N$ 时, 有 $x_n > y_n$; 若 $n > N$ 时, $x_n \geq y_n$, 则 $a \geq b$.

【定理 1.2】(收敛数列的有界性) 设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则数列 $\{x_n\}$ 有界 (即 $\exists$ 常数 $M > 0$, 使 $|x_n| \leq M, n = 1, 2, \dots$).

► 2. 函数极限的基本性质

【定理 1.3】(极限的不等式性质) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B.$

若 $A > B$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > g(x)$;

若 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) \geq g(x)$, 则 $A \geq B$.

【推论】(极限的保号性) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. 若 $A > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > 0$.

若 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) \geq 0$, 则 $A \geq 0$.

【定理 1.4】(存在极限的函数局部有界性) 设存在极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $f(x)$ 在 x_0 的空心邻域 $U_0(x_0, \delta) = \{x | 0 < |x - x_0| < \delta\}$ 内有界, 即 $\exists \delta > 0, M > 0$, 使得 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x)| \leq M$.

【注】 其他的极限过程如 $x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty$ 等等也有类似的结论.

► 3. 数列极限与函数极限的关系

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = A$.

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, x_n \neq x_0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

► 4. 两个重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad \left(\text{或 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \right) \quad (1.1)$$

【例 1.1】 判断下列结论是否正确, 并证明你的判断.

(I) 若 $x_n < y_n (n > N)$, 又存在极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = B$, 则 $A < B$;

(II) 设 $f(x)$ 定义在 (a, b) , 又 $c \in (a, b)$, 并存在极限 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 有界;

(III) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $\frac{1}{f(x)}$ 有界.

【解】 (I) 不正确. 在题设下只能保证 $A \leq B$, 不能保证 $A < B$. 例如, $x_n = \frac{1}{n}, y_n = \frac{2}{n}$, 则

$$x_n < y_n, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0.$$

评注 对不等式 $x_n < y_n (n > N)$ 两边取极限时(以极限存在为前提),除保持不等号外还要带上等号,即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$.

(II) 不正确. 这时只能保证: $\exists c$ 的一个空心邻域 $U_0(c, \delta) = \{x \mid 0 < |x - c| < \delta\}$, $f(x)$ 在 $U_0(c, \delta)$ 有界, 不能保证 $f(x)$ 在 (a, b) 有界. 例如: $f(x) = \frac{1}{x}$, $(a, b) = (0, 1)$, 取 $c \in (0, 1)$, 则 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \frac{1}{c}$, 但 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 无界.

(III) 正确. 因为 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$, 由存在极限的函数的局部有界性 $\Rightarrow \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $\frac{1}{f(x)}$ 有界.

二、极限存在性的判别(极限存在的两个准则)

(一) 夹逼定理

【定理 1.5】(数列情形) 若存在 N , 使得当 $n > N$ 时有 $y_n \leq x_n \leq z_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

【定理 1.6】(函数情形) 若存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 又 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

【注】 ① 其他的极限过程也有类似的结论.

② 注意夹逼定理的两个条件: i) $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$; ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 才有结

论 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在且为 A .

(二) 单调有界数列必收敛定理

【定理 1.7】 若数列 $\{x_n\}$ 单调上升有上界, 即 $x_{n+1} \geq x_n (n = 1, 2, \dots)$, 并存在一个数 M 使得对一切的 n 有 $x_n \leq M$, 则 $\{x_n\}$ 收敛. 即存在一个数 a , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且有 $x_n \leq a (n = 1, 2, \dots)$.

若数列 $\{x_n\}$ 单调下降有下界, 即 $x_{n+1} \leq x_n (n = 1, 2, \dots)$, 并存在一个数 m 使得对一切的 n 有 $x_n \geq m$, 则 $\{x_n\}$ 收敛. 即存在一个数 a , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且有 $x_n \geq a (n = 1, 2, \dots)$.

此外, 还可通过数列与级数的关系讨论敛散性: 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 的部分和数列是 $\{x_{n+1} - x_1\}$, 故数列 $\{x_n\}$ 的敛散性与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 的敛散性相同.

(三) 单侧极限与双侧极限的关系

【定理 1.8】 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = A$.

对于分段函数 $f(x) = \begin{cases} g(x), & x_0 - \delta < x < x_0, \\ h(x), & x_0 < x < x_0 + \delta, \end{cases}$ 考察 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 是否存在就要分别求

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) \quad \text{与} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x).$$

【例 1.2】 设 $f(x) = \begin{cases} 2(x+1)\arctan \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 1, & x = 0, \\ \frac{\ln(1+ax^2)}{x\sin x}, & x < 0, \end{cases}$ 又 $a \neq 0$, 问 a 为何值时 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在.

【分析】 分别求右、左极限 $f(0+0)$ 与 $f(0-0)$, 由 $f(0+0) = f(0-0)$ 定出 a 值.

【解】 $f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2(x+1)\arctan \frac{1}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \pi,$

$$f(0-0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{\ln(1+ax^2)}{ax^2} \cdot \frac{ax^2}{x\sin x} \right] = 1 \cdot a \cdot 1 = a (a \neq 0),$$

由 $f(0+0) = f(0-0)$, 得 $a = \pi$. 因此, 仅当 $a = \pi$ 时, 存在 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \pi$.

【例 1.3】 设 $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$

(A) 0.

(B) $+\infty$.

(C) $-\infty$.

(D) 不存在, 但也不是 ∞ .

【分析】 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$, 故应分左右极限来讨论. 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{令 } \frac{1}{x} = t}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} xe^{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{令 } \frac{1}{x} = t}{=} \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{e^t}{t} = 0,$$

因此应选(D).

(四) 证明一元函数 $f(x)$ 的极限不存在常用的两种方法

方法 1° 证明函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在的主要方法是考察左右极限. 若 $f(x_0+0)$ 或 $f(x_0-0)$ 中至少有一个不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在; 若 $f(x_0+0)$ 与 $f(x_0-0)$ 都存在, 但 $f(x_0+0) \neq f(x_0-0)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 也不存在.

当 $x \rightarrow \infty$ 时, 对含有 $a^x (a > 0, a \neq 1)$ 或 $\arctan x$ 或 $\operatorname{arccot} x$ 的函数极限, 一定要对 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 分别进行讨论, 若两者相等, 则 $x \rightarrow \infty$ 时极限存在, 否则不存在.

方法 2° 若 $\exists x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0, \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$ 不存在或 $\exists x_n \rightarrow x_0 (x_0 \neq x_0), y_n \rightarrow x_0 (y_n \neq x_0)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在.

三、求极限的方法

(一) 利用极限的四则运算与幂指数运算法则求极限

【定理 1.9】

(1) 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B, \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0), \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = A^B (A > 0).$$

(2) 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $g(x)$ 有界, 则 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = 0$.

(3) 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty (+\infty)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty (+\infty)$ 或 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A \neq 0 (A > 0)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \infty (+\infty).$$

(4) 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty (+\infty)$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $g(x)$ 有界, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \infty (+\infty).$$

(5) 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = \begin{cases} 0, & 0 < A < 1, \\ +\infty, & A > 1; \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x)^{f(x)} = \begin{cases} +\infty, & A > 0, \\ 0, & A < 0. \end{cases}$$

(6) 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, $f(x) > 0 (0 < |x - a| < \delta)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B \neq 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = \begin{cases} 0, & B > 0, \\ +\infty, & B < 0. \end{cases}$$

【注】① 对 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$ 等各类未定式不能直接用上述运算法则. 其中最基本的是 $\frac{0}{0}$ 与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 其他类型应经恒等变形转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的未定式.

求 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限的方法有多种(参看题型一), 其中一种技巧是设法消去分子、分母中极限为零或 ∞ 的因子, 于是转化为可以直接用四则运算法则的情形.

② 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 不存在也不为 ∞ , 则 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)]$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 均不存在也不为 ∞ . 但是, 当 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 都不存在也不为 ∞ 时, 求 $f(x) \pm g(x)$, $f(x)g(x)$, $\frac{g(x)}{f(x)}$ 的极限均要作具体分析.

【例 1.4】 求下列极限:

$$(I) \quad w = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x - 1}{\sqrt{x^2 - \sin x}}; \quad (II) \quad w = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin x} - \sqrt{\cos x}}{\arcsin^2 x};$$

$$(III) \quad w = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{1 + \cot^2 x}; \quad (IV) \quad w = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^{2n}(\arctan x).$$

【解】 (I) $w = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(\sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} + 1 - \frac{1}{x} \right)}{x \sqrt{1 - \frac{\sin x}{x^2}}} = \frac{2 + 1}{1} = 3.$

$$(II) \quad w = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x \sin x - \cos x}{x^2 (\sqrt{1 + x \sin x} + \sqrt{\cos x})} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} + \frac{\sin x}{x} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{3}{4}.$$

(III) 由于 $1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$, $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$, 于是

$$w = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{1 + \cot^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 2x)}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - 2\sin^2 x)}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sin^2 x}{\sin^2 x} = e^{-2}.$$

(IV) 当 $x = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^{2n}(\arctan x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^{2n} 0 = 1$; 当 $x \neq 0$ 时, 由于 $|\cos(\arctan x)| < 1$, 故原式 $= 0$.

【例 1.5】 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [4f(x) + 6]$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【分析】 由已知极限等式知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x-4)f(x) = 6$, 从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3x-4)f(x)}{3x-4} = 0$.
于是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3xf(x) = 6$. 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 2$.

(二) 利用洛必达法则求未定式的极限

求 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式的常用方法是洛必达法则. 具体方法如下:

【定理 1.10】 设 (i) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ (或 ∞); (ii) $f(x), g(x)$ 在 $x = a$ 的空心邻域可导, $g'(x) \neq 0$; (iii) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$, 其中 A 可以是有限数也可以是 ∞ 或 $\pm \infty$.

【注】 将 $x \rightarrow a$ 改为 $x \rightarrow a^+$ 或 $x \rightarrow a^-$, 或 $x \rightarrow \infty$ 或 $\pm \infty$ 等也有相应的洛必达法则.

应用上述法则时应注意:

1° 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在, 不能断定 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 不存在.

例如, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1$, 但 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x + \sin x)'}{x'} = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \cos x)$ 不存在.

2° 要验证应用法则的条件. 例如, 以下运算是错误的.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + \cos x)'}{x'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sin x}{1} = 1.$$

事实上 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \cos x}{x} = \infty$, 这里 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \cos x}{x}$ 不是 $\frac{0}{0}$ 型也不是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的未定式.

3° 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 仍然是 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式, 可连续用洛必达法则, 只要符合条件, 一直可用到求出极限为止.

4° 其他类型未定式 ($0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$ 等) 需先化成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 然后再用洛必达法则.

5° 使用洛必达法则也要用到一些技巧. 如结合应用变量替换、等价无穷小因子替换、恒等变形等, 以及极限的四则运算法则、有确定非零极限的因子应先求出等方法.

如果 $\lim f(x)^{g(x)}$ 是 1^∞ 型的未定式, 由于 $\lim f(x) = 1$, $\ln f(x) = \ln[f(x) - 1 + 1] \sim f(x) - 1$. 于是 $\lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim g(x) \ln f(x)} = e^{\lim [g(x)(f(x) - 1)]}$.

这种等价无穷小因子替换有时可以简化计算.

【例 1.6】 (I) 设常数 $a > 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin x}}{\sin^3 x}$; (II) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}$.

【分析】 第(I)题是 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 若直接用洛必达法则求解较繁, 这里先分离出非未定式因子, 再用等价无穷小因子替换: 若 $a > 0$, 则 $a^y - 1 \sim y \ln a$ ($y \rightarrow 0$), 最后用洛必达法则求解. 第(II)题是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式, 直接用洛必达法则求不出该极限, 若利用

$$\frac{e^x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}} = \left[\frac{e}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} \right]^x,$$

则可将原极限变为 1^∞ 型未定式求极限.

【解】 (I) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin x}}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{\sin x} (a^{x - \sin x} - 1)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} a^{\sin x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{x - \sin x} - 1}{x^3}$

$$= \ln a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \ln a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{6} \ln a.$$

$$(II) \text{ 原式} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{e}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} \right]^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \left[1 - x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right]}, \text{ 而}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[1 - x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right] & \stackrel{\text{令 } y = \frac{1}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1 - \ln(1+y)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y - \ln(1+y)}{y^2} \\ & = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1 - \frac{1}{1+y}}{2y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{(1+y) - 1}{2y(1+y)} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

因此, 原式 = $e^{\frac{1}{2}}$.

评注 在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{e}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} \right]^x$ 中, 虽然 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$, 但是也不能用 e 来替换 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 而变成求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1^\infty$. 因为这样的替换既不是无穷小量之间的等价替换, 也不是无穷大量之间的等价替换. 另外, 这样的替换也不是用函数的连续性求函数极限. 为了理解这样替换不合理, 可以从变量的变化速度来说明: 当 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 换成 e 时, 说明已经令其中的变量 x 趋于 $+\infty$ 取极限, 但幂指数中的 x 却没有同时取极限, 这与在整个极限中 x 必须同时趋于 $+\infty$ 相矛盾.

【例 1.7】 求 (I) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x}$; (II) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}(\sqrt[x]{x} - 1)$.

【解】 (I) 因为 $\sqrt[x]{x} = x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln x}{x}}$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x} = e^0 = 1$.

(II) 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x} = 1$, 故该极限是 $\infty \cdot 0$ 型未定式. 可化成 $\frac{0}{0}$ 型未定式并利用等价无穷小因子替换求极限.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{1}{x}} - 1}{x^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{\ln x}{x}} - 1}{x^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x \cdot x^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^{\frac{3}{2}}} = 0.$$

【例 1.8】 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin 2x^2)^{\frac{1}{x^2}} - e^2}{x^n} = a (a \neq 0)$, 求 n 及 a 的值.

$$\begin{aligned} \text{【解】} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin 2x^2)^{\frac{1}{x^2}} - e^2}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x^2} \ln(1 + \sin 2x^2)} - e^2}{x^n} \\ &= e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x^2} \ln(1 + \sin 2x^2) - 2} - 1}{x^n} = e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x^2} \ln(1 + \sin 2x^2) - 2}{x^n} \\ &= e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin 2x^2) - 2x^2}{x^{n+2}} = e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{4x \cos 2x^2}{1 + \sin 2x^2} - 4x}{(n+2)x^{n+1}} \\ &= \frac{4e^2}{n+2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x^2 - (1 + \sin 2x^2)}{x^n} \cdot \frac{1}{1 + \sin 2x^2} \\ &= \frac{4e^2}{n+2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4x \sin 2x^2 - 4x \cos 2x^2}{nx^{n-1}} = \frac{-16e^2}{n(n+2)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x^2 + \cos 2x^2}{x^{n-2}} \end{aligned}$$

$$= \frac{-16e^2}{n(n+2)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{n-2}} = a \neq 0,$$

由此可知 $n = 2, a = -2e^2$.

评注 此题的解法中,除用洛必达法则外,还用了等价无穷小因子替换,这比只用洛必达法则要简单一些.

(三) 利用函数的连续性求极限

1. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 连续,按定义则有 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. 因此对连续函数求极限就是用代入法求函数值.

2. 一切初等函数在它的定义域上连续. 因此,若 $f(x)$ 是初等函数, a 属于它的定义域,则

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

3. 设 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$,若补充定义 $g(a) = A$,则 $g(x)$ 在 $x = a$ 连续. 若又有 $y = f(u)$ 在 $u = A$ 连续,

则由复合函数的连续性得 $\lim_{x \rightarrow a} f[g(x)] = f\left[\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right] = f(A)$.

【注】 可用此结论证明幂指数极限运算法则.

(四) 利用变量替换法和两个重要极限求极限

通过变量替换,把求某个极限转化为求另一个极限,若后者是已知的,则问题就解决了.

1. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$, $\lim_{u \rightarrow +\infty} f(u) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f[\varphi(x)] \xrightarrow{u = \varphi(x)} \lim_{u \rightarrow +\infty} f(u) = A$.

(若把 $x \rightarrow +\infty$ 改为 $x \rightarrow -\infty$ 或 $x \rightarrow x_0$, 上述结论仍成立.)

2. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = u_0$, $f(u)$ 在 u_0 连续, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] \xrightarrow[\text{当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时 } u \rightarrow u_0]{u = \varphi(x)} \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0)$.

【例 1.9】 求下列极限:

$$(I) \quad w = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{\theta}{n} \right)^{n^2}; \quad (II) \quad w = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x; \quad (III) \quad w = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3 - e^x}{2 + x} \right)^{\frac{1}{\sin x}}.$$

【解】 本题中三个极限都是 1^∞ 型未定式,可用前面介绍的作法:

$$\lim f(x)^{g(x)} = e^J, \text{ 其中 } J = \lim g(x) [f(x) - 1].$$

$$(I) \quad w = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos^2 \frac{\theta}{n} \right)^{\frac{n^2}{2}} = e^J, \text{ 而 } J = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2} \left(\cos^2 \frac{\theta}{n} - 1 \right) = -\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin^2 \frac{\theta}{n} = -\frac{\theta^2}{2},$$

故 $w = e^{-\frac{\theta^2}{2}}$.

$$(II) \quad w = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = e^J, \text{ 而}$$

$$\begin{aligned} J &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right) \xrightarrow{x = \frac{1}{t}} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t + \cos t - 1}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos t}{t} = 1 - \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2}{t} = 1, \end{aligned}$$

故 $w = e$.

$$(III) \quad w = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3 - e^x}{2 + x} \right)^{\frac{1}{\sin x}} = e^J, \text{ 而}$$