

# 广西藥用植物圖誌

(初稿)

第一輯



广西僮族自治區中醫藥研究所編

一九五九年四月

## 內 容 提 要

這本書是把常用的廣西藥用植物四十種介紹出來。每種藥物除詳細描述形態，及分類學特徵外，並繪製成圖。對於它的分佈，藥用部份、化學成份、採集季節、性味、用途，方例等，也扼要地加以報導。

本書所載的藥物，完全是以廣西產的中醫或民間習用有效的藥物為主要編輯內容，同時也記載了一些地方別名或名實相混的有關種類。

本書可作為醫藥科學工作者及教育工作者植物學工作者和農村業務部門人員參考資料。

## 編 者 話

一、本誌編輯材料，完全是廣西產藥物為主。尤以民間習用，經試驗有效的常用草藥為選輯標準。

二、藥物名稱，原則上以本草名稱為標準，其不見于本草的藥物，則以廣西民間習用的名稱為主，各地區俗稱名稱為副。

三、本誌編次，被子植物系按照恩格勒氏系統排列；科內之屬種，則按拉丁字母順序排列。

四、本誌編輯目的，在于及時推廣經驗，在選材方面，完全根據現有材料，亦即有什么選什么，做到什么選什么。

五、本誌方例，絕大部份是經我所試驗有效的介紹，為了證明藥效，間有採集前人經驗。

六、由於我們限於水平，編寫經驗不足，本誌在內容和形式上，都不免存在着缺點和錯誤。希望醫藥界先進及關心祖國醫學讀者，隨時給以批評和指正，以便我們改進今后的工作。

# 目 錄

內容摘要	.....
編者話	.....
一枝箭	1
入地蜈蚣	3
獮瘤卵	5
半邊旗	7
鳳尾草	10
金花草	13
銀錢蕨	15
肉碎補	17
陰陽草	19
水 蓼	21
土荆芥	23
鷄骨草	25
相思藤	27
蓖 麻	29
地桃花	31
山芝麻	33
使君子	35
白花丹	39
斷腸草	41
夾竹桃	45
蘿芙木	7
黃花夾竹桃	51

古羊藤	53
薑	55
益母草	57
荆芥	61
小韓信草	63
鱠腸	65
土生地	67
石胡荽	69
白花草	71
香附子	73
水蜈蚣	75
三叶半夏	77
大叶半夏	79
七叶一枝花	81
小蒜	83
韭菜	85
罗裙帶	87
蓬莪术	89

# 一枝箭

别名：瓶尔小草

科名：瓶尔小草科 Ophioglossaceae

学名：Ophioglossum nudicaule L.f. (O. Japonicum  
Frantle; O. qarvitolum Grewat. HK)

生态：直立草本，生于较潮濕的曠野及山地。

形态：植株矮小，根莖小略具塊莖，高4—10厘米。营养叶單一，狹卵形或橢圓形，長約2—3厘米，寬約10毫米。无柄或近无柄，位于植株較上处。質薄稍帶肉質，叶脉不明顯，穗梗自叶基生出，長約为营养叶之一半。孢子囊在穗梗边缘着生，孢子囊大約10余对排列为二行，形成密集的小穗以孢子繁殖。

分佈：广西南部西部各地均有。

药用部分：全草。

採集季節：夏秋可採。

性味：味甘，微酸，气平，性涼无毒。

用途：治蛇伤及心胃气痛。

方例：(一)本所驗方：一枝箭干粉一分，一天分三次酒送下，另用一分酒調外擦由上而下，治毒蛇咬伤有效。用粉2—3厘開酒灌蛇不过十分鐘即死，用生的少許擦掌中，蛇聞氣即头低不能動，听捉。

(二)本所驗方：一枝箭干粉每服五厘酒送下，治心胃气痛，頑固久病，也愈。



## 入地蜈蚣

別名：七叶一枝花（南宁）七指蕨，（中國蕨類植物圖說）。

科名：七指蕨科，*Helminthostachys tachyacea*。

学名：*Helminthostachys Zeylanica* (L) Hk. (*Osmunda Zeylanica* L.)

生态：多年生宿根草本，生于溪边，溝邊或樹林中濕地。

形态：地下莖匍匐橫走，肉質，并有長短大小不一的根，長10至15厘米，寬1至2厘米，外面紫紅色，內面白色，整個根莖形似蜈蚣，故俗稱“入地蜈蚣”。葉柄長20至30厘米，棕褐色，葉呈掌狀鳥足形，草質，無毛，營養葉三出，長15至20厘米，寬2至3厘米，基部有短柄，長0.5至0.8厘米，二叉分，中央羽片三叉分，裂片橢圓形至披針形，長8至14厘米，寬2至3厘米，先端尖，基部楔形，邊緣有波浪形的小鋸齒或近全緣，主脈明顯隆起，葉脈分離，1至2次分叉，孢子囊穗單生，從葉片基部中間長出，梗長7至9厘米，棕褐色，穗長8至12厘米，青綠色，寬5至10毫米，孢子囊球形無柄，幾顆聚生形成長穗，聚有鷄冠狀的葉狀附屬物，孢子卵形，平滑。孢子或分根莖繁殖。

分佈：廣西臨桂，石龍，南宁等地區均有分佈，南宁市郊產于青山塔，剪刀，陸流等地。

藥用部分：地下莖。

採集季節：四季可采。

性味：味苦微甜，氣平，性涼潤，無毒。

用途：內服清熱化痰，治療熱咳嗽，及跌打內傷。

方例：（一）本所驗方：入地蜈蚣五錢，豬肺四兩，同煲湯內服，有良效。

（二）本所驗方：入地蜈蚣童便浸四十九日，洗淨晒干，研末，每服六分，酒或開水送下，治跌打內傷，散瘀止痛，有捷效。



## 獮 猶 卵

別名：蕨薯，天鵝抱蛋（桂北）圓羊齒，腎蕨（中國藥類植物圖說）

科名：骨碎補科 *Davalliaceae*

學名：*Nephrolepsis Cordifolia* (L.) Presl.

生态：多年生草本，生于林下，林下岩縫或溪邊潮濕土中：

形态：植株高30—70厘米，根狀莖直立或斜出，被鱗片。根上生有大量塊莖，球形，如猴子卵，故俗稱獮猶卵，或天鵝抱蛋。葉簇生，柄長5—10厘米，下部有薄狹棕褐色鱗片，葉片線狀披斜形，長30—60厘米，寬4—5厘米，多數羽狀互生，披斜形，緊密相列，長2—3厘米，寬5—6毫米，尖端鈍，基部心形或圓形，其上方略呈耳狀，邊緣有鈍齒；葉莖革質，中軸棕黃色略被棕色鱗片，孢子葉片近全緣，孢子囊羣近葉緣而生，中脈兩旁各一行，囊羣蓋腎形。孢子繁殖。

分佈：廣西各地均有，南宁市郊青山塔一帶亦有分佈。

藥用部分：球根。

采集季節：秋冬采集。


性味：味甘清帶澀，氣薄，性平，無毒。

用途：止水瀉治療后病。

方例：(一)本所驗方獮猶卵生的廿枚搗爛沖開水過濾取汁，內服治水瀉有效。

(二)本所驗方：獮猶卵醋浸備用。時症癆成人吃十枚，小兒麻后病吃三至五枚有效。

(三)民間經驗：內服獮猶卵治小兒疳積。搗爛外敷熱瘡。



## 半邊旗

別名：甘草蕨、半邊蓮、半邊蕨。

科名：鳳尾蕨科：Pteridaceae

學名：Pteris semipinnata L.

生态：多年草本，生于山麓溪边、林下岩下或牆上的湿润地方，为酸性土指示植物之一种。

形态：根状茎短而倾卧，被黑褐色鳞片。叶柄瘦长，深褐色，光滑而坚硬，長約20—42厘米。叶片革質，卵狀披針形，一回羽狀複葉，羽片4—6对，亞對生，上部与羽狀深裂達于叶柄，羽片橢圓形或橢圓形，全緣下部有半羽狀片，疏生，全緣不實，叶緣有微細鋸齒，叶脉明顯，孢子葉沒有細鋸齒。孢子囊羣線形，連續排于叶緣，孢子種羣蓋與孢子囊羣同形，膜質，由孢子繁殖。

分布：广西各地均有，南宁市郊各山地都產。

藥用部分：全草。

采集季節：四季可采。

性味：味辛微苦、氣薄、性溫、無毒。

用途：散疔毒，刀傷止血埋口，止吐血治寒病。

禁忌：熱病慎用。

方例：（一）本所驗方：半邊旗嫩葉二份，黃糖一份搗爛敷馬口疔特效。

（二）本所驗方：生半邊旗搗爛敷或干擦撒刀斧傷處，止血埋口。

（三）本所驗方：生半邊旗一錢，搗爛米泔水沖服治吐血。





## 鳳尾草

科名：鳳尾蕨科 Pteridaceae

学名：Pteris serrulata L.f.

生态：多年生草本，喜生于潮湿的岩壁脚或井边等阴凉地方。

形态：根状茎硬而短。叶柄直立秃净，叶近革质。叢生，一或二次回狀複叶，羽片在叶軸下延为翅，翅下部漸狹，羽片約有4—5对，对生，下部羽片單生，不实，叶有鋸齒，下部的羽片兩側有數枚長條形广展的小羽片；叶脉明顯單出或分枝。孢子綫連續排列于叶緣，膜質近緣生。由孢子繁殖。

分佈：广西各地均有。

药用部分：全草（生用或晒干用）。

采集季節：夏秋采用。

性味：味微甘苦辛、气平、性涼无毒；

用途：清大腸、肺熱、治熱性赤痢及齒痛，止吐血，为病疾藥。

禁忌：寒性白痢忌用。

方例：（一）本所驗方：生嫩鳳尾草四至六兩，煎湯一碗，調五錢蜂蜜服一二服痊愈。

（二）本所驗方：鳳尾草五份，銻綫蕨一份、海金沙藤一份、炒黑制成稠流膏剂每服10—15毫升冲開水一倍，日三服，治熱性赤痢”療效很高。

（三）本所驗方：鳳尾草根，蛇抱勒根等分，八釐少許搗爛塞牙根上，立止牙痛。



