



全国高等学校临床医学专业试题库



妇产科学

主 编 丰有吉



人民卫生出版社

全国高等学校临床医学专业试题库

妇 产 科 学

主 编 丰有吉

副主编 谢 幸 沈 铿

编 者

复旦大学妇产科医院

中国医科大学附属盛京医院

第三军医大学大坪医院

中山大学孙逸仙纪念医院

上海交通大学医学院附属仁济医院

西安交通大学医学院第一附属医院

四川大学华西第二医院

南京大学附属鼓楼医院

浙江大学医学院附属妇产科医院

天津医科大学

上海交通大学附属第一人民医院

华克勤 胡昌东 丁景新

张淑兰 杜 鹃 李 洁

李 力 颜耀华 易 萍

杨冬梓 张清学 李 琳

狄 文 季 芳 张 羽

苟文丽 李雪兰

胡丽娜 董晓静 傅 瑾

胡娅莉 周 白

谢 幸 李 晓

薛凤霞 李 洁 张慧英

丰有吉 缪 懿 陆 萌

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

妇产科学/丰有吉主编. —北京: 人民卫生出版社,
2012. 6

(全国高等学校临床医学专业试题库)

ISBN 978-7-117-15654-7

I. ①妇… II. ①丰… III. ①妇产科学-高等
学校-习题集 IV. ①R71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 036304 号

门户网: www.pmph.com 出版物查询、网上书店

卫人网: www.ipmph.com 护士、医师、药师、中医

师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

妇 产 科 学

主 编: 丰有吉

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 三河市富华印刷包装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 31

字 数: 771 千字

版 次: 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-15654-7/R · 15655

定价(含光盘): 62.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

前言

考试是教育评价重要途径,成绩也是检验教师教学和学生学习效果的量化指标。试题作为考试的重要工具,编写临床医学试题,建设临床医学题库对提高医学教育质量,培养合格医学人才具有重要意义。

上海交通大学医学院,联合复旦大学医学院,中南大学湘雅医学院,华中科技大学同济医学院,中山大学医学院,吉林大学白求恩医学院,哈尔滨医科大学,中国医科大学,首都医科大学,重庆医科大学等学校,组织热爱教学工作,富有教学经验,熟悉医学考试、命题要则和试题编制的临床教师,共同编制临床医学试题题库。

试题题库编制,以“中国本科医学教育标准(临床医学)”为纲,初步临床能力,终身学习能力,良好职业素质为目标。体现医学模式、教育思想、教学方式的进展。以临床医学教学大纲(课程计划)、临床见习、实习大纲(计划)为基本,临床执业医师资格考试大纲为导向,对接住院医师规范化培训大纲。试题内容以人卫社妇产科学五年制第7版,七、八年制第2版为基本教材。

试题类型主要为临床医学综合考试、国家执业医师考试题型,体现考试公正、客观、标准化的科学和统一,采用A型、B型和X型选择题,共有A1、A2、A3、A4、B1、X型题。也有适量临床教学用的是是非、填空、解释、简答、问答题和临床病例仿真题(案例渐进分析题)等其他类型。

试题题库适用于临床医学教育见习、实习、毕业实习临床考试和毕业综合考试,也可用于临床执业医师资格考试和临床住院医师培训考试等。题库,尤其网络试题,更适于辅助医学生或医师模拟试题自测考试(人机互动),以了解医学知识和临床技能水平,作为备考摸底。

编制试题题库是一项繁复的系统工程,各编者学院领导大力支持,尤其各位编者在繁忙的临床工作中,能静下心来专注于编著,才有试题题库问世。在此,我谨代表全体编委和编者一并表示诚挚的谢忱。由于编者水平和时间仓促,试题难免会有不足甚至错误,恳请广大师生批评指正。

丰有吉

2011.12

目 录

试 题 部 分

第一章 女性生殖系统解剖	1
第二章 女性生殖系统生理	7
第三章 妊娠生理	15
第四章 妊娠诊断	22
第五章 产前保健	27
第六章 正常分娩	42
第七章 正常产褥	52
第八章 妊娠时限异常	60
第九章 妊娠特有疾病	66
第十章 异位妊娠	74
第十一章 妊娠晚期出血	81
第十二章 多胎妊娠与巨大胎儿	86
第十三章 羊水量异常	93
第十四章 胎儿发育异常及死胎	98
第十五章 胎儿窘迫与胎膜早破	102
第十六章 妊娠合并内科疾病	108
第十七章 妊娠合并外科疾病	127
第十八章 妊娠合并性传播疾病	132
第十九章 遗传咨询、产前筛查与产前诊断	140
第二十章 异常分娩	143
第二十一章 分娩期并发症	163
第二十二章 异常产褥	172
第二十三章 妇科病史及检查	181
第二十四章 外阴上皮内非瘤样病变	191
第二十五章 外阴及阴道炎症	195
第二十六章 宫颈炎症	201
第二十七章 盆腔炎症	206
第二十八章 外阴肿瘤	212
第二十九章 宫颈肿瘤	219
第三十章 子宫肿瘤	227

第三十一章	卵巢肿瘤	235
第三十二章	输卵管肿瘤	243
第三十三章	妊娠滋养细胞疾病	247
第三十四章	生殖内分泌疾病	264
第三十五章	子宫内膜异位症和子宫腺肌病	279
第三十六章	女性生殖器官发育异常	288
第三十七章	女性盆底功能障碍性疾病	297
第三十八章	不孕症与辅助生殖技术	306
第三十九章	性及女性性功能障碍	313
第四十章	计划生育	316
第四十一章	妇女保健	324
第四十二章	妇产科常用特殊检查	329
第四十三章	妇产科内镜	358

答案与解析部分

第一章	女性生殖系统解剖	375
第二章	女性生殖系统生理	377
第三章	妊娠生理	380
第四章	妊娠诊断	382
第五章	产前保健	384
第六章	正常分娩	387
第七章	正常产褥	389
第八章	妊娠时限异常	391
第九章	妊娠特有疾病	393
第十章	异位妊娠	396
第十一章	妊娠晚期出血	397
第十二章	多胎妊娠与巨大胎儿	399
第十三章	羊水量异常	402
第十四章	胎儿发育异常及死胎	404
第十五章	胎儿窘迫与胎膜早破	406
第十六章	妊娠合并内科疾病	408
第十七章	妊娠合并外科疾病	413
第十八章	妊娠合并性传播疾病	414
第十九章	遗传咨询、产前筛查与产前诊断	417
第二十章	异常分娩	419
第二十一章	分娩期并发症	423
第二十二章	异常产褥	427
第二十三章	妇科病史及检查	429
第二十四章	外阴上皮内非瘤样病变	432

第二十五章	外阴及阴道炎症	434
第二十六章	宫颈炎症	436
第二十七章	盆腔炎症	438
第二十八章	外阴肿瘤	440
第二十九章	宫颈肿瘤	443
第三十章	子宫肿瘤	445
第三十一章	卵巢肿瘤	448
第三十二章	输卵管肿瘤	451
第三十三章	妊娠滋养细胞疾病	453
第三十四章	生殖内分泌疾病	457
第三十五章	子宫内膜异位症和子宫腺肌病	461
第三十六章	女性生殖器官发育异常	464
第三十七章	女性盆底功能障碍性疾病	466
第三十八章	不孕症与辅助生殖技术	469
第三十九章	性及女性性功能障碍	472
第四十章	计划生育	474
第四十一章	妇女保健	476
第四十二章	妇产科常用特殊检查	478
第四十三章	妇产科内镜	484

试题部分

第一章

女性生殖系统解剖

【A1型题】

1. 卵巢动静脉进入卵巢门前经过
A. 骨盆漏斗韧带 B. 圆韧带 C. 子宫骶韧带
D. 主韧带 E. 卵巢固有韧带
2. 月经后子宫内膜的再生起于
A. 子宫肌层 B. 致密层 C. 基底层 D. 海绵层 E. 功能层
3. 漏斗骨盆是指
A. 骨盆入口平面狭窄 B. 耻骨弓狭小 C. 中骨盆及出口平面狭窄
D. 小骨盆矢状径短 E. 入口后矢状径短
4. 关于前庭大腺错误的是
A. 位于小阴唇后部
B. 被球海绵体肌覆盖
C. 如黄豆大小,左右各一
D. 开口于前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟
E. 正常情况下不能触及此腺,若腺管口闭塞可形成囊肿或脓肿
5. 女性内外生殖器官的血液主要供应错误的是
A. 卵巢动脉 B. 子宫动脉 C. 阴道动脉 D. 阴部内动脉 E. 阴部外动脉
6. 关于骨盆底描述错误的是
A. 前方为耻骨联合下缘
B. 后方为骶岬
C. 两侧为耻骨降支、坐骨升支及坐骨结节
D. 两侧坐骨结节前缘的连线将骨盆底分为前、后两部
E. 封闭骨盆出口的软组织,由多层肌肉和筋膜组成
7. 子宫最狭窄的部分为
A. 子宫颈管 B. 子宫峡部 C. 子宫颈外口 D. 组织学内口 E. 解剖学内口

8. 关于宫颈上皮错误的是
- A. 宫颈阴道部为单层鳞状上皮覆盖
 - B. 宫颈黏膜受性激素影响也有周期性变化
 - C. 宫颈外口柱状上皮与鳞状上皮交界处是宫颈癌的好发部位
 - D. 宫颈管黏膜上皮细胞呈单层高柱状
 - E. 黏膜层有许多腺体能分泌碱性黏液
9. 内生殖器的神经支配主要为
- A. 交感神经支配
 - B. 交感与副交感神经支配
 - C. 大部分在宫旁形成骨盆神经丛
 - D. 交感神经纤维自腹主动脉分出
 - E. 以上均不正确
10. 关于中心腱正确的是
- A. 中心腱位于肛提肌的深层
 - B. 对骨盆脏器起着强大的支托作用
 - C. 由三对肌肉和肛门外括约肌的肌腱会合而成的
 - D. 分娩时极度受压,不易撕裂
 - E. 以上均不对
11. 卵巢动脉由
- A. 髂内动脉前干分出
 - B. 腹主动脉分出
 - C. 肾动脉分出
 - D. 髂外动脉分出
 - E. 髂总动脉分出
12. 关于阴道,下列正确的是
- A. 平时阴道前后壁互相贴近
 - B. 黏膜覆以单层柱状上皮
 - C. 阴道下端较上端宽
 - D. 阴道上端包绕子宫颈,下端开口于前庭的前部
 - E. 阴道有腺体分泌黏液
13. 我国妇女骨盆类型最常见为
- A. 女型
 - B. 男型
 - C. 偏斜骨盆
 - D. 类人猿型
 - E. 扁平型
14. 关于正常阴道壁错误的是
- A. 阴道黏膜含有腺体
 - B. 阴道壁富有静脉丛
 - C. 少女或绝经后阴道黏膜变薄,易受感染
 - D. 阴道黏膜受性激素影响有周期性变化
 - E. 阴道黏膜由复层鳞状上皮细胞覆盖
15. 下述错误的是
- A. 子宫体内膜为受卵巢周期影响的腺上皮
 - B. 子宫峡部内膜与宫颈管内膜相同
 - C. 宫颈阴道部为鳞状上皮
 - D. 输卵管内膜为单层高柱状上皮,有纤毛
 - E. 宫颈管内膜为高柱状上皮,有许多腺体

16. 全子宫及单侧附件切除术时,切断哪对韧带最不易损伤输尿管
A. 主韧带 B. 子宫骶骨韧带 C. 子宫动脉
D. 卵巢固有韧带 E. 骨盆漏斗韧带
17. 足月顺产时发生的会阴Ⅱ度裂伤可损伤下列哪部分组织
A. 坐骨海绵体肌、会阴深横肌及耻尾肌 B. 肛门外括约肌、耻尾肌及浅横肌
C. 球海绵体肌、会阴深横肌及浅横肌 D. 坐尾肌
E. 耻尾肌
18. The uterine of adult has the shape and volume of
A. $8\text{cm} \times 6\text{cm} \times 4\text{cm}$, 10ml B. $7\text{cm} \times 5\text{cm} \times 3\text{cm}$, 10ml C. $7\text{cm} \times 5\text{cm} \times 3\text{cm}$, 5ml
D. $5\text{cm} \times 4\text{cm} \times 2\text{cm}$, 5ml E. $5\text{cm} \times 3\text{cm} \times 2\text{cm}$, 2ml
19. Which represents the inferior boundary of the pelvis
A. the perineum B. the urogenital diaphragm C. the vulva
D. the clitoris E. the vagina
20. There are four paired sets of ligaments are attached to the uterus excluded
A. the sacroiliac ligaments B. the round ligaments C. the broad ligament
D. the cardinal ligaments E. the uterosacral ligaments
21. Which includes the mons veneris, labia majora, labia minora, clitoris, vulvovaginal glands, fourchette, and perineum.
A. the perineum B. the urogenital diaphragm C. the vulva
D. the clitoris E. the vagina

【A2 型题】

1. 女性, 24 岁, 于高处取物时不慎摔下, 呈骑跨式伤及外阴部。出现外阴血肿最易发生的部位在
A. 阴阜部 B. 小阴唇 C. 阴蒂部 D. 会阴部 E. 大阴唇
2. 女性, 38 岁, 因外阴部发现囊肿 3 天前来就诊, 经检查后发现囊肿位于大阴唇后部、前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内。病变最可能为
A. 外阴恶性肿瘤 B. 外阴良性肿瘤 C. 外阴肿瘤
D. 前庭大腺囊肿 E. 外阴上皮肉瘤样病变

【A3/A4 型题】

(1~3 题共用题干)

女性, 45 岁, 因多发性子宫肌瘤行全子宫切除+附件切除术。

1. 下述哪一项操作不易损伤输尿管
A. 切断漏斗韧带 B. 切断主韧带 C. 切断圆韧带
D. 切断骶韧带 E. 切断阔韧带
2. 如果行全子宫切除加左侧附件切除术时应切断哪些韧带
A. 双侧圆韧带、双侧阔韧带、双侧主韧带、左卵巢固有韧带
B. 双侧圆韧带、双侧阔韧带、左侧卵巢固有韧带
C. 双侧圆韧带、双侧阔韧带、双侧主韧带、双侧宫骶韧带、左侧卵巢悬韧带、右侧卵巢

固有韧带

- D. 双侧圆韧带、双侧阔韧带、双侧宫骶韧带
E. 双侧圆韧带、双侧阔韧带、左侧卵巢悬韧带、右侧卵巢固有韧带
3. 切除从宫颈两侧延伸到盆侧壁并固定子宫的韧带是
- A. 圆韧带 B. 主韧带 C. 宫骶韧带
D. 骨盆漏斗韧带 E. 阔韧带

(4~6 题共用题干)

某健康妇女,进行体格检查,其骨盆形态各径线均正常。

4. 骨盆入口平面前后径平均值为
- A. 11cm B. 12cm C. 13cm D. 14cm E. 15cm
5. 中骨盆平面前后径平均值为
- A. 11cm B. 11.5cm C. 12cm D. 12.5cm E. 13cm
6. 中骨盆横径平均为
- A. 9 cm B. 9.5cm C. 10cm D. 10.5cm E. 11cm

【B 型题】

(1~2 题共用备选答案)

- A. 子宫动脉 B. 卵巢动脉 C. 阴部内动脉 D. 阴道动脉 E. 肾动脉

1. 自髂内动脉前干分出的是
2. 自腹主动脉分出的是

(3~4 题共用备选答案)

- A. 类人猿型 B. 扁平型 C. 均小骨盆 D. 女型 E. 男型

3. 骨盆入口略呈三角形,两侧壁内聚,坐骨棘突出,耻骨弓较窄,骶坐切迹窄呈高弓形,骶骨较直而前倾,出口后矢状径较短为
4. 骨盆入口呈扁椭圆形,前后径短而横径长。耻骨弓宽,骶骨失去正常弯度,变直后翘或呈深弧形,故骶骨短而骨盆浅。此类骨盆为

(5~6 题共用备选答案)

- A. 坐骨海绵体肌 B. 球海绵体肌 C. 会阴线横肌
D. 肛提肌 E. 肛门外括约肌

5. 从两侧坐骨结节内侧面中线会合于中心腱的肌肉是
6. 位于阴道两侧,覆盖前庭球及前庭大腺,向后与肛门外括约肌互相交叉而混合的肌为

(7~8 题共用备选答案)

- A. 大阴唇 B. 小阴唇 C. 阴阜
D. 阴蒂 E. 前庭大腺

7. 当外阴部发生炎症时,最易形成囊肿的部位是
8. 当外阴部受到损伤时,最易形成血肿的部位是

(9~11 题共用备选答案)

- A. 转化区上皮 B. 柱状上皮 C. 复层鳞状上皮
D. 成熟化生鳞状上皮 E. 鳞状上皮

9. 宫颈癌好发部位为
10. 宫颈癌的癌前病变哪种上皮对致癌物的刺激相对不敏感
11. 宫颈阴道部为何种上皮覆盖

【X型题】

1. 关于子宫韧带的叙述,正确者为
 - A. 子宫有4对主要韧带
 - B. 圆韧带维持正常子宫的前倾位置
 - C. 阔韧带限制子宫侧斜
 - D. 主韧带固定宫颈位置
 - E. 宫骶韧带直接使子宫呈前倾位置
2. 关于女性生殖器黏膜上皮正确的是
 - A. 子宫颈管黏膜为单层高柱状上皮
 - B. 阴道黏膜上皮为复层鳞状上皮
 - C. 子宫颈阴道部黏膜为复层鳞状上皮
 - D. 输卵管黏膜为复层高柱状上皮
 - E. 子宫腔内膜为低柱状上皮
3. 胎先露部下降程度的重要标志为
 - A. 坐骨切迹
 - B. 耻骨弓
 - C. 坐骨棘水平
 - D. 胎先露的最低点
 - E. 耻骨联合
4. 肛提肌由哪些部分组成
 - A. 耻尾肌
 - B. 坐骨海绵体肌
 - C. 球海绵体肌
 - D. 坐尾肌
 - E. 髂尾肌
5. 育龄期女性和绝经后女性的内生殖器比较,以下正确的是
 - A. 卵巢表面均是凹凸不平的
 - B. 绝经后输卵管会变细变短
 - C. 子宫体与子宫颈的比例,前者为2:1,后者为1:1。
 - D. 绝经后卵巢萎缩变小
 - E. 年轻女性的子宫位置较高
6. 下列哪些动脉为阴部内动脉的分支
 - A. 阴蒂动脉
 - B. 阴唇动脉
 - C. 痔下动脉
 - D. 阴道动脉
 - E. 会阴动脉

【填空题】

1. 交感神经纤维自腹主动脉前神经丛分出,进入盆腔分为两部分:①_____,分布于卵巢和输卵管;②_____,大部分在宫颈旁形成骨盆神经丛,分布于宫体、宫颈、膀胱上部等。
2. 子宫共有_____,_____和_____4对韧带。
3. 骨盆各部之间的韧带中有两对重要的韧带,一对是骶、尾骨与坐骨结节之间的_____,另一对是骶、尾骨与_____之间的_____。
4. 子宫体与子宫颈的比例,在婴儿期为_____,成年妇女为_____。

【判断题】

1. 卵巢表面被覆腹膜。
2. 阴道前庭包括前庭球、前庭大腺、尿道外口、阴道口、处女膜。

3. 宫体与宫颈之间形成最狭窄部分称子宫峡部。
4. 子宫肌层分 3 层;外层纵行,内层环行,中层交叉排列。
5. 根据骨盆形状可以分为 4 种类型。

【名词解释】

1. perineum
2. histological internal os
3. isthmus uteri
4. 盆膈(pelvic diaphragm)
5. 前庭大腺(major vestibular glands)

【简答题】

1. 骨盆底有哪三层组织?
2. 何谓子宫内膜功能层?
3. 详述子宫 4 对韧带功能。
4. 简述发育成熟卵巢的解剖组织学结构。

第二章

女性生殖系统生理

【A1 型题】

1. 青春期女性出现以下哪一项是错误的
 - A. GnRH 呈脉冲式释放
 - B. 青春期的发动时间主要取决于遗传因素
 - C. 卵巢增大, 皮质内有不同发育阶段的卵泡
 - D. 宫体与宫颈比例为 1 : 2
 - E. 输卵管变粗, 弯曲度减小, 黏膜出现许多皱襞与纤毛
2. 哪一项因素与阴道自净作用无关
 - A. 宫颈黏液
 - B. 雌激素
 - C. 阴道内的乳杆菌
 - D. 阴道黏膜上皮糖原含量
 - E. 阴道 pH
3. 关于卵巢的周期性变化, 下列哪一项是错误的
 - A. 青春期, 始基卵泡开始发育
 - B. 每月通常只有一个卵泡达成熟
 - C. 成熟卵泡直径可达 1.0~2.0cm
 - D. 排卵后成为闭锁卵泡
 - E. 排卵后卵泡内膜细胞形成卵泡膜黄体细胞
4. 卵巢分泌的激素, 下列哪一项是错误的
 - A. 雄激素
 - B. 孕激素
 - C. 雌激素
 - D. 甲状腺素
 - E. 卵巢分泌的激素均为甾体激素
5. 关于卵巢的周期性变化排卵的时间, 下列哪一项是正确的
 - A. 排卵一般发生在月经周期的第 14 日
 - B. 排卵以后的卵泡称闭锁卵泡
 - C. 月经来潮时子宫内膜自基底层剥脱
 - D. 月经来潮时妇女的基础体温可升高 0.5~1℃
 - E. 多发生在下次月经来潮前 14 日左右
6. 关于性腺轴, 下列哪一项是错误的
 - A. 性腺轴不受大脑高级中枢调控
 - B. 下丘脑分泌促性腺激素释放激素
 - C. 腺垂体分泌 FSH 和 LH
 - D. 大量孕激素对下丘脑有负反馈作用
 - E. 大量雌激素对下丘脑既有正反馈作用又有负反馈作用
7. 关于性激素合成的表述, 下列哪一项不正确
 - A. 孕激素是雌激素的前身

- B. 甾体激素的原料是胆固醇
C. 卵巢合成并分泌的性激素有两种:雌激素和孕激素
D. 雄激素是雌激素的前身
E. 睾丸酮转化为雌二醇,雄烯二酮转化为雌酮
8. 正常月经女性,宫颈黏液出现典型羊齿叶状结晶,表明其处于什么阶段
A. 排卵后 B. 接近排卵 C. 已妊娠 D. 月经前 E. 月经期
9. 雌激素的周期性变化,下列哪一项是错误的
A. 在卵泡开始发育时,只分泌少量雌激素
B. 在月经第7日,卵泡分泌雌激素量迅速增加
C. 排卵后分泌达最高水平
D. 在排卵后7~8日黄体成熟时,形成第二高峰
E. 在月经前达最低水平
10. 下列哪一项不是孕激素的生理作用
A. 通过中枢神经有升温作用 B. 使宫口闭合,黏液分泌减少
C. 抑制子宫收缩 D. 促进水钠潴留
E. 促进乳腺腺泡发育
11. Which of the following is the basic reproductive unit in women
A. oogonium B. primary oocyte C. primordial follicle
D. preantral follicle E. primary follicle
12. What is the average days of menstrual cycle
A. 23~30 days B. 28 days C. 26~28 days
D. 30 days E. 28~35 days
13. What is the time of late proliferative period in the menstrual cycle
A. the 5th~8th day B. the 8th~10th day C. the 11th~14th day
D. the 15th~20th day E. the 21st~22nd day

【A2 型题】

1. 女性,28岁,月经周期为28天,基础体温双相。月经周期第17天的子宫内膜应属于
A. 增殖早期 B. 增殖晚期 C. 分泌早期 D. 分泌晚期 E. 排卵期
2. 女性,28岁,月经周期为28天,基础体温双相。下列哪一项不是正常月经的临床表现
A. 月经期疼痛并影响日常生活 B. 经血量不多于80ml
C. 经血不凝固 D. 轻微胃部不适
E. 轻微腰酸
3. 女孩,16岁,周期无规律性,2~3个月1次,经期持续时间7~14日,经量多,伴有贫血貌。病变最可能是
A. 子宫收缩乏力 B. 无排卵性功能失调性子宫出血
C. 子宫内膜息肉 D. 黄体萎缩过程延长
E. 黄体功能不足
4. 女性,30岁,停经70天突然阴道流血,持续了10天。检查:子宫正常大小,宫颈黏液

见典型羊齿叶状结晶。应考虑病变为

- A. 子宫收缩乏力
- B. 无排卵性功能失调性子宫出血
- C. 子宫内膜息肉
- D. 黄体萎缩过程延长
- E. 黄体功能不足

5. 女性,29岁,基础体温双相。体温上升前2天的宫颈黏液特征应为

- A. 量少、黏稠
- B. 量少、稀薄
- C. 量多、黏稠
- D. 量多、稀薄
- E. 量极少,不易取出

6. 女性,25岁,月经周期短,时而仅为20天。诊断性刮宫病理组织学检查报告提示:子宫内膜腺上皮细胞的核下开始出现含糖原小泡。此子宫内膜腺上皮细胞变化相当于月经周期的

- A. 增殖期早期
- B. 分泌期早期
- C. 增殖期中期
- D. 分泌期中期
- E. 增殖期晚期

7. 女性,48岁,时有短暂的阵发性胸部皮肤潮红。检查:阴道黏膜皱襞消失。下列哪一项是此女性不会有的变化

- A. 最早变化是卵巢功能衰退
- B. 下丘脑和垂体性激素分泌功能退化
- C. 卵巢逐渐停止排卵,雌激素分泌减少
- D. 促性腺激素分泌增多
- E. 促性腺激素分泌减少

8. 女性,38岁,停经40天,尿妊娠试验阴性。经孕激素治疗后月经来潮。此现象提示

- A. 子宫内膜呈萎缩型
- B. 子宫内膜有结核病灶
- C. 体内缺乏雌激素
- D. 子宫内膜对雌激素不起反应
- E. 子宫内膜已受雌激素影响

9. 女性,16岁,周期无规律性,2~3个月1次,经期持续时间7~14日,经量多,伴有贫血貌。该女性经前1日的子宫内膜最可能为

- A. 增殖期晚期变化
- B. 分泌期早期变化
- C. 增生症变化
- D. 分泌期中期变化
- E. 萎缩性变化

10. 女性,23岁,周期无规律性,2~3个月1次,经期持续时间7~14日,经前1日的宫颈黏液涂片见羊齿状结晶。与之有关的激素是

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. 催乳激素
- E. 甲状腺素

11. 女性,29岁,基础体温双相,高温持续13日。关于此女性血孕激素的分泌量变化,下列哪一项是错误的

- A. 排卵后孕激素分泌量减少
- B. 排卵后分泌量迅速增加
- C. 排卵后的6~8日分泌量达最高峰
- D. 月经前4日逐渐下降
- E. 月经来潮时回复到排卵前水平

12. 女性,30岁,结婚4年不孕(夫妇同居,有正常性生活)。检查,子宫及附件均正常。最有助于了解有无排卵的适宜检查为

- A. 女性激素测定
- B. B型超声监测卵泡发育及排卵
- C. 基础体温测定
- D. 宫颈黏液检查
- E. 阴道涂片脱落细胞学检查

13. 女性,20岁,月经周期为32天、经期5天伴痛经。其排卵大概在月经周期的

- A. 第14天
- B. 第15天
- C. 第16天
- D. 第17天
- E. 第18天

【A3/A4 型题】

(1~2 题共用题干)

女性,23岁,婚后两年未孕,月经规则 4~5/28~30。妇科检查:外阴、阴道无异常,宫颈光,子宫前位、正常大小,两侧附件无异常。拟行排卵监测。

1. 排卵后机体出现的变化是

- A. 基础体温升高 0.3~0.5℃ B. 宫颈黏液变稀薄 C. 孕激素水平下降
D. 常常伴发乳房胀痛 E. 体重增加

2. 监测排卵的最简易方式

- A. BBT B. 阴道脱落细胞检查 C. 子宫内膜活检
D. B 型超声检查 E. 宫颈黏液检查

(3~4 题共用题干)

25岁妇女,月经规律,周期 23~25 天,经期 3~4 天,曾有 2 次早期流产史,基础体温双相。拟于月经来潮前 2 日诊刮。

3. 子宫内膜最可能的变化是

- A. 增殖期晚期变化 B. 分泌期早期变化 C. 增生症变化
D. 分泌期变化 E. 萎缩性变化

4. 引起基础体温双相的激素为

- A. 雌激素 B. 孕激素 C. 雄激素
D. FSH E. LH

(5~7 题共用题干)

女性,13岁,初潮后月经周期紊乱 3 个月余,经期长短不一。肛诊:子宫正常大小,双附件区正常。

5. 病变最可能是

- A. 青春期正常月经 B. 青春期无排卵性功血 C. 黄体功能不足
D. 子宫内膜不规则脱落 E. 凝血功能异常

6. 首选的辅助检查是

- A. 诊断性刮宫 B. 基础体温测定 C. B 型超声检查
D. 血 E₂测定 E. 血 PRL 测定

7. 其月经前子宫内膜的病理变化可能是

- A. 增殖期内膜 B. 混合型内膜 C. 早期分泌期内膜
D. 晚期分泌期内膜 E. 萎缩型子宫内膜

(8~9 题共用题干)

女性,50岁,孕 5 产 5。绝经 3 年后阴道少许血性分泌物 1 个月。妇科检查:阴道黏膜充血、有散在性小出血点,宫颈充血,子宫后屈、稍小,双侧附件未见异常。

8. 该患者绝经后阴道流血最可能的原因是

- A. 子宫颈炎 B. 子宫颈癌 C. 子宫内膜癌
D. 萎缩性阴道炎 E. 子宫内膜炎

9. 病变主要由以下哪一种激素减少所致

- A. 雌激素 B. 孕激素 C. 雄激素 D. FSH E. LH