



普通高等教育“十五”国家级规划教材

(高职高专教育)

高等数学学习辅导与习题选解

第二版

同济大学 天津大学 编

高等教育出版社



<http://www.hep.com.cn>
<http://hv.hep.com.cn>

普通高等教育“十五”国家级规划教材
(高职高专教育)

高等数学学习辅导 与习题选解

第二版

同济大学 天津大学 编

高等教育出版社

内容提要

本书是教育部“十五规划”高职高专教材《高等数学》(第二版)的辅助教材。本书编写体例与主教材一致。各章均由内容总结、例题解析、习题选解、总复习题解答四部分组成。本书的内容总结简明扼要,例题解析翔实精准,习题选解面宽清晰,总复习题解答具体全面。通过使用本书,可以使学生理解高等数学的基本概念,掌握高等数学的基本知识,增强应用能力,提高数学素养。

本书可作为高等职业学校、高等专科学校、成人高等学校和本科院校举办的二级职业技术学院相关专业的教学用书,也可供五年制高等专科学校、中等职业学校的教师和学生及其他有关人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

高等数学学习辅导与习题选解/同济大学,天津大学
编.—2版.—北京:高等教育出版社,2005.4

ISBN 7-04-016941-X

I. 高... II. ①同...②天... III. 高等数学-高等
学校-教学参考资料 IV. O13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 019868 号

策划编辑 罗德春 责任编辑 张晓晶 封面设计 杨立新 责任绘图 杜晓丹
版式设计 胡志萍 责任校对 尤静 责任印制 孔源

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	保定市印刷厂		http://www.landaco.com.cn
开 本	787×1092 1/16	版 次	2003年5月第1版 2005年5月第2版
印 张	23.75	印 次	2005年12月第3次印刷
字 数	580 000	定 价	24.90元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 16941-00

出版说明

为加强高职高专教育的教材建设工作,2000年教育部高等教育司颁发了《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》(教高司[2000]19号),提出了“力争经过5年的努力,编写、出版500本左右高职高专教育规划教材”的目标,并将高职高专教育规划教材的建设工作分为两步实施:先用2至3年时间,在继承原有教材建设成果的基础上,充分汲取近年来高职高专院校在探索培养高等技术应用性专门人才和教材建设方面取得的成功经验,解决好高职高专教育教材的有无问题;然后,再用2至3年的时间,在实施《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上,推出一批特色鲜明的高质量的高职高专教育教材。根据这一精神,有关院校和出版社从2000年秋季开始,积极组织编写和出版了一批“教育部高职高专规划教材”。这些高职高专规划教材是依据1999年教育部组织制定的《高职高专教育基础课程教学基本要求》(草案)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(草案)编写的,随着这些教材的陆续出版,基本上解决了高职高专教材的有无问题,完成了教育部高职高专规划教材建设工作的第一步。

2002年教育部确定了普通高等教育“十五”国家级教材规划选题,将高职高专教育规划教材纳入其中。“十五”国家级规划教材的建设将以“实施精品战略,抓好重点规划”为指导方针,重点抓好公共基础课、专业基础课和专业主干课教材的建设,特别要注意选择一部分原来基础较好的优秀教材进行修订使其逐步形成精品教材;同时还要扩大教材品种,实现教材系列配套,并处理好教材的统一性与多样化、基本教材与辅助教材、文字教材与软件教材的关系,在此基础上形成特色鲜明、一纲多本、优化配套的高职高专教育教材体系。

普通高等教育“十五”国家级规划教材(高职高专教育)适用于高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院、继续教育学院和民办高校使用。

教育部高等教育司
2002年11月30日

第二版前言

本书是与同济大学、天津大学、浙江大学、重庆大学四校所编《高等数学》(第二版)配套的学习辅导书,主要面向使用该教材的学生,也可供使用该教材的教师作为教学参考书。

本书第一版是同济大学、天津大学等编《高等数学训练教程》。为了突出学习辅导的功能和习题选解的特色,此次修订改名为《高等数学学习辅导与习题选解》。

近年来高职高专教育迅猛发展,为适应这种变化形势,满足广大工科、经济类、管理类等专业高职高专学生学习高等数学的需要,我们对这本辅导书进行了修订,期望能对提高高等数学的教学质量,对学生掌握高等数学的基本要求起到辅助作用。

本书按《高等数学》(第二版)的章节顺序编排,以便与教学需求同步。书中内容叙述、解题方式、数学符号等与主教材保持一致。考虑到读者使用方便,编写时注意使本书具有相对的独立性。本书的修订原则是贴近学生,贴近教材,贴近实际,突出重点,精简内容,减少篇幅,必需够用,体现特色。本书与修订前相比,难度有所降低。读者中学有余力,愿意加大难度和深度者,可以继续参考《高等数学训练教程》,定能加强实训,进一步提高数学水平。

本书各章由内容总结、例题解析、习题选解和总复习题解答四部分组成。

内容总结:根据目前高职高专学生的现状,在提纲挈领地归纳本章的主要内容的基础上,整理并列岀该章的基本概念、定理、公式和重要结论,必要时还指出了学习中应注意的具体问题,为学生掌握本课程的内容提供方便,利于学生复习时回顾或查阅。

例题解析:按《高等数学》(第二版)的要求做了精简,删去或修改了部分难度较大的例题;保留了针对高职高专这一层面学生容易产生的疑惑而由浅入深地进行的解释;同时也保留了例题求解过程详细,给出解题思路和一题多解的风格。考虑到便于多层次教学需要,适当选择了部分“专升本”入学试题加以解析。

习题选解:这是本书重要组成部分之一。在新版教材的各节习题中选出30%左右具有典型性和一定难度的习题给予详解,有时还提供了多种解法,供读者参考。我们建议选解不能作为学生解题的依据,学生可在自己独立练习之后,检查对照。

总复习题解答:详细地对各章总复习题进行了解答。填空题给出解题过程后,写出所填结果;选择题说明选择的理由和舍弃的原因,了解选择过程,加深对相关概念、定理、公式的理解;其他计算题、证明题、应用题的详解对全章内容是全面的复习和深化,可进一步提高学生的数学素养。

参加本书编写的有同济大学李生文(第一、二、三章),韩仲豪(第五、六章),郭景德(第七、八、九章),天津大学齐植兰(第四、十、十一章)。全书由李生文教授总体策划,修改统稿并做了技术处理。

本书的编写和出版得到编者所在学校有关领导的大力支持和帮助,得到上海建桥学院领导和数学教师的支持。同济大学应用数学系章亮教授仔细地审阅了全稿,提出了许多宝贵意见。在此我们一并表示衷心感谢。

由于编者经验不足,水平有限,书中问题在所难免,敬请读者和同行批评指正。

编者

2005年1月

第一版前言

本书是与同济大学、天津大学、浙江大学、重庆大学所编的教育部高职高专规划教材《高等数学》配套的学习辅导用书,主要面向使用该教材的学生。由于编写的独立性风格,本书也可作为使用其他高等数学教材的高职高专学生自学或“专升本”学员复习的参考用书,同时,本书也适当兼顾了使用同济大学等编的《高等数学》主教材的教师教学参考的需要。

本书章序及其内容叙述、解题方法、记号等与主教材一致。

全书各章均由内容总结、例题解析、习题选解、自我检测题与简解四部分组成。书末附录中编入四个阶段的综合检测题与简解和第一、第二学期期终模拟考试卷与答案各两套。

书中较多的检测训练有利于读者理解基本概念,熟练基本运算,掌握基本内容,增强应用能力,为全面提高学生的数学素养,继续深造打下坚实基础。

内容总结:简要介绍本章的主要内容,整理并列出了该章的基本概念、定理、公式和重要结论,必要时列表说明或给出学习有关知识的注意事项,为全面掌握课程内容提供方便,便于读者复习时查阅。

例题解析:围绕本章的重点、难点,在主教材已有的例题和习题之外再增加一些具有代表性的例题作为补充,进一步扩大对本章知识、概念、运算、应用等诸多方面的覆盖,以便强化基本训练。对于某些例题不仅给出求解的详细过程或多种解法,还给出了解题思路、解法指导或错解释疑等,并针对高职高专这一层面学生容易产生的疑惑由浅入深地进行解释,难度比主教材中部分较难例题有所降低,力争当好不见面的辅导教师。但考虑到便于层次教学使用,也适当选择了一些历届“专升本”入学考试试题。

习题选解:在主教材中选出30%以上的较有典型性或具有一定难度的习题给出详解,供读者解题时参考。主教材各章的总复习题A,B两类一一详尽解答。在某些题解中,编者还通过加注的方式说明解证这类习题的一般方法及易犯的一些错误,以便引起读者的重视。习题选解中的习题和题号与主教材的习题完全一致,读者可以在独立练习的基础上方便地对照、参考或校对。

需特别申明的是主教材各章的总复习题B的难度较大,超出高职高专学生的高等数学基本要求。本书虽然对总复习题B给出详解,我们仍建议高职高专学生可以不看不练这部分习题,仅供某些更高要求的读者参考。

近几年来,由于我国高等教育迅猛发展,对高职高专学生的高等数学的基本要求也在不断调整、更新,读者使用本书时也要以“与时俱进、因势而变、改革创新、因材施教、有利教学”的态度合理选择,以便达到预期的教学效果。

自我检测题,阶段综合检测题及期终模拟考试卷等为读者精选了难易基本适中,与各

章或各个阶段、各个学期所学基本概念、基本运算、基本内容密切相关的题目。书中还逐一给出简解。独立完成这些题目,可以达到举一反三,巩固提高的功效。如果读者在复习的基础上,在规定的时间内独立完成各次检测题,完全可以达到《高职高专教育高等数学课程教学基本要求》。只要再复习总结,强化练习,也完全可以达到“专升本”对高等数学的要求。

本书是“内容总结简明扼要,例题解析翔实精准,习题选解面宽清晰,自我检测难易适中”,体现了“以应用为目的,以必需够用为度”编写高职高专教材的原则。

参加本书编写的有:同济大学李生文(第一、二、三章),韩仲豪(第五、六章),郭景德(第七、八、九章),天津大学齐植兰(第四、十、十一章)。由李生文教授负责总体策划、修改统稿及技术处理等。

本书的编写和出版得到所在学校有关领导的大力支持和帮助,同济大学应用数学系郭镜明教授审阅了初稿,提出了许多宝贵意见。在此我们一并表示衷心感谢。

由于编者水平所限,书中不足和考虑不周之处肯定不少,错误也在所难免,我们期待着专家、同行和读者的批评指正,使本书在教学实践中不断完善。

编 者

2002年12月

目 录

第一章 函数及其图形	1	三、习题选解	184
一、内容总结	1	四、总复习题六解答	194
二、例题解析	4	第七章 向量代数与空间解析几何	211
三、习题选解	12	一、内容总结	211
四、总复习题一解答	21	二、例题解析	216
第二章 极限与连续	27	三、习题选解	223
一、内容总结	27	四、总复习题七解答	232
二、例题解析	33	第八章 多元函数微分学	241
三、习题选解	47	一、内容总结	241
四、总复习题二解答	59	二、例题解析	247
第三章 导数与微分	66	三、习题选解	254
一、内容总结	66	四、总复习题八解答	266
二、例题解析	71	第九章 多元函数积分学	276
三、习题选解	82	一、内容总结	276
四、总复习题三解答	99	二、例题解析	280
第四章 中值定理与导数的应用	106	三、习题选解	286
一、内容总结	106	四、总复习题九解答	292
二、例题解析	111	第十章 无穷级数	300
三、习题选解	120	一、内容总结	300
四、总复习题四解答	131	二、例题解析	305
第五章 不定积分	141	三、习题选解	314
一、内容总结	141	四、总复习题十解答	324
二、例题解析	145	第十一章 微分方程	338
三、习题选解	149	一、内容总结	338
四、总复习题五解答	156	二、例题解析	341
第六章 定积分及其应用	171	三、习题选解	351
一、内容总结	171	四、总复习题十一解答	362
二、例题解析	177		

第一章 函数及其图形

函数是客观世界中变量与变量之间相互依赖关系的反映,是高等数学的主要研究对象,也是高等数学最重要的基本概念之一.

学习本章,应该重点理解函数概念及其简单性质;熟悉基本初等函数的表达式、定义域、值域、几种特性及其图形;理解基本初等函数和初等函数的概念;理解复合函数的概念,会正确分析复合函数的复合过程;能求简单函数的反函数;具备对简单实际问题建立相应的函数关系式的能力.

一、内容总结

(一) 集合

1. 集合

集合是指具有某种共同属性的事物的总体.组成这种集合的事物或个体称为该集合的元素.通常用大写拉丁字母 A, B, C, \dots 表示集合,用小写拉丁字母 a, b, c, \dots 表示集合的元素.如果 a 是集合 A 的元素,就记为 $a \in A$;如果 b 不是集合 A 的元素,就记为 $b \notin A$ (或 $b \in \bar{A}$).对于给定的集合 A ,元素 $x \in A$ 或 $x \notin A$,二者必择其一.

在研究和处理问题时,把所考虑事物的全体称为全集(相对全集),并用 U 表示;不含任何元素的集合称为空集,记为 \emptyset .

2. 两个集合间的关系

(1) 如果集合 A 的每个元素都是集合 B 的元素,就称 A 是 B 的子集,记为 $A \subseteq B$ 或者记为 $B \supseteq A$.

(2) 如果集合 A 与集合 B 含有相同的元素,就称 A 与 B 相等,记为 $A=B$ (或 $B=A$),此时 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$.

3. 集合的主要运算

(1) 集合的并 设 A 和 B 是两个集合,所有属于 A 或者属于 B 的元素组成的集合,称为 A 与 B 的并集(简称并),记作 $A \cup B$ (或 $B \cup A$).

(2) 集合的交 设 A 和 B 是两个集合,所有既属于 A 又属于 B 的元素组成的集合,称为 A 与 B 的交集(简称交),记作 $A \cap B$ (或 $B \cap A$).

(3) 集合的差 设 A 和 B 是两个集合,所有属于 A 而不属于 B 的元素组成的集合,称为 A 与 B 的差集(简称差),记作 $A \setminus B$ (即 $A \setminus B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$).特别地,设 A 是一个集合, U 是包含 A 的全集,把 $U \setminus A$ 称为 A 的余集,记作 $\complement_U A$.

(4) 集合运算律

① 交换律 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$.

② 结合律 $A \cup (B \cap D) = (A \cup B) \cap D, A \cap (B \cup D) = (A \cap B) \cup D$.

为奇函数.

(4) 周期性 设函数 $y=f(x)$, 如果存在不为零的实数 T , 对于每一个 $x \in D_f$, 有 $(x \pm T) \in D_f$, 且总有 $f(x+T)=f(x)$, 则称 $f(x)$ 是周期函数. 通常所说周期函数的周期是指函数的最小正周期.

3. 反函数

设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D_f , 值域为 R_f , 如果对任意一个 $y \in R_f$, D_f 内只有一个数 x 与 y 对应, 此 x 适合 $f(x)=y$, 这时把 y 看作自变量, x 视为因变量, 就得一个新的函数, 称为函数 $y=f(x)$ 的反函数, 记为 $x=f^{-1}(y)$ (相对于反函数, 把函数 $y=f(x)$ 称为直接函数). 习惯上, 函数 $y=f(x)$ 的反函数写作 $y=f^{-1}(x)$. 反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图形与直接函数 $y=f(x)$ 的图形关于直线 $y=x$ 是对称的.

4. 复合函数

设函数 $y=f(u)$ 的定义域为 D_f , 函数 $u=g(x)$ 的定义域为 D_g , 如果 $u=g(x)$ 的值域 $R_g \subseteq D_f$, 那么称 $y=(f \circ g)(x)=f[g(x)]$ 为定义在 D_g 上的由函数 $y=f(u)$ 经 $u=g(x)$ 复合而成的复合函数, u 称为中间变量. $y=f[g(x)]$ 的定义域与值域, 分别记作 $D_{f \circ g}$ 与 $R_{f \circ g}$.

(三) 初等函数

1. 基本初等函数

(1) 常数 $y=C$ (C 为常数), 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 偶函数.

(2) 幂函数 $y=x^\mu$ (μ 为常实数), 定义域随 μ 而异.

(3) 指数函数 $y=a^x$ (a 为常数且 $a>0, a \neq 1$), 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 值域为 $(0, +\infty)$, 其图形都通过点 $(0, 1)$. 当 $a>1$ 时, 函数单调增加; 当 $0<a<1$ 时, 函数单调减少. 特别地, $y=e^x$ 是工程中常用的指数函数, 其中底数 $e=2.718281\dots$.

(4) 对数函数 $y=\log_a x$ (a 为常数且 $a>0, a \neq 1$), 定义域为 $(0, +\infty)$, 值域为 $(-\infty, +\infty)$, 图形总在 y 轴的右侧, 且通过点 $(1, 0)$. 当 $a>1$ 时, 函数单调增加; 当 $0<a<1$ 时, 函数单调减少. 特别地, $y=\log_e x$ 称为自然对数, 记作 $y=\ln x$.

★(5) 三角函数

函数名称	函数记号	定义域	值域	周期	奇偶性
正弦函数	$y=\sin x$	\mathbf{R}	$[-1, 1]$	2π	奇
余弦函数	$y=\cos x$	\mathbf{R}	$[-1, 1]$	2π	偶
正切函数	$y=\tan x$	$\mathbf{R} \setminus \left\{ \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \mid n \in \mathbf{Z} \right\}$	\mathbf{R}	π	奇
余切函数	$y=\cot x$	$\mathbf{R} \setminus \{ n\pi \mid n \in \mathbf{Z} \}$	\mathbf{R}	π	奇
正割函数	$y=\sec x$	$\mathbf{R} \setminus \left\{ \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \mid n \in \mathbf{Z} \right\}$	$\mathbf{R} \setminus (-1, 1)$	2π	偶
余割函数	$y=\csc x$	$\mathbf{R} \setminus \{ n\pi \mid n \in \mathbf{Z} \}$	$\mathbf{R} \setminus (-1, 1)$	2π	奇

★(6) 反三角函数

① 反正弦函数 $y = \arcsin x$, 定义域为 $[-1, 1]$, 值域为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 奇函数, 在 $[-1, 1]$ 上单调增加且有界.

② 反余弦函数 $y = \arccos x$, 定义域为 $[-1, 1]$, 值域为 $[0, \pi]$, 在 $[-1, 1]$ 上单调减少且有界.

③ 反正切函数 $y = \arctan x$, 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 值域为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 奇函数, 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调增加且有界.

④ 反余切函数 $y = \operatorname{arccot} x$, 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 值域为 $(0, \pi)$, 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调减少且有界.

2. 初等函数

由基本初等函数(包括常数)经过有限次的四则运算和复合运算并能用一个式子表示的函数, 称为初等函数.

(四) 分段函数

在自变量的不同取值范围内, 对应法则用不同式子来表示的函数, 通常称为分段函数.

(五) 充分条件、必要条件与充要条件

如果由 A 能推出 B , 用 $A \Rightarrow B$ 表示, 则 A 是 B 的充分条件, B 是 A 的必要条件.

如果 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$, 即 $A \Leftrightarrow B$, 则 A 与 B 互为充分必要条件.

二、例题解析

例 1 用区间表示下列不等式的变量 x 的变化范围:

$$(1) |x+2| \geq 5; \quad (2) \left| 5 - \frac{1}{x} \right| < 1;$$

$$(3) x < x^2 - 12 < 4x.$$

解 (1) 由不等式 $|x+2| \geq 5$ 去掉绝对值符号, 得

$$x+2 \geq 5 \text{ 或 } x+2 \leq -5,$$

于是

$$x \geq 3 \text{ 或 } x \leq -7,$$

因此不等式 $|x+2| \geq 5$ 所表示的区间为 $(-\infty, -7] \cup [3, +\infty)$.

(2) 不等式 $\left| 5 - \frac{1}{x} \right| < 1$ 化为

$$-1 < 5 - \frac{1}{x} < 1,$$

即

$$-6 < -\frac{1}{x} < -4.$$

不等式各项变号并改变不等号的方向, 得

$$\frac{1}{6} < x < \frac{1}{4} \quad (x \text{ 必为正数}),$$

所以不等式 $\left|5 - \frac{1}{x}\right| < 1$ 表示的区间是 $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{4}\right)$.

(3) 不等式 $x < x^2 - 12 < 4x$ 可化为不等式组

$$\begin{cases} x^2 - 4x - 12 < 0, \\ x^2 - x - 12 > 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x+2)(x-6) < 0, \\ (x+3)(x-4) > 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2 < x < 6, \\ x < -3 \text{ 或 } x > 4, \end{cases}$$

解得

即不等式所表示的区间为 $(4, 6)$.

例 2 求下列函数的定义域:

(1) $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x^2-4}$; (2) $g(x) = \ln(x^2-x-2) + \frac{x}{\sqrt{x+2}}$.

解 (1) 为使函数 $f(x)$ 有意义, 必须使分式中的分母 $x^2 - 4 \neq 0$, 同时分子的平方根下 $x+1 \geq 0$. 因此要使这个函数有意义, 应满足

$$\begin{cases} x^2 - 4 \neq 0, \\ x + 1 \geq 0, \end{cases}$$

即 $x \geq -1$ 且 $x \neq 2$,

即

故函数 $f(x)$ 的定义域为

$$D_f = [-1, 2) \cup (2, +\infty).$$

(2) 函数 $g(x)$ 的表达式中, 含有对数函数和无理分式函数, 要使 $g(x)$ 有意义, x 必须满足不等式组

$$\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0, \\ x + 2 > 0. \end{cases}$$

先解不等式

即

$$(x+1)(x-2) > 0.$$

不等式的左边是一个多项式, 可用图 1-1 的方法确定它的符号.

于是, 不等式的解为

$$x < -1 \text{ 或 } x > 2.$$

则不等式组化为

$$\begin{cases} x < -1 \text{ 或 } x > 2, \\ x + 2 > 0, \end{cases}$$

从而得函数 $g(x)$ 的定义域

$$D_g = (-2, -1) \cup (2, +\infty).$$

注意 在解本题时, 不能忘记分母 $x+2 \neq 0$, 也不要误认为对数函数 $\ln(x^2-x-2)$ 中 $x^2-x-2 \geq 0$, 否则就会得出错误的定义域.

如果函数是由实际问题得出, 其定义域要根据实际问题而定; 对于用算式给出的函数, 只需使算式有意义就可以. 关于求函数定义域问题, 应注意以下几点:




图 1-1

- ① 分母不能为零；
- ② 负数不能开偶次方；
- ③ 对数的真数是正数；
- ④ 反三角函数 $y = \arcsin x$ 与 $y = \arccos x$ 的定义域是 $[-1, 1]$.

例 3 设 $f(x)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 求函数 $\varphi(x) = f\left(x + \frac{1}{3}\right) + f\left(x - \frac{1}{3}\right)$ 的定义域.

解 $f\left(x + \frac{1}{3}\right)$ 是由 $f(u)$ 与 $u = x + \frac{1}{3}$ 复合而成. 依函数概念知, 函数由两个要素——对应法和定义域所确定, 与自变量所选用什么样的字母无关, 因此 $f(u)$ 与 $f(x)$ 表示的是同一个函数. 因为 $f(x)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 故 $f(u)$ 的定义域也是 $[0, 1]$, 将 $u = x + \frac{1}{3}$ 代入 $f(u)$ 后, 得

$$0 \leq x + \frac{1}{3} \leq 1,$$

于是 $f\left(x + \frac{1}{3}\right)$ 的定义域是

$$-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}.$$

类似地, 可得 $f\left(x - \frac{1}{3}\right)$ 的定义域是

$$\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{4}{3}.$$

解不等式组

$$\begin{cases} -\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}, \\ \frac{1}{3} \leq x \leq \frac{4}{3}. \end{cases}$$

最后求得 $f\left(x + \frac{1}{3}\right) + f\left(x - \frac{1}{3}\right)$ 的定义域

$$D_{\varphi} = \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right].$$

注意 常见的错误解法是:

因为 $0 \leq x \leq 1$, 所以 $\frac{1}{3} \leq x + \frac{1}{3} \leq \frac{4}{3}$, 得 $f\left(x + \frac{1}{3}\right)$ 的定义域 $\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{4}{3}$. 类似地又有 $-\frac{1}{3} \leq x - \frac{1}{3} \leq \frac{2}{3}$, 得到 $f\left(x - \frac{1}{3}\right)$ 的定义域 $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$. 因此 $f\left(x + \frac{1}{3}\right) + f\left(x - \frac{1}{3}\right)$ 的定义域为 $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$.

从表面上看答案似乎没有错误, 其实 $f\left(x + \frac{1}{3}\right)$ 与 $f\left(x - \frac{1}{3}\right)$ 的定义域都是错误的. 犯错误的主要原因是 $f(u)$ 与 $f(x)$ 表示同一个函数的概念还没有理解.

例 4 求下列函数的值域:

(1) $f(x) = \ln(1-x)$ ($x \leq 0$); (2) $g(x) = \sqrt{x-x^2}$.

解 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, 0]$. 当 $x=0$ 时,

$$f(0) = \ln 1 = 0.$$

当 $x \rightarrow -\infty$ 时,

$$f(x) \rightarrow +\infty,$$

所以 $f(x)$ 的值域为

$$R_f = [0, +\infty).$$

(2) $g(x) = \sqrt{x-x^2}$ 要有意义, 必须有 $x-x^2 \geq 0$, 则其定义域为 $[0, 1]$. 记

$$\bar{y} = x-x^2 = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2.$$

显然当 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$ 时, 可取最大值, 即 $x = \frac{1}{2}$ 时, $g(x)$ 取最大值 $\frac{1}{2}$. 当 $x=0$ 或 $x=1$ 时, 可取最小值 0, 即 $g(x)$ 取最小值 0. 所以, $g(x)$ 的值域为

$$R_g = \left[0, \frac{1}{2}\right].$$

例 5 下列各对函数恒等吗? 为什么? 请指出它们在什么区间上是恒等的?

$$(1) f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}, g(x) = x+3;$$

$$(2) f(x) = \sqrt{x-1}\sqrt{x+1}, g(x) = \sqrt{x^2-1};$$

$$(3) f(x) = \arctan x, g(x) = \arctan \frac{1}{x}.$$

解 (1) 不恒等.

$f(x)$ 的定义域为 $D_f = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$, $g(x)$ 的定义域为 $D_g = (-\infty, +\infty)$. 由确定函数的两要素知, $f(x)$ 与 $g(x)$ 不恒等.

如果只考虑在区间 $(-\infty, 3)$ 或在区间 $(3, +\infty)$ 的情形, 即 $x-3 \neq 0$ 时,

$$f(x) = \frac{x^2-9}{x-3} = \frac{(x+3)(x-3)}{x-3} = x+3 = g(x),$$

故 $f(x) \equiv g(x)$ 的区间为 $(-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$.

(2) 不恒等.

$f(x) = \sqrt{x-1}\sqrt{x+1}$ 的定义域由不等式组

$$\begin{cases} x-1 \geq 0, \\ x+1 \geq 0 \end{cases}$$

确定, 即

$$D_f = [1, +\infty).$$

对于 $g(x)$, 要求 $x^2-1 \geq 0$, 即

$$D_g = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty).$$

两个函数的定义域不相同.

当 $x \in [1, +\infty)$ 时,

$$g(x) = \sqrt{x^2-1} = \sqrt{(x+1)(x-1)} = \sqrt{x+1}\sqrt{x-1} = f(x),$$

两个函数此时恒等.

(3) 不恒等.

两个函数的定义域不同, 对应法则也不同. $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $g(x)$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 且对应的值没有相同的情形.

注意 判断两个函数是否恒等应判断定义域和对应法则是否相同, 当且仅当定义域相同, 对

应法则也相同时,两个函数才恒等.

例6 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 3, \\ x^2-3, & x \geq 3. \end{cases}$$

求 $f(4) - f(1.5)$.

解 对于分段函数,其特点是在不同的区间上,函数有不同的表达式.当需要计算某点 x 的函数值时,首先要看清 x 属于定义域中哪一个区间,然后用相应的表达式求该点的 $f(x)$ 值.

因为 $x=4$ 在区间 $[3, +\infty)$ 内,所以由 $f(x)$ 的定义得

$$f(4) = 4^2 - 3 = 13.$$

因为 $x=1.5$ 在区间 $(-\infty, 3)$ 内,则由函数 $f(x)$ 的定义得

$$f(1.5) = 1.5 + 2 = 3.5.$$

于是

$$f(4) - f(1.5) = 13 - 3.5 = 9.5.$$

例7 将下列函数写成分段函数:

$$(1) f(x) = |x^2 - 2|; \quad (2) g(x) = x - [x] \quad (0 \leq x < 3).$$

解 (1) 分段函数在高等数学讨论函数的极限、连续、导数、积分等问题时有着广泛应用,读者务必学会将带有绝对值符号的函数化为分段函数.

当 $x \leq -\sqrt{2}$ 时, $(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}) \geq 0$, 由绝对值的定义,得

$$f(x) = (x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}).$$

当 $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$ 时, $(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}) < 0$, 同理可得

$$f(x) = -(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}) = (x+\sqrt{2})(\sqrt{2}-x).$$

当 $x \geq \sqrt{2}$ 时, $(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}) \geq 0$, 于是有

$$f(x) = (x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}).$$

综上所述,可得

$$f(x) = \begin{cases} (x+\sqrt{2})(\sqrt{2}-x), & -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \\ (x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}), & x \leq -\sqrt{2} \text{ 或 } x \geq \sqrt{2}. \end{cases}$$

(2) 函数 $g(x) = x - [x]$ 中的 $[x]$ 是主教材上给出的取整函数,即

$$[x] = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x < 2, \\ 2, & 2 \leq x < 3. \end{cases}$$

因此

$$g(x) = x - [x] = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ x-1, & 1 \leq x < 2, \\ x-2, & 2 \leq x < 3. \end{cases}$$

注意 分段函数是一个函数,它在不同区间上用不同的解析式表示,不可罗列出几个函数来表示这个分段函数.例如,第(1)小题不可分开写为:当 $x \leq -\sqrt{2}$ 或 $x \geq \sqrt{2}$ 时, $f(x) = (x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})$; 当 $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$ 时, $f(x) = (x+\sqrt{2})(\sqrt{2}-x)$, 且不加整理.应该类似上面解题