

全国卫生专业技术资格考试专家委员会 | 编写

2012

附赠
网络辅导卡

全国卫生专业技术资格考试指导

外科学

适用专业

[附赠考试大纲]

普通外科学 (中级)

骨外科学 (中级)

胸心外科学 (中级)

神经外科学 (中级)

泌尿外科学 (中级)

小儿外科学 (中级)

烧伤外科学 (中级)

整形外科学 (中级)



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

第二章



中医外科学教材编写组编

外科学

总主编

中医外科学

骨科肿瘤 (骨病)

心脏外科学

肾脏外科学

糖尿病外科学

心脑血管外科学

感染外科学

妇产科外科学

中医外科学

中医外科学

中医外科学教材

全国卫生专业技术资格考试专家委员会 编写

2012

全国卫生专业技术资格考试指导

外 科 学

适用专业

[附赠考试大纲]

普通外科学(中级) **泌尿外科学(中级)**

骨外科学(中级) **小儿外科学(中级)**

胸心外科学(中级) **烧伤外科学(中级)**

神经外科学(中级) **整形外科学(中级)**

图书在版编目 (CIP) 数据

外科学/全国卫生专业技术资格考试专家委员会编写.
—北京：人民卫生出版社，2011.12
(2012 全国卫生专业技术资格考试指导)
ISBN 978-7-117-14940-2

I. ①外… II. ①全… III. ①外科学-医药卫生人员-
资格考试-自学参考资料 IV. ①R6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 203112 号

门户网: www.pmph.com	出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com	护士、医师、药师、中医 师、卫生资格考试培训

版权所有，侵权必究！

本书本印次内封贴有防伪标。请注意识别。

外 科 学

编 写: 全国卫生专业技术资格考试专家委员会
出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)
地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮 编: 100021
E - mail: pmpmhp@pmpmhp.com
购书热线: 010-67605754 010-65264830
 010-59787586 010-59787592
印 刷: 北京人卫印刷厂
经 销: 新华书店
开 本: 787×1092 1/16 印张: 41
字 数: 1050 千字
版 次: 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号: ISBN 978-7-117-14940-2/R · 14941
定 价: 100.00 元
打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmpmhp.com
(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

出版说明

为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神,自2001年全国卫生专业初、中级技术资格以考代评工作正式实施。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力,作为单位聘任相应技术职务的必要依据。

依据《关于2011年度卫生专业技术资格考试工作有关问题的通知》(人社厅发[2010]110号)文件精神,自2011年度起卫生专业技术资格考试新增神经电生理(脑电图)技术(中级)和神经电生理(脑电图)技术(初级师)两个专业,卫生专业初中级技术资格考试专业增加至117个。其中,全科医学、临床医学等65个专业的“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”、“专业实践能力”4个科目全部实行人机对话考试。其他52个专业的4个科目仍采用纸笔作答的方式进行考试。

为了帮助广大考生做好考前复习工作,特组织国内有关专家、教授编写了《2012全国卫生专业技术资格考试指导》外科学部分。本书根据最新考试大纲中的具体要求,参考国内外权威著作,将考试大纲中的各知识点与学科的系统性结合起来,以便于考生理解、记忆。

外科学考试专业设置普通外科学、骨外科学、胸心外科学、神经外科学、泌尿外科学、小儿外科学、烧伤外科学、整形外科学共8个亚专业。考试共分四个科目,均采用人机对话的方式进行考试。其中“基础知识”和“相关专业知识”科目外科学各亚专业考核内容相同。“专业知识”与“专业实践能力”科目各亚专业考核内容为本亚专业考试大纲所要求掌握的内容。考生应根据所报考专业对照考试大纲选择复习相应专业的考核内容。全书内容与考试科目的关系如下:

“基础知识”:考查考生对外科学的基础理论和基本知识的掌握程度,对外科学的临床基本问题的理解、检查和处理能力。考核内容为考试大纲中外科学基本部分所要求的全部内容。

“相关专业知识”:考查考生对外科学各亚专业常见疾病的发病学、病因学、病理生理学、病理学、临床表现、辅助检查等方面知识的掌握程度。考核内容为考试大纲中以“*”标记的全部内容。

“专业知识”:考查考生对外科学本专业疾病的病因、病理生理、临床表现、诊断、鉴别诊断以及治疗等方面综合知识的掌握程度。

“专业实践能力”:考试内容为考试大纲中列出的常见病种,主要考核考生在临床工作中所应该具备的技能、思维方式和对已有知识的综合应用能力。这一部分将采用案例分析题的形式考核,沿时间或空间、病情进展、临床诊疗过程的顺序提问,侧重考查考生对病情的分析、判断及对临床症状的处理能力,还涉及到对循证医学的了解情况。考生的答题情况在很大程度上与临床实践中的积累有关。

欢迎广大考生和专业人士来信交流学习:zgks2009@163.com。

目 录

第一篇 外科学基本部分

第一章 水、电解质代谢和酸碱平衡	1
第二章 外科输血	10
第三章 外科休克	14
第四章 麻醉	19
第五章 多器官功能障碍综合征	22
第六章 围术期处理	27
第七章 外科患者的营养支持	32
第八章 外科感染	34
第九章 创伤和战伤	42
第十章 肿瘤	48
第十一章 复苏与重症监测	55
第十二章 器官移植	57
第十三章 常见体表肿物	61
第十四章 现代外科诊疗技术	65

第二篇 普通外科学

第一章 颈部疾病	71
第二章 甲状腺及甲状旁腺疾病	74
第三章 乳房疾病	79
第四章 周围血管疾病	83
第五章 腹外疝	88
第六章 外科急腹症	92
第七章 腹部损伤	95
第八章 腹膜、网膜和腹膜后间隙疾病	98
第九章 胃、十二指肠疾病	105
第十章 阑尾疾病	109

第十一章 小肠结肠疾病	114
第十二章 肛管直肠疾病	124
第十三章 肝脏疾病	128
第十四章 门静脉高压症	133
第十五章 胆系疾病	136
第十六章 胰腺疾病	142
第十七章 脾脏外科	152
第十八章 上消化道大出血	154
第十九章 腹腔镜外科	156

第三篇 骨 外 科 学

第一章 运动系统理学检查法	163
第二章 骨折概论	169
第三章 上肢骨关节损伤	179
第四章 手外伤及断肢再植	183
第五章 下肢骨关节损伤	185
第六章 脊柱及骨盆骨折	192
第七章 周围神经损伤	200
第八章 人工关节	205
第九章 运动系统慢性损伤	210
第十章 腰腿痛与颈肩痛	216
第十一章 骨与关节化脓性感染	221
第十二章 骨与关节结核	226
第十三章 非化脓性关节炎	231
第十四章 运动系统畸形	234
第十五章 骨肿瘤	236

第四篇 胸心外科学

第一章 胸部损伤	245
第二章 胸壁和胸膜疾病	251
第三章 肺部疾病	254
第四章 食管疾病	260
第五章 纵隔、膈疾病	264
第六章 电视胸腔镜手术	267
第七章 心脏手术基础	269
第八章 先天性心脏病的外科治疗	271

第九章 后天性心脏病的外科治疗.....	273
----------------------	-----

第五篇 神经外科学

第一章 颅脑局部显微解剖.....	283
第二章 神经系统病理生理学基础.....	285
第三章 神经系统查体.....	288
第四章 神经系统疾病定位诊断.....	291
第五章 神经外科治疗基础.....	293
第六章 原发性颅脑损伤.....	294
第七章 继发性颅脑损伤.....	297
第八章 颅脑损伤并发症和后遗症.....	299
第九章 颅内肿瘤.....	302
第十章 颅骨肿瘤.....	308
第十一章 颅骨先天性疾病.....	309
第十二章 颅内感染性疾病.....	310
第十三章 脑血管疾病.....	311
第十四章 脊柱和脊髓疾病.....	314
第十五章 功能性疾病.....	316

第六篇 泌尿外科学

第一章 泌尿男生殖系的主要症状与检查诊断方法.....	319
第二章 尿路梗阻.....	323
第三章 泌尿男生殖系畸形.....	327
第四章 泌尿系损伤.....	330
第五章 泌尿男生殖系感染.....	337
第六章 泌尿男生殖系结核.....	343
第七章 尿石症.....	346
第八章 泌尿男生殖系肿瘤.....	350
第九章 泌尿男生殖系其他疾病.....	357
第十章 肾上腺外科疾病.....	366
第十一章 肾移植.....	370

第七篇 小儿外科学

第一章 小儿外科基础.....	375
-----------------	-----

第二章	新生儿外科	397
第三章	小儿普通外科	420
第四章	小儿神经外科	463
第五章	小儿泌尿外科	473
第六章	小儿骨科	493
第七章	小儿胸心外科	508

第八篇 烧伤外科学

第一章	概论	523
第二章	烧伤休克	525
第三章	烧伤创面处理与修复	527
第四章	烧伤吸入性损伤	529
第五章	烧伤感染	531
第六章	烧伤免疫	532
第七章	烧伤代谢与营养	533
第八章	特殊原因烧伤	534
第九章	特殊部位烧伤	536
第十章	大面积烧伤后常见并发症	537
第十一章	烧伤复合伤	539
第十二章	创面修复材料	540

第九篇 整形外科学

第一章	伤口愈合	541
第二章	整形外科基本技术	542
第三章	移植	543
第四章	皮肤移植术	544
第五章	皮肤之外的自体组织移植术	546
第六章	瘢痕总论	547
第七章	组织代用品	548
第八章	显微外科在整形外科中的应用	549
第九章	皮肤软组织扩张术	550
第十章	皮肤的良性病变	551
第十一章	皮肤的恶性病变	553
第十二章	头皮疾患与颅骨缺损	555
第十三章	眼部疾患	556
第十四章	耳畸形	558

第十五章 鼻畸形	559
第十六章 先天性唇腭裂	560
第十七章 手	562
第十八章 瘢痕挛缩畸形	565
第十九章 男性外生殖器畸形	566
第二十章 女性外生殖器畸形	567
第二十一章 皮肤的慢性溃疡	568
第二十二章 淋巴水肿	569
第二十三章 颅面外科	570
第二十四章 美容外科	571
第二十五章 颜面部病损	572
外科学考试大纲	573

(报考外科专业人员须掌握以下全部内容)

第一章 水、电解质代谢和酸碱平衡

一、概 述

(一) 体液的量、分布及组成

1. 体液 指身体内的液体,包括细胞内液和细胞外液。

成年男性体液占体重的 60% (女性 50%); 成分: 水、电解质。

小儿因为脂肪少故而体液比例高,新生儿体液占体重的 80%,大于 14 岁与成年人相仿。

细胞内液: 男性占体重的 40%,女性占 35%。

细胞外液: 占体重的 20%,血浆占 5%,组织间液占 15%。

组织间液: 指细胞外液中非血管内液体存留。包括功能性组织间液: 与细胞内液和血管内液有交换,在维持机体水、电解质平衡上起关键作用; 非功能性组织间液(结缔组织水、经细胞水): 占体重的 1%~2%,与细胞内液和血管内液无或少交换(关节液、消化液、消化道液),对维持机体水、电解质平衡作用小。

2. 电解质(表 1-1-1)。

表 1-1-1 电解质主要离子分布

	细胞外液	细胞内液
主要阳离子	Na ⁺	K ⁺ 、Mg ²⁺
主要阴离子	Cl ⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、蛋白质	HPO ₄ ²⁻ 、蛋白质

3. 渗透压 细胞外液=细胞内液=290~310mmol/L。

(二) 体液的代谢

1. 水代谢

(1) 水的摄入: 成人需水 2000~2500ml/d, 其中直接摄入水 1700~2200ml, 体内氧化生成水 200~400ml。

(2) 水的排出: 2000~2500ml/d

1) 肾排出: 1000~1500ml/d。

2) 皮肤的蒸发和出汗: 500ml/d; 体温每升高 1℃, 水分丧失增加 100ml/d。

3) 肺呼出: 400ml/d, 非显性失水指皮肤蒸发和肺呼出的水分。

4) 肠排出: 消化液 8000ml/d, 吸收 98%, 排出 100ml/d。

(3)水的流动:水总是由低渗透压处流到高渗透压处。

2. 钠代谢 常人体钠总量 3700mmol

(1)钠摄入:食物,4.5g/d(含 Na^+ 约 77mmol)。

(2)钠排出:主要肾排出(70~90mmol/d),少量汗排出。

(3)钠是维持细胞外液渗透压的主要成分。

(三) 体液平衡的调节

包括两个调节系统。

1. 下丘脑-神经垂体-血管升压素系统 渗透压升高时,通过调节使之正常。

2. 肾素-醛固酮-血管紧张素系统 血容量下降时,通过调节使之恢复正常。血容量大量丧失时,机体将牺牲渗透压,优先保证血容量。

(四) 水、电解质平衡失调的防治原则

1. 防 补充每日需要量。

2. 治 纠正病因;当日需要量加上以往丧失量,一般在 2~3 日左右补足。

二、水和钠代谢紊乱

(一) 等渗性缺水(急性缺水或混合性缺水)

水和钠等比例失调,血清 Na^+ 正常,细胞外液渗透压正常。

1. 病因

(1)消化液的急性丧失:呕吐、肠外瘘。

(2)体液丧失在感染区或软组织内:肠梗阻、烧伤、腹腔感染,丧失液体与细胞外液成分相同。

2. 临床表现

(1)缺水表现:尿少、厌食、乏力、恶心、皮肤干燥、眼球下陷、不口渴。

(2)休克表现:缺水大于体重 5% 时出现,大于 6%~7% 时严重。

(3)常伴代谢性酸中毒。

(4)丧失液体主要为胃液时, Cl^- 大量丢失,则伴发代谢性碱中毒。

3. 诊断

(1)病史和临床表现:体液丧失史或不能进食史,持续时间,估计失液量。

(2)化验:RBC、Hb 和血细胞比容升高(血浓缩);血清 Na^+ 、 Cl^- 正常;尿比重升高;查血气分析或 CO_2 结合力,了解有无酸、碱中毒。

4. 治疗

(1)治疗原发病:减少水和钠的丧失。

(2)补水、钠:平衡盐水或等渗盐水。等渗盐水: $\text{Na}^+/\text{Cl}^- = 1$;平衡液: $\text{Na}^+/\text{Cl}^- \approx 3:2$ (与血浆 Na^+/Cl^- 相近),乳酸钠和复方氯化钠溶液(1.86% 乳酸钠溶液和复方氯化钠溶液之比为 1:2),碳酸氢钠和等渗盐水溶液(1.25% 碳酸氢钠溶液和等渗盐水溶液之比为 1:2),补等渗盐水量(L)=(血细胞比容上升值/正常值)×体重(kg)×0.20+日需水(2000ml)+日需钠(4.5g)或(4~6g)。

1)有血容量不足表现时:先从静脉快速滴注等渗盐水或平衡液约 3000ml(按 60kg 体重计算),以恢复血容量;

2)无血容量不足表现时:则用上述用量的 1/3~1/2,即 1500~2000ml;

3)尿量超过 40ml/h 后,补钾。

(二) 低渗性缺水(慢性缺水或继发性缺水)

水、钠同失;缺水少于缺钠;血清钠低于正常;细胞外液低渗;细胞水肿;细胞外脱水。

1. 病因

- (1) 胃肠道消化液持续丧失:反复呕吐、胃肠道持续吸引、慢性肠梗阻。
- (2) 大创面慢性渗液。
- (3) 肾排水和钠过多:用利尿剂,未补钠。

2. 临床表现(表 1-1-2)

表 1-1-2 低渗性缺水的临床表现

程度	缺 NaCl/kg 体重	血清 Na^+	临 床 表 现
轻度	0.5g	<135mmol/L	缺钠表现:疲乏、手足麻木、口渴不明显;尿 Na^+ 减少
中度	0.5~0.75g	<130mmol/L	可出现休克:尿少,尿中不含 Na^+ 、 Cl^-
重度	0.75~1.25g	<120mmol/L	神经系统表现:神志不清、肌痉挛性抽痛。腱反射减弱或消失,木僵甚至昏迷;休克表现

- (1) 低钠缺水表现:头晕、视觉模糊、无力。
- (2) 休克表现:脉快细、晕倒。
- (3) 神经系统表现:神志不清、肌痉挛性抽痛、腱反射弱、昏迷。

3. 诊断

- (1) 病史和临床表现。
- (2) 尿 Na^+ 和 Cl^- 明显减少。
- (3) 血清 Na^+ 测定:低于 135mmol/L。
- (4) 血浆渗透压降低。
- (5) RBC、Hb、血细胞比容、BUN 升高,尿比重下降至 1.010 以下。

4. 治疗 补 Na^+ 量(mmol)=[血钠正常值(mmol/L)-血钠测量值(mmol/L)]×体重(kg)×0.6(女性×0.5), $17\text{mmolNa}=1\text{g}$ 钠盐。

- (1) 轻度和中度缺钠:根据临床缺钠程度估计补钠量;一般先给一半量,加上日需要量 4.5g,和日需水量 2000ml,其余一半量,在第 2 日补充。
- (2) 重度缺钠:出现休克者,应先补充血容量;静脉滴注高渗盐水(5%氯化钠溶液)200~300ml,尽快纠正血钠过低,根据病情再决定是否继续给予高渗盐水或改用等渗盐水。
- (3) 缺钠伴酸中毒:在补充血容量和钠盐后,由于机体的代偿调节功能,酸中毒常可同时得到纠正,一般不需要开始就给予碱性药物。
- (4) 尿量达到 40ml/h,补充钾。

(三) 高渗性缺水(原发缺水)

水、钠同失;缺水多于缺钠;血清钠升高;细胞外液高渗;细胞内脱水。

1. 病因

- (1) 摄水不足:鼻饲高浓度要素饮食、高危患者给水不足。
- (2) 失水过多:大量出汗、烧伤暴露疗法、糖尿病昏迷等。

2. 临床表现(表 1-1-3)

3. 诊断 病史和临床表现:尿比重升高;RBC、Hb、血细胞比容升高;血清 Na^+ 升高,>

150mmol/L；血浆渗透压升高。

4. 治疗 静脉滴注低渗盐水：0.45%氯化钠溶液或5%葡萄糖十日需量水、钠。补充已丧失液体量的方法如下：

表 1-1-3 高渗性缺水的临床表现

程度	缺水占体重	临床表现
轻度	2%~4%	仅有口渴
中度	4%~6%	极度口渴；干燥、皮肤弹性差、眼部凹陷；尿少，尿比重增加
重度	>6%	上述表现+脑功能(神经系统)障碍(躁狂、幻觉、谵妄)

(1)根据临床表现：每丧失体重1%补液400~500ml；轻度缺水的缺水量占体重2%~4%，补水1000~1500ml；中度缺水的缺水量占体重的4%~6%，补水2500~3000ml。

(2)根据血钠浓度：补水量(ml)=[血钠测量值(mmol/L)-血钠正常值(mmol/L)]×体重(kg)×4。

计算的补水量分2日补充，当日给一半量，别忘补充日需水、钠量，尿量超过40ml/h后补钾。

(四) 水过多(水中毒或稀释性低血钠)

钠不少，水过多(与低渗性缺水鉴别)，较少发生。水进入组织内，使细胞内、外液渗透压下降。

1. 病因 仅在ADH分泌过多或肾功能不全时，机体摄入水分过多或接受过多的静脉输液，才造成水在体内蓄积，导致水中毒。

2. 临床表现

(1)急性水中毒：颅内压升高症状；神经、精神症状；严重者可出现脑疝。

(2)慢性水中毒：体重升高，皮肤苍白而湿润，涎液、眼泪增加，一般无可凹陷性水肿。

(3)诊断：血浆渗透压下降，RBC、Hb、血细胞比容、血浆蛋白量下降，红细胞平均容积升高和红细胞平均血红蛋白浓度下降。

(4)治疗：预防重于治疗；对容易发生血管升压素分泌过多的情况时，如疼痛、失血、休克、创伤和大手术等，及急性肾功能不全的患者和慢性心功能不全的患者，应严格限制入水量。对水中毒患者：停止摄水；应用渗透性利尿剂(20%甘露醇或25%山梨醇200ml)静脉快速滴入或襻利尿剂(呋塞米和依他尼酸)；静脉滴注5%氯化钠溶液，迅速改善体液的低渗状态和减轻脑水肿。

三、钾的异常

血清钾正常值为3.5~5.5mmol/L，高钾血症时血钾>5.5mmol/L；低钾血症时血钾<3.5mmol/L。

(一) 低钾血症

1. 病因

(1)长期进食不足。

(2)利尿剂(排钾)、肾小管性酸中毒、盐皮质激素过多等，使钾从肾排出过多。

(3) 补液不补钾——医源性。

(4) 消化液丧失: 呕吐、持续胃肠减压、禁食、肠瘘、结肠绒毛状腺瘤和输尿管乙状结肠吻合术等, 钾从肾外途径丧失。

2. 临床表现及诊断

(1) 肌无力: 肌无力为最早表现, 先为四肢, 继而延及躯干和呼吸肌, 然后软瘫、腱反射减退或消失。

(2) 胃肠道: 肠麻痹——要考虑低钾。

(3) 心脏: 传导和节律异常。心电图: 早期 T 波低平、变宽、双相或倒置; 随后 ST 段降低, QT 间期延长, U 波出现(低钾的典型心电图表现)。

(4) 碱中毒: 尿呈酸性(反常性酸性尿)。

3. 治疗 见尿补钾。

(1) 治疗低钾的病因, 减少钾的丢失。

(2) 参考血清钾测定结果确定补钾量

1) 血清钾 $< 3 \text{ mmol/L}$, 给 $\text{K}^+ 200 \sim 400 \text{ mmol}$, 可提高血清钾 1 mmol/L ; 血清钾 $3.0 \sim 4.5 \text{ mmol/L}$, 给 $\text{K}^+ 100 \sim 200 \text{ mmol}$, 可提高血清钾 1 mmol/L 。

2) 细胞外液的钾总量为 60 mmol , 补钾速度不宜超过 20 mmol/h , 每日补钾量不宜超过 $100 \sim 200 \text{ mmol}$ 。

3) 如患者有休克, 应先给予晶体或胶体溶液, 尽快恢复血容量, 在尿量超过 40 ml/h 后, 再从静脉给予氯化钾溶液。

4) 完全纠正缺钾需时较长, 患者能够口服后, 可服钾盐。

(二) 高钾血症

1. 病因 肾功能减退, 不能排钾。

(1) 体内摄入钾过多: 含钾的药物应用, 组织损伤, 输入库存血。

(2) 肾排泄功能减退: 急性肾衰, 应用保钾利尿剂, 盐皮质激素不足。

(3) 经细胞的分布异常: 酸中毒等。

2. 临床表现及诊断

(1) 有引起高钾的病因。

(2) 有轻度神志模糊或淡漠、感觉异常和四肢软弱。

(3) 严重的高血钾有微循环障碍的表现, 如皮肤苍白、发冷、青紫、低血压等。

(4) 常出现心跳缓慢或心律不齐, 甚至发生心脏停搏。

(5) 典型的心电图表现(尤其血钾超过 7 mmol/L 时): 早期 T 波高尖(典型表现), QT 间期延长, 随后 QRS 增宽, PR 间期延长。

(6) 测定血清钾超过 5.5 mmol/L 。

3. 治疗

(1) 停止摄入钾。

(2) 降低血清钾的浓度: 利尿治疗, 选择排 K^+ 利尿剂, 如呋塞米。

(3) 使 K^+ 暂时转入细胞内: 静脉注射 5% 碳酸氢钠溶液 $60 \sim 100 \text{ ml}$ 后, 继续静脉滴注碳酸氢钠 $100 \sim 200 \text{ ml}$; 用 25% 葡萄糖溶液 $100 \sim 200 \text{ ml}$, 每 $3 \sim 4 \text{ g}$ 糖加入胰岛素 1 U , 每 $3 \sim 4 \text{ 小时}$ 重复给药; 肾功能不全, 不能输液过多者, 可用 10% 葡萄糖酸钙溶液 100 ml 、 11.2% 乳酸钠溶液 50 ml 、 25% 葡萄糖溶液 400 ml , 加入胰岛素 30 U , 静脉持续滴注 24 小时 , 每分钟 6 滴 ; 应用

阳离子交换树脂:每日口服4次,每次15g,也可加10%葡萄糖溶液200ml后作保留灌肠。

(4)透析疗法:腹膜透析或血液透析。

(5)对抗心律失常:静脉注射10%葡萄糖酸钙溶液20ml,也可用30~40ml葡萄糖酸钙溶液加入静脉输液滴注。

四、其他类型的体液代谢失调

(一) 体内钙的异常

血清钙浓度为2.25~2.75mmol/L。

1. 低钙血症

(1)病因:急性胰腺炎、坏死性筋膜炎、肾衰竭、胰及小肠瘘和甲状旁腺受损等。

(2)临床表现及诊断:主要由神经肌肉的兴奋性增强所引起,如容易激动、口周和指(趾)尖麻木及针刺感、手足搐搦、肌肉和腹部绞痛、腱反射亢进,以及Chvostek征和Trousseau征阳性。血清钙测定低于2mmol/L时,基本上可明确诊断。

(3)治疗:应纠治原发疾病,同时用10%葡萄糖酸钙20ml或5%氯化钙10ml作静脉注射,以缓解症状。如有碱中毒,需同时纠治。必要时可多次给药。对需要长期治疗的患者,可服乳酸钙,或同时补充维生素D。

2. 高钙血症

(1)病因:主要发生于甲状旁腺功能亢进症,其次是骨转移癌。

(2)临床表现及诊断:早期症状有疲倦、软弱、乏力、食欲减退、恶心、呕吐和体重下降等。血清钙增高达4~5mmol/L时,即有生命危险。

(3)治疗:对甲状旁腺功能亢进症应进行手术治疗。对骨转移癌患者,可给低钙饮食和充足的水分。对症治疗可采用补液、乙二胺四乙酸(EDTA)、类固醇和硫酸钠等。

(二) 体内镁的异常

血清镁的正常浓度为0.8~1.2mmol/L。

1. 镁缺乏

(1)病因:摄入不足是造成缺镁的主要原因。

(2)临床表现及诊断:常见的症状有记忆力减退、精神紧张、易激动,神志不清、烦躁不安、手足徐动症样运动等。患者面容苍白、委顿。严重缺镁时,患者可有癫痫发作。

对有诱发因素而又出现一些镁缺乏症状的患者,即应考虑有否镁缺乏存在。在某些低钾症患者中,补钾后情况仍无改善时,应考虑有镁缺乏。遇有发生搐搦并怀疑与缺钙有关的患者,注射钙剂后,不能解除搐搦时,也应怀疑有镁缺乏。血清镁浓度的测定一般对确诊少有价值。必要时,可作镁负荷试验,对确定镁缺乏的诊断有较大帮助。

(3)治疗:一般可按0.25mol/(kg·d)的剂量为患者补充镁盐。如患者的肾功能正常,而镁缺乏又严重时,可按1mol/(kg·d)补充镁盐。镁缺乏的完全纠正需时较长,故在解除症状后,仍需继续每日补镁1~3周。

2. 镁过多

(1)病因:主要发生在肾功能不全时,偶见于应用硫酸镁治疗子痫的过程中。早期烧伤、大面积损伤或外科应激反应、严重细胞外液不足和严重酸中毒也可引血清镁增高。

(2)临床表现及诊断:有疲倦、乏力、腱反射消失和血压下降等。血清镁浓度有较大的增高时,心脏传导功能发生障碍,心电图显示PR间期延长,QRS波增宽和T波升高。晚期可出现

呼吸抑制、嗜睡和昏迷，甚至心搏骤停。

(3)治疗：应先从静脉缓慢输给2.5~5mmol葡萄糖酸钙或氯化钙溶液，以对抗镁对心脏和肌肉的抑制。同时要积极纠正酸中毒和缺水，停止给镁。如血清镁浓度仍无下降或症状仍不减轻，应及早采用腹膜透析或血液透析。

(三) 体内磷的异常

正常血清无机磷浓度为0.96~1.62mmol/L。

1. 低磷血症

(1)病因：甲状旁腺功能亢进症、严重烧伤或感染；大量葡萄糖及胰岛素输入使磷进入细胞内；磷摄入不足。

(2)临床表现及诊断：低磷血症可有神经肌肉症状，如头晕、厌食、肌无力等。重症者可有抽搐、精神错乱、昏迷，甚至可因呼吸肌无力而危及生命。低磷血症时血清无机磷浓度<0.96mmol/L。

(3)治疗：对需长期静脉输液者，溶液中应每天补充磷10mmol。有严重低磷者，可酌情增加磷制剂用量。对甲状旁腺功能亢进者，手术治疗可使低磷血症得到纠正。

2. 高磷血症

(1)病因：急性肾衰竭、甲状旁腺功能低下等。酸中毒或淋巴瘤等化疗时可使磷从细胞内逸出，导致血清磷升高。

(2)临床表现及诊断：由于继发性导致低钙血症发生，可出现一系列低血钙的症状。因异位钙化可有肾功能受损表现。高磷血症时血清无机磷浓度>1.62mmol/L。

(3)治疗：除对原发病作防治外，可针对低钙血症进行治疗。急性肾衰竭伴明显高磷血症者，必要时可作透析治疗。

五、酸碱平衡紊乱

(一) 体液酸碱平衡的维持

1. 肺 CO_2 的排出调节。

2. 肾 肾小管上皮细胞排泌 H^+ ，重吸收 Na^+ ，保留 HCO_3^- ，维持血浆 HCO_3^- 浓度。

(1) $\text{H}^+ - \text{Na}^+$ 交换。

(2) HCO_3^- 重吸收。

(3) $\text{NH}_3^+ - \text{H}^+$ 结合成 NH_4^+ 由尿排出。

(4) 尿酸化排出 H^+ 。

3. 血液的缓冲系统 血浆中主要的缓冲系统为 $\text{HCO}_3^- / \text{H}_2\text{CO}_3 = 20 : 1$ 。

(二) 血气分析的各种指标

1. 血 pH 表示血液中 H^+ 浓度的指标，由代谢性成分和呼吸性成分的比值决定；正常动脉血pH为7.40±0.05；此值的异常表示存在酸或碱中毒，但此值正常并不意味着不存在代谢问题。

2. PCO_2 指血液中游离的 CO_2 所产生的张力；正常动脉血的 PCO_2 为4.53~6.00kPa(34~45mmHg)，平均5.33kPa(40mmHg)；反映酸碱代谢中呼吸性成分的指标。

3. H_2CO_3 碳酸(H_2CO_3)的浓度(mmol/L)： $\text{PCO}_2 \times 0.03$ (CO_2 的溶解系数)得到；意义与 PCO_2 相同。

4. 真实 HCO_3^- (A. B.) 指用与空气隔绝的全血标本测得的血浆中的 HCO_3^- 的实际含