

决·胜·考·研

西医综合系列

2000—2011

西医综合

历年考卷精解

北京大学医学部专家组 编

- 11 年真题，实战模拟演练
- 专家精解，详析重点难点
- 在线模考增值服务

赠送 50元 网上学习费用



北京大学医学出版社

2000—2011
历年真题精解

2000—2011

西医综合

历年考点精解

主编：李金柱 副主编：李金柱

- 1. 历年真题，原汁原味，原汁原味
- 2. 名师点评，名师点评，名师点评
- 3. 名师点评，名师点评，名师点评

2000—2011 历年真题精解



人民卫生出版社

决胜考研·西医综合系列

西医综合历年考卷精解

(2000—2011)

北京大学医学部专家组 编

北京大学医学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西医综合历年考卷精解/北京大学医学部专家组编. —北京: 北京大学医学出版社, 2007

ISBN 978-7-81116-029-1

I. 西… II. 北… III. 现代医药学—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. R

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 031296 号

西医综合历年考卷精解

北京大学医学部专家组 编

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E - mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 冯智勇 责任校对: 吉 鑫 责任印制: 张京生

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 24 字数: 575 千字

版 次: 2007 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月修订

书 号: ISBN 978-7-81116-029-1

定 价: 46.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

2011 年全国硕士研究生入学考试 西医综合科目试题

一、A 型题：1~90 小题，每小题 1.5 分；91~120 小题，每小题 2 分；共 195 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

- 下列生理活动中，存在负反馈控制的是
 - 动作电位的产生
 - 血糖浓度的调节
 - 排便反射的过程
 - 兴奋的突触传递
- 在神经-肌接头的终板膜上，实现跨膜信号转导的方式是
 - 受体-G 蛋白-AC 途径
 - 受体-G 蛋白-PLC 途径
 - 离子通道受体途径
 - 酪氨酸激酶受体途径
- 与 Nernst 公式计算所得相比，实际测得的神经细胞静息电位值
 - 恰等于 K^+ 平衡电位
 - 恰等于 Na^+ 平衡电位
 - 接近于 Na^+ 平衡电位
 - 接近于 K^+ 平衡电位
- 可导致红细胞沉降速率增快的影响因素是
 - 血细胞比容增大
 - 血浆球蛋白含量增多
 - 红细胞脆性增大
 - 血浆白蛋白含量增多
- Rh 阴性的母亲所生的 Rh 阳性子女，有可能患
 - 巨幼红细胞性贫血
 - 血友病
 - 新生儿溶血性贫血
 - 红细胞增多症
- 一个心动周期中，心室内容积达到最大的时刻是
 - 心房收缩期末
 - 减慢充盈期末
 - 减慢射血期末
 - 快速充盈期末
- 生理情况下，人的中心静脉压升高可见于
 - 心脏射血能力加强
 - 体位由直立变为平卧
 - 从行走改为站立
 - 由吸气相转为呼气相
- 体内 CO_2 分压最高的部位是
 - 组织液
 - 细胞内液
 - 毛细血管血液
 - 静脉血液
- 中枢化学感受器的生理性刺激是
 - 动脉血液中的 CO_2 分压
 - 动脉血液中的 O_2 分压
 - 动脉血液中的 H^+ 浓度
 - 脑脊液和局部细胞外的 H^+ 浓度
- 下列选项中，能促进胃排空的神经或体液因素是
 - 迷走-迷走反射
 - 肠-胃反射
 - 胃酸
 - 促胰液素

11. 下列选项中, 能促进 Ca^{2+} 在小肠吸收的因素是
 - A. 葡萄糖
 - B. 植酸
 - C. 草酸盐
 - D. 磷酸盐
12. 临床上测定能量代谢时, 为了简便, 通常只需测定
 - A. 一定时间内的 CO_2 产生量
 - B. 非蛋白氧热价
 - C. 非蛋白呼吸商
 - D. 一定时间内的氧耗量
13. 当环境温度低于皮肤温度时, 人体散热的主要方式是
 - A. 辐射
 - B. 传导
 - C. 对流
 - D. 不感蒸发
14. 下列选项中, 能使肾小球有效滤过压升高的是
 - A. 肾血浆流量增多
 - B. 肾小球囊内压升高
 - C. 血浆晶体渗透压降低
 - D. 血浆胶体渗透压降低
15. 肾小管液被显著稀释的部位是
 - A. 近端小管
 - B. 集合管
 - C. 髓袢升支粗段
 - D. 远曲小管
16. 视网膜中央凹对光的感受分辨力高, 其主要原因是
 - A. 感光色素含量高
 - B. 感光细胞的兴奋性高
 - C. 视觉传递系统呈单线联系
 - D. 感光色素处于合成状态
17. 声波由鼓膜经听骨链到达卵圆窗膜时, 振动变化的特征是
 - A. 压强增大, 振幅不变
 - B. 压强增大, 振幅减小
 - C. 压强增大, 振幅增大
 - D. 压强减小, 振幅减小
18. 顺向快速轴浆运输主要运送的物质是
 - A. 具有膜的细胞器
 - B. 递质合成酶
 - C. 微丝和微管
 - D. 神经营养因子
19. 下列关于腱反射的叙述, 正确的是
 - A. 高位中枢病变时反射亢进
 - B. 反射中枢位于延髓
 - C. 效应器为同一关节的拮抗肌
 - D. 为多突触反射
20. 下列关于生长激素生理作用的叙述, 错误的是
 - A. 促进长骨生长
 - B. 增大内脏器官
 - C. 促进脑的发育
 - D. 促进肌肉的生长
21. 下列关于甲状腺激素对物质代谢影响的叙述, 正确的是
 - A. 正常情况下, 加强蛋白质分解
 - B. 分泌过多时, 使组织间隙中黏蛋白增多
 - C. 抑制组织利用糖, 使血糖浓度升高
 - D. 促进胆固醇合成, 更加速其清除
22. 女性月经来潮是由于
 - A. 血中的 E_2 水平降低, P 水平升高
 - B. 血中的 E_2 水平升高, P 水平降低
 - C. 血中的 E_2 和 P 水平均降低
 - D. 血中的 FSH 和 LH 水平均降低
23. 合成血红蛋白的基本原料是
 - A. 铁和叶酸
 - B. 钴和维生素 B_{12}
 - C. 铁和蛋白质
 - D. 蛋白质和内因子

37. 下列选项中,属于蛋白质生物合成抑制剂的是
A. 5-氟尿嘧啶 B. 卡那霉素
C. 甲氨蝶呤 D. 别嘌呤醇
38. hnRNA 转变成 mRNA 的过程是
A. 转录起始 B. 转录终止
C. 转录后加工 D. 翻译起始
39. 作为克隆载体的最基本条件是
A. DNA 分子量较小 B. 环状双链 DNA 分子
C. 有自我复制功能 D. 有一定遗传标志
40. 体内血红素代谢的终产物是
A. CO_2 和 H_2O B. 乙酰 CoA
C. 胆色素 D. 胆汁酸
41. 患者,20 岁,骨折愈合良好。5 年后骨折处骨组织病理变化表现为
A. 大量成纤维细胞 B. 大量新生毛细血管
C. 正常骨组织 D. 大量多核巨细胞
42. 下列选项中,属于转移性钙化的是
A. 结核病灶钙化 B. 肺间质钙化
C. 淋巴瘤钙化 D. 血栓钙化
43. 下列炎症介质中,具有趋化作用的是
A. 缓激肽 B. 前列腺素 C. NO D. IL-8
44. 下列选项中,属于凋亡特征的是
A. 死亡细胞质膜破裂 B. 活体内单个细胞死亡
C. 死亡细胞自溶 D. 伴有急性炎症反应
45. 女,23 岁,足月初产,无妊娠并发症。在阴道分娩过程中,突然呼吸困难,发绀,血压下降,全身抽搐,昏迷,抢救无效死亡。尸体解剖,肺小动脉和毛细血管内最可能的发现是
A. 角化上皮 B. 脂滴 C. 气泡 D. 血栓
46. 下列选项中,属于良性肿瘤的是
A. 视网膜母细胞瘤 B. 软骨母细胞瘤
C. 肾母细胞瘤 D. 神经母细胞瘤
47. 患者,女,58 岁。因左乳腺外上象限肿物伴腋窝淋巴结肿大住院。手术标本病理诊断为左乳腺浸润性导管癌伴淋巴结转移 (2/10)。下列病理变化中,与患者肿瘤转移关系最密切的是
A. 角蛋白的表达增高 B. 凋亡增多
C. 层粘连蛋白受体增多 D. 出现坏死灶
48. 风湿病变质渗出期的主要病变是
A. 纤维素样坏死形成 B. 阿少夫小体形成
C. 梭形瘢痕形成 D. 小脓肿形成
49. 系统性红斑狼疮的狼疮带是指带状免疫荧光出现于
A. 关节滑膜内 B. 血管壁

- C. 肾小球基膜
D. 真皮与表皮交界处
50. 与动脉粥样硬化斑块形成无关的细胞是
A. 内皮细胞 B. 平滑肌细胞 C. 单核细胞 D. 成纤维细胞
51. 形成早期细胞性硅结节的细胞主要是
A. 巨噬细胞 B. 淋巴细胞
C. 成纤维细胞 D. 嗜中性粒细胞
52. 中央型肺气肿是指
A. 三、四级支气管和周围肺泡囊扩张
B. 呼吸性细支气管扩张，周围肺泡囊扩张不明显
C. 肺门周围的肺组织扩张，近胸膜处肺组织扩张不明显
D. 呼吸性细支气管扩张不明显，周围肺泡管和肺泡囊扩张
53. 下列选项中，符合前 B 细胞淋巴母细胞白血病/淋巴瘤的叙述是
A. 老年患者多见 B. 95% TdT 阳性
C. 白细胞计数超过 $100 \sim 10^9/L$ D. Bcl-2 蛋白过度表达
54. 超急性排异反应的主要病因是
A. 受者存在抗移植循环抗体 B. 受者与供者 HLA 配型不理想
C. 受者存在严重的免疫缺陷 D. 受者存在抗移植 T 淋巴细胞
55. 下列肝细胞坏死的病变中，可以经过完全再生修复的是
A. 大块坏死 B. 桥接坏死 C. 灶状坏死 D. 碎片坏死
56. 下列乳腺癌的病理学类型中，属于原位癌的是
A. 导管内癌 B. 黏液癌 C. 髓样癌 D. 小管癌
57. 动态心电图检查对评价心律失常的临床价值最小的是
A. 心率变异性 B. 心律失常类型
C. 心律失常性质 D. 心律失常病因
58. 正常人腹部触诊时，下列结构不能触及的是
A. 腰椎椎体 B. 横结肠
C. 胰腺 D. 带粪块的乙状结肠
59. 下列关于高排量型心力衰竭临床表现的叙述，正确的是
A. 可出现脉压增大 B. 以全心衰竭为主
C. 多表现为舒张性心衰 D. 常见于心动过速的心衰患者
60. 患者，男，32 岁。发现血压高 1 年，最高达到 170/100mmHg，自服硝苯地平片治疗。近半年来出现头晕，发作性全身乏力，手足发麻，口渴，夜尿增多。查尿糖（+），尿蛋白（±），尿比重 1.010，血钾 3.01mmol/L。最可能的诊断是
A. 原发性高血压 B. 原发性醛固酮增多症
C. 肾血管性高血压 D. 肾实质性高血压
61. 患者，男，72 岁。患有高血压、心绞痛 2 年。20 小时前经股动脉途径行冠状动脉造影显示：升主动脉明显扩张，左前降支 95% 阻塞。半小时前患者起床后突感胸闷、胸痛、呼吸困难、口唇发绀。血压 70/50mmHg，颈静脉明显充盈，血气 PaO_2 45mmHg、 $PaCO_2$ 35mmHg。最可能的诊断是

- A. 急性心肌梗死
B. 主动脉夹层
C. 急性肺栓塞
D. 心脏压塞
62. 下列关于感染性心内膜炎诊断检查的叙述，**错误**的是
A. 50%以上患者的血培养阳性结果获自第一天的血标本
B. 25%的患者有高丙种球蛋白血症
C. 可见镜下血尿
D. 经食管超声心动图可发现直径 $\leq 5\text{mm}$ 的赘生物
63. 患者，男，30岁。哮喘发作已2天，自服氨茶碱、吸入丙酸倍氯米松气雾剂无效而来诊。体检：患者神志恍惚，发绀，有奇脉，两肺满布哮鸣音，HR 120次/分。对该患者的紧急处理方法应是
A. 静脉推注氨茶碱并监测血药浓度
B. 静脉注射地塞米松和 β_2 -受体激动剂
C. 大量补液、气管插管和机械通气
D. 静脉滴注抗生素和支气管舒张剂
64. 患者，女，16岁。外出郊游后出现头痛、咽痛，伴低热和肌肉酸痛。3天后出现咳嗽和少量黏痰，X线胸片检查结果：双肺下叶边缘模糊的斑片状阴影。1周后查体发现鼓膜充血。最可能的诊断是
A. 军团菌肺炎
B. 支原体肺炎
C. 浸润性肺结核
D. 厌氧菌肺炎
65. 下列关于阻塞性肺气肿发病机制的叙述，**错误**的是
A. 肺纤维化
B. 呼吸性细支气管狭窄
C. 气腔过度膨胀
D. 气腔壁破坏
66. 下列关于胃食管反流病胸痛的叙述，**错误**的是
A. 反流物刺激食管痉挛所致
B. 疼痛可发生在胸骨后
C. 疼痛不向他处放射
D. 疼痛可为剧烈刺痛
67. 下列属于肝硬化肝肾综合征诊断标准的是
A. 肝硬化不合并腹水
B. 有休克
C. 近期末使用肾毒性药物
D. 血肌酐大于 $123\mu\text{mol/L}$
68. 患者，男，40岁。8小时前开始上腹剧烈疼痛。查体：上腹部有压痛。此时对确诊价值不大的检查是
A. 血淀粉酶
B. 尿淀粉酶
C. 心电图
D. X线腹部平片
69. 下列关于急性肾小球肾炎发病机制的叙述，**错误**的是
A. 常由 β -溶血性链球菌感染所致
B. 感染严重程度与病变轻重一致
C. 可通过循环免疫复合物而致病
D. 可通过原位免疫复合物形成而致病
70. 患者，男，40岁。常规体检时发现镜下血尿，尿红细胞5~8/HP，尿蛋白（-），肾功能正常。血压120/80mmHg，B超示双肾未见明显异常。在诊断时，首选的检查是
A. 肾脏CT检查
B. 肾穿刺活检
C. 相差显微镜尿红细胞形态
D. 静脉肾盂造影检查
71. 下列治疗缺铁性贫血的铁剂中，不良反应最明显的是
A. 琥珀酸亚铁
B. 富马酸亚铁

- C. 硫酸亚铁 D. 葡萄糖酸亚铁
72. 急性淋巴细胞白血病引起的中枢神经系统白血病常发生的时间是
A. 起病时 B. 化疗时 C. 缓解时 D. 耐药时
73. 下列有关 Graves 病引起的甲亢性周期性瘫痪的叙述, 正确的是
A. 多见于 20~40 岁成年女性 B. 剧烈运动可诱发
C. 病变主要累及上肢 D. 有低钠血症
74. 早期 Cushing 综合征主要的临床表现是
A. 高血压 B. 向心性肥胖 C. 满月脸 D. 多血质
75. 下列关于类风湿关节炎关节表现的叙述, 错误的是
A. 可有明显而持久的晨僵 B. 关节结构破坏有一定的可逆性
C. 受累关节多呈对称性、持续性 D. 凡受累关节均可肿胀
76. 下列关于系统性红斑狼疮 (SLE) 继发性抗磷脂抗体综合征 (APS) 的叙述, 正确的是
A. 不出现在 SLE 的活动期 B. 可表现为血小板正常
C. 只表现为静脉血栓形成 D. 可表现为习惯性自发性流产
77. 腰麻的绝对禁忌证是
A. 休克 B. 肾脏疾病
C. 慢性肝炎 D. 有普鲁卡因过敏史
78. T 型管拔出后患者出现持续性右上腹痛伴肌紧张, 最可能的原因是
A. 胆道痉挛 B. 胆汁性腹膜炎
C. 急性胆管炎 D. 急性胰腺炎
79. 对胆囊结石患者, 目前最好的治疗方法是
A. 胆囊切开取石 B. 药物溶石
C. 胆囊切除术 D. 体外碎石
80. 患者, 男, 50 岁。昨日在全麻下行右半结肠切除术, 全天胃肠减压量 800 ml, 尿量 2000ml, 今晨电解质正常。今日输液的最佳方案应是
A. 5%葡萄糖盐水 1500ml+10%葡萄糖 2500ml
B. 5%葡萄糖盐水 2000ml+10%葡萄糖 2800ml
C. 5%葡萄糖盐水 1000ml+10%葡萄糖 2500ml
D. 5%葡萄糖盐水 1500ml+10%葡萄糖 1000ml
81. 患者, 男, 50 岁。2 个月前饮酒后剧烈腹痛, 住院 30 天后好转。近日上腹稍左发现一包块, 有轻度压痛。此患者应高度怀疑为
A. 胰腺假性囊肿 B. 脾脏肿瘤
C. 胰腺炎性包块 D. 胰腺恶性肿瘤
82. 下列关于甲状旁腺功能亢进的叙述, 错误的是
A. 原发性甲状旁腺功能亢进中, 80%是由单发甲状旁腺腺瘤引起
B. 慢性肾衰竭也可引起甲状旁腺功能亢进
C. 甲状旁腺素 (PTH) 的分泌受垂体控制
D. 甲状旁腺癌也可引起甲状旁腺功能亢进
83. 目前单独应用化疗治疗效果最佳的肿瘤是

- A. 霍奇金淋巴瘤
B. 乳腺癌
C. 儿童急性淋巴细胞白血病
D. 粒细胞白血病
84. 直肠癌根治术后第一天，病人突然寒战高热，达 39℃。最可能的原因是
A. 伤口感染
B. 肺炎
C. 腹腔感染
D. 输液反应
85. 下列情况中，腹膜刺激征最轻的是
A. 消化道穿孔
B. 脾破裂
C. 急性胆囊炎
D. 急性重症胰腺炎
86. 下列肠梗阻表现中，提示发生肠绞窄可能性较小的是
A. 发病急、疼痛重而持续
B. 腹膜刺激征明显，有休克表现
C. 呕吐物为血性液体
D. 有多次腹部手术史，反复发作腹痛
87. 患者，75 岁。肠梗阻 5 天急行手术探查，术中发现结肠脾曲癌致结肠梗阻，无转移征象，横结肠扩张、水肿。恰当的手术方式是
A. 横结肠造口术，二期左半结肠切除
B. 左半结肠切除，横结肠乙状结肠吻合术
C. 肿瘤切除，横结肠造口术
D. 横结肠、乙状结肠侧侧吻合术
88. 下列关于股骨颈骨折的叙述，错误的是
A. 老年股骨颈骨折不易发生缺血坏死
B. 头下型骨折易出现缺血坏死
C. 基底型骨折不易出现缺血坏死
D. 缺血坏死可发生在骨折数年后
89. 急性血源性骨髓炎最多见的部位是
A. 股骨下段
B. 掌骨
C. 髌骨
D. 胫骨下段
90. 下列关于骨巨细胞瘤的叙述，错误的是
A. 好发于 20~40 岁
B. 局部肿胀有包块
C. 好发于膝关节上、下骨端
D. 多属恶性

(91~92 题共用题干)

患者，男，46 岁。5 天前因压榨性胸痛伴大汗 3 小时来院，诊断急性前壁心肌梗死。因拒绝介入及溶栓治疗而按常规保守处理，1 天后症状缓解，此后病情平稳。4 小时前，患者再次发作胸痛，持续 50 分钟，心尖部可闻 3/6 级收缩中晚期吹风样杂音。

91. 该患者出现杂音最可能的病因是
A. 心力衰竭
B. 腱索断裂
C. 乳头肌功能不全
D. 室间隔穿孔
92. 下列检查指标升高对诊断再梗死意义最大的是
A. cTnT
B. CK-MB
C. LDH
D. AST

(93~95 题共用题干)

患者，男，74 岁。因发热、咳嗽、呼吸困难 1 周来院。查体：体温 38.8℃，脉率 80 次/分，

血压 140/80 mmHg, 未见颈静脉充盈, 右中下肺叩浊, 语音震颤减弱, 呼吸音消失, 左肺可闻散在干性啰音, 心界向左扩大, 心律不整, 心率 100 次/分, 未闻杂音, 腹 (一)。

93. 该患者的主要疾病是

- A. 肺炎 B. 气胸 C. 胸腔积液 D. 心力衰竭

94. 该患者还可能出现的体征有

- A. 气管向左移位 B. 可闻胸膜摩擦音
C. 双侧肋间隙变窄 D. 左上肺支气管呼吸音

95. 为明确病因, 应采取的最佳检查方法是

- A. 胸部 CT B. 胸部 B 超 C. 胸部 X 线片 D. 胸腔穿刺

(96~98 题共用题干)

患者, 女, 22 岁。5 年前发现心脏杂音。2 个月来乏力、头晕、食欲下降, 四肢关节疼痛。1 周末活动后气短, 夜间反复憋醒而来院就诊。查体: 体温 37.8℃, 脉率 96 次/分, 血压 120/60 mmHg, 消瘦, 睑结膜苍白, 可见小出血点, 右肺底少许小水泡音, 心界不大, 心律整, 心尖部 S₁ 减弱, 胸骨左缘第三肋间可闻舒张期叹气样杂音, 肝脾肋下均可及, 下肢不肿。血红蛋白 84g/L, 白细胞 $12.1 \times 10^9/L$, 红细胞沉降率 (血沉) 38mm/第 1 小时末, 尿常规红细胞 2~4/HP。

96. 该患者最主要的疾病是

- A. 风湿热 B. 肺炎
C. 缺铁性贫血 D. 感染性心内膜炎

97. 对确诊意义最大的检查是

- A. CRP B. 胸部 X 线片
C. 血培养 D. 血清铁蛋白

98. 该患者心脏杂音最可能的瓣膜异常是

- A. 主动脉瓣关闭不全 B. 肺动脉瓣关闭不全
C. 二尖瓣关闭不全 D. 三尖瓣关闭不全

(99~101 题共用题干)

患者, 男, 35 岁。3 个月来间断上腹痛, 有时夜间痛醒, 反酸。1 天前黑便 1 次, 无呕血, 但腹痛减轻, 化验大便隐血强阳性。

99. 最可能的诊断是

- A. 慢性胃炎 B. 胃溃疡
C. 十二指肠溃疡 D. 胃癌

100. 为了确定诊断, 首选的检查是

- A. 胃镜检查 B. 钡餐透视
C. 腹部 CT D. 腹部 B 超

101. 若患者出现黑便, 每日出血量最少应超过

- A. 30ml B. 50ml C. 150ml D. 300ml

(102~104 题共用题干)

患者，男，52岁。3个月来乏力，面色苍白。化验血 Hb 62g/L，WBC $3.2 \times 10^9/L$ ，分类 N 66%，L 30%，M 4%，Plt $68 \times 10^9/L$ ，骨髓增生明显活跃，原始粒细胞 4%，成熟粒细胞分叶过多，胞浆内颗粒少，红系有巨幼样变，全片见巨核细胞 54 个，易见小巨核细胞，骨髓铁染色见环状铁粒幼细胞 11%，染色体检查见-7，诊断为 MDS。

102. 按照 FAB 分型，该例 MDS 最可能的类型是

- A. RA B. RAS C. RAEB D. CMML

103. 按照 WHO 新的分型，该例 MDS 最可能的类型是

- A. RA B. RAS C. RCMD D. RAEB

104. 下列治疗方法中，目前该例尚不宜选用的是

- A. 司坦唑醇 B. 联合化疗 C. 全反式维甲酸 D. 红细胞生成素

(105~107 题共用题干)

患者，男，20岁。因大量蛋白尿 1 个月入院，病前无上呼吸道感染史。查体：血压 120/80mmHg，双下肢有明显可凹性水肿。入院后诊断为肾病综合征。为明确病理类型，行肾穿刺活检，电镜下见有广泛的肾小球脏层上皮细胞足突消失。

105. 该患者最可能的病理类型是

- A. 膜性肾病 B. 微小病变型肾病
C. 系膜增生性肾小球肾炎 D. 局灶性节段性肾小球硬化

106. 下列选项中，支持该病理类型的临床特点是

- A. 多见于成年女性 B. 多伴有镜下血尿
C. 表现为典型的肾病综合征 D. 有明显的肾功能减退

107. 首选的治疗方法是

- A. 单用糖皮质激素 B. 单用细胞毒药物
C. 糖皮质激素联合用细胞毒药物 D. 单用环孢素 A

(108~110 题共用题干)

患者，男，55岁。因心悸伴消瘦 1 周来诊。查体：脉率 84 次/分，血压 148/60 mmHg，甲状腺弥漫性 II 度肿大，可闻及血管杂音，肺（-），心率 112 次/分，心律绝对不整，心音强弱不等，腹（-）。

108. 该患者的心律失常类型是

- A. 心房颤动 B. 心房扑动
C. 频发早搏 D. 二度 II 型房室传导阻滞

109. 产生心律失常的最可能原因是

- A. 冠心病 B. 甲亢性心脏病
C. 心肌病 D. 高血压病

110. 为明确诊断，首选的检查是

- A. 超声心动图 B. 心肌酶谱
C. 血 T₃、T₄ 测定 D. 冠状动脉造影

(111~112 题共用题干)

患者，男，60岁。10天前行胃癌根治术，近3天来体温38℃左右，胸片正常，尿常规未见异常，腹部伤口愈合好，已拆线，上腹部B超未见积液，查体发现左小腿微肿，腓肠肌有压痛。

111. 可能的诊断是

- A. 左下肢肌筋膜炎
- B. 左膝关节炎
- C. 左下肢深静脉血栓形成
- D. 左下肢浅静脉炎

112. 对该患者不宜采取的措施是

- A. 手术
- B. 抗凝
- C. 抬高患肢
- D. 多做下肢运动

(113~114 题共用题干)

患者，女，35岁。2天前开始腹痛，先上腹后脐周，有阵发性加剧，伴恶心，呕吐2次胃内容物，腹泻3~5次/日，稀便。查体：体温37.5℃，下腹中部压痛，轻度肌紧张，肠鸣音活跃。化验WBC $12.5 \times 10^9/L$ ，大便常规WBC 2~4。腹部X线平片未见膈下游离气体，中下腹可见数个气液平面。

113. 最可能的诊断是

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性胃肠炎
- C. 急性盆腔炎
- D. 急性肠梗阻

114. 该患者腹部X线平片出现气液平面的原因是

- A. 为肠梗阻的表现
- B. 为腹泻的表现
- C. 有肠麻痹
- D. 盆腔炎症刺激所致

(115~117 题共用题干)

患者，女，30岁。甲亢行甲状腺次全切除术，返回病房2小时后感气憋、心慌，急查见患者面色发绀，呼吸急促，30次/分，血压136/90mmHg，脉率120次/分，伤口部饱满，张力高。

115. 该患者最可能发生的并发症是

- A. 创面出血压迫气管
- B. 喉返神经损伤
- C. 喉上神经损伤
- D. 甲状旁腺损伤

116. 应立即采取的措施是

- A. 急作B超
- B. 立即拆除缝线
- C. 急查血钙
- D. 静脉注射氯化钙20ml

117. 进一步的治疗是

- A. 急送手术室探查止血
- B. 急送手术室修复受损神经
- C. 加强补钙，并予 DT_{10} 治疗
- D. 密切观察

(118~120 题共用题干)

患者，男，52岁。双下肢无力，行走受限2个月。检查：T₉压痛、叩痛明显，脐以下痛

觉减退，下肢不能自主活动，足趾可微动，病理征阳性。X线摄片见 T₉ 椎弓根及椎体后缘显影不清，未见软组织肿大阴影。

118. 对该患者的可能诊断是

- A. T₉ 肿瘤
- B. T₉ 转移瘤
- C. T₉ 结核
- D. T₉ 骨髓炎

119. 为明确诊断，首选的影像学检查是

- A. 胸椎 CT
- B. 胸椎正、侧、斜位 X 线片
- C. 全身骨骼同位素扫描
- D. 胸椎 MRI

120. 如经上述影像学检查仍不能确诊，应进一步采取的检查方法是

- A. 开胸探查取活组织病理
- B. 胸椎后外侧入路探查活检
- C. CT 引导下穿刺活检
- D. B 超引导下穿刺活检

二、B 型题：121~150 小题，每小题 1.5 分，共 45 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 对 α 受体作用强，对 β_1 受体作用较弱，对 β_2 受体作用弱
- B. 对 α 受体作用弱，对 β_1 受体作用较强，对 β_2 受体作用强
- C. 对 α 、 β_1 和 β_2 受体作用都很弱
- D. 对 α 、 β_1 和 β_2 受体作用都很强

121. 去甲肾上腺素作用于肾上腺素能受体的特点是

122. 肾上腺素作用于肾上腺素能受体的特点是

- A. 血管紧张素 II
- B. 血管升压素
- C. 血管活性肠肽
- D. 心房钠尿肽

123. 介导血浆晶体渗透压升高引起渴觉和饮水行为的神经肽是

124. 介导低血容量引起渴觉和饮水行为的神经肽是

- A. 饮大量清水
- B. 静脉滴注大量生理盐水
- C. 饮大量生理盐水
- D. 静脉滴注甘露醇

125. 上述措施中，可引起渗透性利尿的是

126. 上述措施中，可引起水利尿的是

- A. 酪氨酸
- B. 脯氨酸
- C. 半胱氨酸
- D. 缬氨酸

127. 体内经代谢可转变生成牛磺酸的氨基酸是

128. 属营养必需氨基酸的是

- A. SSB
- B. DnaB 蛋白
- C. DNA-pol I
- D. DnaG 蛋白

129. 在 DNA 复制时，能与 DNA 单链结合的蛋白质是

130. 具有催化短链 RNA 分子合成能力的蛋白质是

A. hnRNA B. siRNA C. snoRNA D. 5S rRNA

131. 能对外源侵入的双链 RNA 进行切割的核酸是

132. 能与核内蛋白质组成核蛋白体的是

A. 溃疡长轴与肠道长轴平行

B. 溃疡长轴与肠道长轴垂直

C. 弥漫性小溃疡上有假膜形成

D. 溃疡呈三角烧瓶状

133. 肠结核的病变特点是

134. 肠阿米巴病的病变特点是

A. 急性细菌性痢疾

B. 肠伤寒

C. 急性蜂窝织炎

D. 急性重症肝炎

135. 属于化脓性炎的是

136. 属于肉芽肿性炎的是

A. 空洞性肺结核

B. 细菌性痢疾

C. 小叶性肺炎

D. 钩端螺旋体病

137. 属于出血性炎的是

138. 属于纤维素性炎的是

A. 急性非特异性心包炎

B. 结核性心包炎

C. 肿瘤性心包炎

D. 化脓性心包炎

139. 常胸痛剧烈，持续发热，多数患者可闻及心包摩擦音，见于

140. 多数起病缓，常见发热及胸痛，可闻及心包摩擦音，见于

A. 扑翼样震颤无法引出

B. 轻度性格改变和行为失常

C. 昏睡和精神错乱

D. 意识错乱和睡眠倒错

141. 肝性脑病二期的表现是

142. 肝性脑病四期的表现是

A. TSH

B. rT_3

C. TT_3

D. FT3

143. 对诊断亚临床甲状腺功能异常最有意义的激素测定是

144. 对诊断低 T_3 综合征最有意义的激素测定是

A. 开放性气胸

B. 闭合性气胸

C. 进行性血气胸

D. 张力性气胸

145. 上述疾病中，急需手术探查的是

146. 上述疾病中，可引起纵隔扑动的是

A. 急性胆囊炎

B. 肝内胆管结石

C. 胆囊癌

D. 肝脓肿