

XIANXING DAISHU

线性代数

(第四版)

沈阳工业大学数学教研室 编



东北大学出版社
Northeastern University Press

21 世纪高等学校数学精品教材

线 性 代 数

(第四版)

沈阳工业大学数学教研室 编

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

© 沈阳工业大学数学教研室 2012

图书在版编目 (CIP) 数据

线性代数 / 沈阳工业大学数学教研室编. —4 版. —沈阳:
东北大学出版社, 2012.2

21 世纪高等学校精品数学教材

ISBN 978-7-5517-0111-2

I. ①线… II. ①沈… III. ①线性代数—高等学校—教材
IV. ①O151.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 018577 号

出版者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024—83687331 (市场部) 83680267 (社务室)

传真: 024—83680180 (市场部) 83680265 (社务室)

E-mail: neuph @ neupress.com

http: // www. neupress. com

印刷者: 抚顺光辉彩色印刷有限公司

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 140mm × 203mm

印 张: 8.125

字 数: 212 千字

出版时间: 2001 年 2 月第 1 版

2012 年 2 月第 4 版

印刷时间: 2012 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 郭爱民

责任校对: 张淑萍

封面设计: 唯 美

责任出版: 唐每志

ISBN 978-7-5517-0111-2

定 价: 18.00 元

第四版前言

由沈阳工业大学数学教研室编写的线性代数教材，分别于2004年和2006年进行过两次修订，一直在作为理工科高等学校线性代数课程的主要教材使用。现在距离上一次修订已有三年多时间。一些高校教师及学生还是比较认可该教材，认为其内容编排合理，取舍适度，阐述清楚，过度自然，比较适合理工科学生的特点。但是，考虑到计算机等学科对线性代数课程要求稍高一些，教学时数稍多一些，本教材有必要进一步完善。因此，在广泛征求任课教师意见的基础上，决定对教材进行第三次修订。本次修订工作主要体现以下几点：

1. 对一些例题地耗了修订，增加了一些难度稍大一点的例题，供任课教师和学生取舍，以满足不同学科对线性代数课程的不同要求。

2. 为满足计算机等学科的要求，对向量空间、线性映射（线性变换）的内容进行了扩充，增加了线性变换的矩阵表示、线性变换的运算等内容。

3. 考虑知识的应用与综合，对二次型、正定二次型的内容进行了扩充。

4. 考虑学时等因素，本次修订将“投入产出数学模型”（加*号）作为选学的内容。

尽管又进行了一次修订，但本书还可能存在不当之处，恳请读者指正，作者在此深表谢意。

沈阳工业大学数学教研室

2012年1月

出版说明

线性代数是工科高等学校的一门重要基础课，是离散量的基础，对于培养学生的抽象思维与逻辑推理能力起着重要作用。线性代数的主体——矩阵理论与矩阵计算——又是工程科学中用得非常广泛的基础性工具。这门课程教学质量的高低直接影响着人才的培养质量，影响着学生整体科学知识的结构与水平。一本教材的质量又是这门课程教学质量的基础。长期以来，沈阳工业大学数学教研室一些教师精心组织线性代数课程的教学，认真钻研教材，潜心研究教学内容与教学方法，并有一些独特的见解。本书就是在此基础上，经几位教师集体讨论，分工编写而成的。本书在不失理论的正确性与逻辑的严密性的前提下，力求体现教师易教、学生易学、深入浅出、适度综合的原则，内容体系作了较大调整，主要体现在以下几点：

1. 矩阵概念与运算提前，由简单的线性变换及线性方程组引出矩阵，由矩阵利用递推方法定义行列式，适度削弱行列式的技巧计算。

2. 以矩阵的秩、逆矩阵、矩阵的初等变换、分块矩阵为主要内容作为第2章，为后面的讨论提供工具。

3. 在向量空间一章中, 引进基、过渡矩阵、线性变换及矩阵表示、子空间等概念、理论及运算, 使之成为必修内容。

4. 适度削弱线性相关与线性无关的理论探讨, 使其与矩阵的秩相结合, 重点学习利用矩阵的秩、矩阵的初等变换来判定向量组的线性相关与线性无关、求向量组的最大线性无关组等。

5. 线性方程组一章介绍矩阵表示与矩阵解法, 强调向量组的线性相关性、矩阵的秩与线性方程组的解之间的内在联系。

6. 以矩阵的特征值、特征向量、相似矩阵、矩阵对角化、正交矩阵等内容为主, 编排为第 5 章。适度削弱二次型的理论, 强调与矩阵结合。

7. 增加投入产出数学模型的内容。

8. 考虑篇幅、学时等因素, 一些表达较繁、难度较大的定理证明作为附录放在各章之后, 供有兴趣的读者阅读。

本书编写工作涉及多位数学教师, 总体思路与内容体系框架由王文涛提出, 并主持全书编写工作, 统纂全部书稿。具体分工为: 石鸿雁编写第 1 章, 宋桂荣编写第 2 章, 卢建伟编写第 3 章, 李宝家编写第 4 章, 张颖编写第 5 章, 焉德军编写第 6 章, 各章附录由张洪编写。原数学教研室主任胡仁庠老师审阅了全部书稿, 并提出了许多宝贵意见, 在此表示感谢。数学教研室青年教师张翼、李媛在此书出版过程中帮助修改和校稿, 在此向她们表示谢意。

由于编者水平所限, 加之时间仓促, 书中疏漏之处一定不少, 恳请读者批评指正。

沈阳工业大学数学教研室线性代数编写组

2000 年 10 月

修订二版前言

由沈阳工业大学数学教研室编写的线性代数教材经过近四年的试用，大家认为教材的主体结构合理，逻辑严谨，内容取舍符合教学大纲要求，编排有特色，建议进一步修订后继续使用。为此，我们组织了多年使用该教材的一些教师进行了认真的讨论，征求修改意见，并由主编王文涛执笔进行修改。具体修改情况如下。

考虑全国硕士研究生入学考试试题中反序数的概念可能出现，故本次修订时增加了反序数的概念和用反序数定义行列式的内容，作为附录放在第一章之后，供教师在教学中使用，也可供读者参考。

对第三章向量空间与线性变换的内容及编排作了一些调整，主要考虑内容的取舍方便，逻辑关系与内容的衔接，进一步体现联贯性、发展性，方便教师教学，也有利于学生学习。

对第四章也作了适当修改，主要调整了线性方程组有解条件与求解过程中的一些叙述方法，使问题的思路更清晰。

尽管进行了一次修订，不当之处还可能存在，而且修改之处也不一定合适，恳请读者批评指正。

沈阳工业大学数学教研室

2004年7月

第三版前言

由沈阳工业大学数学教研室编写的线性代数教材已使用了近6年，中间经过一次修订。一些高校教师及学生都比较认可该教材，认为其主体结构合理，内容取舍和衔接处理比较好，编排有特色，非常合理理工科高等学校教学使用。但考虑到不同层次读者的需求，特别是报考硕士研究生的学生的需求，本书的例题及习题的类型还应进一步拓宽，难度也应适当提高。为此，我们组织了第二次修订，主要体现以下几点：

第一，补充了部分例题，使例题的类型和覆盖面进一步拓展，有利于提高学生分析与解决问题的能力。

第二，增加了习题量，并将习题分为两个层次：基本题主要面向本科教学，而补充题为适应更高层次及报考研究生的同学使用。

第三，为了不过多增加读者的负担，对一些难度较大的补充题附加了提示或简答，供读者参考。

在本次修订过程中，沈阳工业大学教学教研室青年教师赵雪梅帮助校正书稿，在此深表谢意。

尽管进行了两次修订，本书还可能存在不当之处。恳请读者给予指正，作者这里谨致谢意。

沈阳工业大学数学教研室

2006年7月



第四版前言
出版说明
修订二版前言
第三版前言

第 1 章 矩阵与行列式	1
1.1 矩阵及其运算	1
1.2 行列式及其性质.....	19
1.3 行列式计算.....	35
1.4 克莱姆 (Cramer) 法则.....	43
附录 A 反序数与行列式定义	49
习题 1	61
第 2 章 矩阵的秩与逆矩阵	69
2.1 矩阵的秩.....	69
2.2 逆矩阵.....	72
2.3 初等变换与初等矩阵.....	79
2.4 矩阵的分块.....	90
附录 B 2.2 节定理 1 的证明	97
习题 2	102
第 3 章 向量空间与线性变换	108
3.1 向量及其运算	108
3.2 向量组的线性相关与线性无关	110

3.3	向量组的秩	115
3.4	向量空间与基	123
3.5	过渡矩阵	126
3.6	线性变换	132
3.7	子空间	142
附录 C	3.3 节定理 1 的证明	146
	习题 3	149
第 4 章	线性方程组	155
4.1	基本概念及有解的条件	155
4.2	齐次线性方程组 $AX = 0$	158
4.3	非齐次线性方程组 $AX = b$	164
	习题 4	170
第 5 章	矩阵的特征值问题与二次型	173
5.1	矩阵的特征值与特征向量	173
5.2	相似矩阵与矩阵对角化	180
5.3	二次型及其标准形	193
5.4	正定二次型	202
附录 D	第 5 章定理的补充证明	205
	习题 5	212
第 6 章	投入产出数学模型*	216
6.1	价值型投入产出模型	216
6.2	直接消耗系数和平衡方程组的解	219
6.3	完全消耗系数及投入产出法应用举例	226
	习题 6	230
	习题答案与提示	232

第 1 章 矩阵与行列式

矩阵和行列式是线性代数的重要组成部分. 矩阵是从许多实际问题的研究中抽象出来的一个数学概念, 它的概念与运算法则是研究近代数学以及许多应用学科不可缺少的工具. 早在 18 世纪, 为了寻求含有 n 个未知数、 n 个方程的线性方程组一般解的公式, Leibniz 和 Cramer 首先引进了行列式的概念. 如今, 行列式不仅应用于数学本身, 而且在其他一些科学分支都有着广泛的应用. 本章从线性方程组入手, 引出矩阵的概念, 介绍矩阵的基本运算, 进而用递推的方式给出矩阵的行列式的定义, 介绍行列式的性质及其计算, 最后给出求解一类非齐次线性方程组的 Cramer 法则.

1.1 矩阵及其运算

1.1.1 线性方程组与矩阵

在实际工作中, 常常把一些数据用矩形表来表示.

【例 1-1】 在物资调运中, 某类物资有 3 个产地和 5 个销售地, 它们的调运情况可在表 1-1 中反映.

如果用 a_{ij} ($i=1, 2, 3; j=1, 2, 3, 4, 5$) 表示从第 i 个产地运往第 j 个销售地的物资吨数 (如 $a_{12}=3, a_{24}=0, a_{35}=6$), 这样就能将调运方案表简写成一个三行五列的矩形表

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 & 7 & 5 \\ 8 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ 5 & 4 & 0 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

表 1-1 调运方案表

调运吨数 产地	销地	I	II	III	IV	V
		甲	0	3	4	7
乙		8	2	3	0	2
丙		5	4	0	6	6

【例 1-2】 设有线性方程组

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned} \right\} \quad (1-1)$$

方程组(1-1)是否有解, 有多少解, 这个问题显然只与方程组(1-1)中的系数和常数项有关, 因此有必要来考查这些系数之间的关系. 可以把这些系数排成如下的一个矩形表

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

同样, 也可以把系数和常数项一起排成下表

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

这种形状的表在数学上叫做**矩阵**。

定义 1 由 $m \times n$ 个数 a_{ij} ($i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$) 排成的 m 行 n 列的数表

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (1-2)$$

称为 m 行 n 列矩阵，简称为 $m \times n$ 矩阵。这 $m \times n$ 个数称为矩阵的元素， a_{ij} 叫做矩阵的第 i 行第 j 列元素。元素是实数的矩阵称为**实矩阵**，元素是复数的矩阵称为**复矩阵**（本书中只讨论实矩阵）。矩阵常用 A, B, C 等表示，如

$$A = (a_{ij}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$m \times n$ 矩阵也可简记为 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 或 $A = (a_{ij})$ ，或记为 $A_{m \times n}$ 。

当 $m = n$ 时， A 称为 n 阶方阵；

当 $m = 1$ 时， A 为 $1 \times n$ 矩阵，即

$$\mathbf{A} = [a_{11} \quad a_{12} \quad \cdots \quad a_{1n}],$$

\mathbf{A} 称为行矩阵;

当 $n=1$ 时, \mathbf{A} 为 $m \times 1$ 矩阵, 即

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix},$$

\mathbf{A} 称为列矩阵.

当 $a_{ij}=0 (i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$ 时, \mathbf{A} 称为零矩阵, 记作 \mathbf{O} .

定义 2 设有两个矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m \times n}$, 如果 $a_{ij} = b_{ij} (i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$, 则称矩阵 \mathbf{A} 与矩阵 \mathbf{B} 相等, 记作 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

【例 1-3】 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & -1 & 3 \\ 0 & b & -4 \\ -5 & 8 & 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & c \\ 0 & 1 & -4 \\ d & 8 & 7 \end{bmatrix}$,

且 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$, 求 a, b, c, d 的值.

【解】 由于 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$, 故由定义 2 得

$$\begin{bmatrix} a & -1 & 3 \\ 0 & b & -4 \\ -5 & 8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & c \\ 0 & 1 & -4 \\ d & 8 & 7 \end{bmatrix}.$$

于是有 $a = -2, b = 1, c = 3, d = -5$.

1.1.2 矩阵的运算

矩阵的运算是指矩阵的加法、数乘矩阵、矩阵乘法及矩阵的转置等运算. 它们在线性代数所讨论的一些问题中有着广泛的应用.

(1) 矩阵的加法

定义 3 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$, 则矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

称为 A 与 B 的和, 记作 $A + B$.

不难看出, 只有行数相同、列数也相同的矩阵才能进行加法运算.

矩阵的加法满足下列运算规律(设 A, B, C, O 都是 $m \times n$ 矩阵):

- ①交换律 $A + B = B + A$;
- ②结合律 $(A + B) + C = A + (B + C)$;
- ③零矩阵满足 $A + O = A$.

设矩阵 $A = (a_{ij})$, 记 $-A = (-a_{ij})$, $-A$ 称为 A 的负矩阵. 由此可以定义矩阵的减法:

$$A - B = A + (-B).$$

(2) 数乘矩阵

定义 4 设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, λ 为一常数, 则称矩阵

$$\begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

为 λ 与矩阵 A 的乘积, 记为 λA .

由定义不难验证, 数乘矩阵满足下面的运算规律(设 A, B 为 $m \times n$ 矩阵, λ, μ 为常数):

- ① 数对矩阵的分配律 $\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$;
- ② 矩阵对数的分配律 $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$;
- ③ 数与矩阵的结合律 $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A) = \mu(\lambda A)$.

【例 1-4】 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & 7 & 9 \\ 5 & 4 & -3 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 5 & -4 & 4 \\ 5 & 1 & 9 & 7 \\ 3 & -2 & 1 & 8 \end{bmatrix},$$

且 $A + 2X = B$, 求矩阵 X .

【解】 由 $A + 2X = B$, 得 $X = \frac{1}{2}(B - A)$.

又由于
$$B - A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -6 & 4 \\ 4 & -4 & 2 & -2 \\ -2 & -6 & 4 & 2 \end{bmatrix},$$

从而
$$X = \frac{1}{2}(B - A) = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 & -1 \\ -1 & -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

(3) 矩阵与矩阵的乘法

给出定义之前, 先考查一个实际问题: 假设某地区有三家工厂

生产甲、乙两种产品，矩阵 \mathbf{A} 表示各工厂生产各种产品的年产量，矩阵 \mathbf{B} 表示各种产品的单位价格和单位利润，即

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}.$$

其中 a_{ij} ($i=1, 2, 3; j=1, 2$) 分别表示第 i 家工厂生产第 j 种产品的产量 ($j=1$ 表示甲种产品, $j=2$ 表示乙种产品), b_{i1} ($i=1, 2$) 分别表示甲、乙两种产品的单位价格, b_{i2} ($i=1, 2$) 分别表示甲、乙两种产品的单位利润, 则第 i 家工厂生产甲、乙两种产品的总收入 c_{i1} ($i=1, 2, 3$) 和总利润 c_{i2} ($i=1, 2, 3$) 分别为

$$\begin{cases} c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} \\ c_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} \\ c_{31} = a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} \end{cases} \quad \begin{cases} c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ c_{22} = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \\ c_{32} = a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} \end{cases}$$

总收入与总利润用矩阵可表示为

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} \end{bmatrix}.$$

可以看出，矩阵 \mathbf{C} 的第 i 行第 j 列元素恰为矩阵 \mathbf{A} 的第 i 行元素与矩阵 \mathbf{B} 的第 j 列对应元素乘积之和。这里把矩阵 \mathbf{C} 定义为矩阵 \mathbf{A} 与 \mathbf{B} 的乘积。

定义 5 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times s}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{s \times n}$, 则称矩阵 $\mathbf{C} = (c_{ij})_{m \times n}$ 为矩阵 \mathbf{A} 与矩阵 \mathbf{B} 的乘积, 记为