

全国护士执业资格考试系列丛书

2013

全国护士执业资格考试 全真模拟及精解

北京大学医学部专家组 编写

免费赠送30元
网上学习费用

- ✓ 全真模拟改革后考试形式
- ✓ 网络课程配套学习



北京大学医学出版社

2013 全国护士执业资格考试全真模拟试题

2013

全国护士执业资格考试 全真模拟题及精解

全国护士执业资格考试大纲指定教材

- ★ 全国护士执业资格考试大纲指定教材
- ★ 全国护士执业资格考试大纲指定教材



中国医药出版社

全国护士执业资格考试系列丛书

全国护士执业资格考试 全真模拟及精解

北京大学医学部专家组 编写

北京大学医学出版社

QUANGUO HUSHI ZHIYE ZIGE KAOSHI QUANZHEN MONI JI JINGJIE

图书在版编目 (CIP) 数据

全国护士执业资格考试全真模拟及精解/北京大学
医学部专家组编写. —北京: 北京大学医学出版社,
2011. 11

(全国护士执业资格考试系列丛书)

ISBN 978-7-5659-0280-2

I. ①全… II. ①北… III. ①护士—资格考试—题解
IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 199448 号

全国护士执业资格考试全真模拟及精解

编 写: 北京大学医学部专家组

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E - mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 北京东方圣雅印刷有限公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 药 蓉 刘 燕 董采萱 责任校对: 王怀玲 责任印制: 张京生

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 11.25 字数: 283 千字

版 次: 2011 年 11 月第 1 版 2012 年 8 月修订 2012 年 8 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5659-0280-2

定 价: 27.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

出版说明

从 2011 年起全国卫生专业技术资格考试专业目录取消护理学（初级士，原专业代码 003），报考该专业的考生必须参加全国护士执业资格考试。

全国护士执业资格考试的考试内容、考试形式较以往发生了巨大变化：

1. 考试内容不再以学科为主线编写，而是以系统、疾病为中心，综合各学科内容来编写。
2. 增强了对社会医学、人文知识等（例如法律法规与护理管理、护理伦理、人际沟通知识、生命发展保健等）的考核。
3. 考试分专业实务和实践能力两个科目，每个科目题量为 120～160 道（2012 年护士执业资格考试每个科目为 136 题），用纸笔作答方式进行，考试时间 1 天。
4. 考试试题全部采用选择题，试题题型主要采用包含临床背景的题型（A₂、A₃、A₄ 型题），辅以少量考查概念的 A₁ 型题（详见题型说明及样例）。
5. 采用计算机阅卷评分，一次考试通过两个科目为考试成绩合格。

根据新版考试大纲，北京大学医学出版社全新推出《全国护士执业资格考试系列丛书》。

〔经典系列〕

◎《全国护士执业资格考试应试指导》紧扣最新大纲，以大纲细目为框架，全面覆盖大纲内容。

◎《全国护士执业资格考试习题集》由习题组成，习题质量高，题量丰富，涵盖大纲全部考点。

◎《全国护士执业资格考试全真模拟及精解》全真模拟考试环境，使考生熟悉答题思路。答案后附有解析，帮助考生了解考题的难易度和考点分布。

◎《全国护士执业资格考试历年考题汇编及精解》汇总历年考试真题，专家解析。根据真题会重复出现的规律反复练习，可帮助考生了解命题规律，提高应试技巧。

〔双核系列〕

◎《全国护士执业资格考试核心考点》精选近千个核心考点，并附有“考点串联”和“名师点拨”板块，总结了作者多年的教学和考前培训经验。

◎《全国护士执业资格考试核心 2000 题》按照考试形式分卷编写，精选两千多道试题，试题后直接附答案及解析，便于考生有针对性地复习。

目 录

护士执业资格考试全真模拟试卷（一）	1
全真模拟试卷（一）答案及精解	33
护士执业资格考试全真模拟试卷（二）	59
全真模拟试卷（二）答案及精解	91
护士执业资格考试全真模拟试卷（三）	117
全真模拟试卷（三）答案及精解	149

护士执业资格考试

全真模拟试卷（一）

专业实务

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

1. 关于护理程序的论述，以下正确的是
 - A. 是一种技术操作的程序
 - B. 是一种护理工作的简化形式
 - C. 是一种护理工作的分工类型
 - D. 是一种护理活动的循环过程
 - E. 是一种系统地解决护理问题的方法
2. 根据我国《老年人权益保障法》规定，老年人的界定是指年龄大于和等于
 - A. 45
 - B. 50
 - C. 55
 - D. 60
 - E. 65
3. 全身麻醉术后未清醒的患者采用去枕仰卧位的目的是
 - A. 有利于静脉回流
 - B. 防止颅内压降低
 - C. 防止呕吐物流入气管
 - D. 减轻伤口疼痛
 - E. 减少局部出血
4. 急性左心衰竭的患者，应采用的体位是
 - A. 去枕仰卧位
 - B. 中凹位
 - C. 左侧卧位
 - D. 半坐卧位
 - E. 右侧卧位
5. 医院感染发生的对象不包括
 - A. 患者
 - B. 医生
 - C. 护士
 - D. 探视者
 - E. 传染病院周边的居民
6. 不能杀灭芽胞的化学消毒剂是
 - A. 环氧乙烷
 - B. 0.2%聚维酮碘溶液
 - C. 过氧乙酸
 - D. 40%甲醛
 - E. 2%戊二醛
7. 1%~3%过氧化氢溶液用于口腔护理时，下列正确的是
 - A. 用于口腔 pH 为碱性时
 - B. 遇有机物时，可释放新生氧抗菌
 - C. 用于真菌感染
 - D. 可消除口臭，轻微抑菌
 - E. 用于铜绿假单胞菌感染
8. 正常成人每分钟呼吸次数为
 - A. 18~20 次
 - B. 12~24 次
 - C. 16~20 次
 - D. 16~24 次
 - E. 18~24 次
9. 下列关于巨幼细胞贫血的描述，不正确的是
 - A. 是一种小细胞低色素性贫血
 - B. 人体中叶酸、维生素 B₁₂ 全部由食物供给
 - C. 由叶酸缺乏引起者最多见
 - D. 由维生素 B₁₂ 缺乏引起者多为内因子缺乏所致
 - E. 人体内贮存的维生素 B₁₂ 可供人体使用 3~6 年
10. 下列不可使用冷疗的病情是

- A. 牙痛
B. 中暑
C. 压疮
D. 鼻出血
E. 头皮下血肿的早期
11. 剧毒药和麻醉药最重要的保管原则是
A. 药名用中、外文对照
B. 应加锁, 专人管理并认真交班
C. 装密封瓶中保存, 放于阴凉处
D. 与内服药、外用药分别放置
E. 药瓶上应有明显标签, 用黑色边
12. 表示临睡前的外文缩写是
A. hs
B. ac
C. pc
D. DC
E. 12n
13. 手可接触无菌注射器及针头的部分是
A. 针尖、空筒
B. 活塞柄、针梗
C. 乳头、针栓
D. 针梗、活塞轴
E. 针栓、活塞柄
14. 24h 尿液标本中加入浓盐酸的目的是
A. 防止细菌污染
B. 防止尿液挥发
C. 防止尿液变色
D. 保持尿液的酸性环境
E. 固定尿中有机成分
15. 以兴奋性增高为主的高级神经中枢急性失调状态称为
A. 意识模糊
B. 嗜睡
C. 谵妄
D. 昏睡
E. 昏迷
16. 下列有关生物学死亡期的说法不正确的是
A. 生物学死亡期是死亡的最后阶段
B. 中枢神经系统出现不可逆变化
C. 若及时抢救, 机体仍有可能复活
D. 会出现尸冷、尸斑和尸僵
E. 晚期可出现尸体腐败
17. 有关病案的保管, 下列哪项不妥
A. 要求整洁
B. 不能撕毁
C. 不能擅自携出病区
D. 不能随意拆散
E. 患者希望查看, 护士应满足他的要求
18. 不属于医嘱内容的是
A. 给药途径
B. 护理级别
C. 隔离种类
D. 药物剂量
E. 测生命体征的方法
19. 下列关于精神症状的特点错误的是
A. 症状的出现可受患者意志的控制
B. 症状的消失不受患者意志的控制
C. 症状的内容与周围客观环境不相称
D. 症状的程度会受到个体因素及环境因素的影响
E. 症状会给患者带来不同程度的社会功能损害
20. 阿尔茨海默病主要表现为
A. 遗忘综合征
B. 痴呆综合征
C. 谵妄综合征
D. 焦虑综合征
E. 抑郁综合征
21. 中医论治的主要依据是
A. 疾病的原因
B. 病变的部位
C. 疾病的性质
D. 疾病的邪正
E. 辨证的结果

22. 寒邪的特点是
- A. 其性凝滞
 - B. 易致肿疡
 - C. 生风动血
 - D. 善行而数变
 - E. 为百病之长
23. 在《传染病防治法》中将传染性非典型肺炎列为传染病的级别为
- A. 甲类
 - B. 乙类
 - C. 乙类传染病甲类管理
 - D. 丙类
 - E. 未分类
24. 造成患者死亡、重度残疾的医疗事故的级别是
- A. 一级
 - B. 二级
 - C. 三级
 - D. 四级
 - E. 五级
25. 护生小王是申请注册的护理专业应届毕业生, 她应在教学或综合医院完成临床实习, 其时限至少为
- A. 6个月
 - B. 8个月
 - C. 10个月
 - D. 12个月
 - E. 13个月
26. 疫苗接种前, 医务人员应告知受种者或监护人的内容中除外
- A. 接种疫苗的品种
 - B. 接种疫苗的作用、禁忌、不良反应以及注意事项
 - C. 询问受种者的健康状况
 - D. 是否有接种禁忌
 - E. 疫苗的价格
27. 有关青春期保健的内容, 不包括
- A. 开展青春期卫生宣传
 - B. 开展青春期常见病的防治
 - C. 传授女性生殖器官解剖和生理相关知识
 - D. 进行婚前检查教育
 - E. 进行有关性知识教育
28. 功能制护理的优点不包括
- A. 护理工作的整体性强
 - B. 节省护士人力
 - C. 节约护理经费
 - D. 节约护士时间
 - E. 提高工作效率
29. 下列关于人际沟通的特点描述正确的是
- A. 人际沟通过程中, 只有信息的发出者是积极的主体
 - B. 人际沟通有时可以不受情境因素的制约
 - C. 人际沟通就是一种信息传输的过程
 - D. 人际沟通是以改变对方思想和行为为目的的
 - E. 在人际沟通中, 沟通双方可以有不同的编码与译码规则
30. 在人际沟通的不同层次中, 对陈述事实的沟通描述正确的是
- A. 在沟通双方已建立信任感时, 多采用此方式
 - B. 多加入个人意见
 - C. 不利于护士了解患者的情况
 - D. 主要是让患者叙述, 护士最好不要用语言或非语言行为影响患者的陈述
 - E. 双方分享对事件的感觉
31. 下列属于闭合式提问的是
- A. 经过这两天的治疗, 您今天感觉好多了吧?
 - B. 您是河北人吧?
 - C. 您为什么不愿意选择手术治疗呢?
 - D. 您是在哪里做的检查? 检查结果如何?

- E. 服药后, 您觉得怎么样了?
32. 共情的核心是
- A. 理解
 - B. 同情
 - C. 关心
 - D. 帮助
 - E. 支持
33. 血栓闭塞性脉管炎病变主要位于
- A. 大、中动脉
 - B. 大、小静脉
 - C. 中、小动静脉, 以动脉为主
 - D. 中、小动静脉, 以静脉为主
 - E. 小动静脉, 不发生于中动静脉
34. 损伤程度最轻的脊髓损伤病理类型是
- A. 脊髓震荡
 - B. 脊髓挫伤
 - C. 脊髓受压
 - D. 脊髓断裂
 - E. 马尾断裂
35. 绞窄性肠梗阻和单纯性肠梗阻的主要区别在于
- A. 发病急骤程度
 - B. 肠腔内容物通过受阻程度
 - C. 肠管血运障碍程度
 - D. 肠管梗阻部位
 - E. 肠管扩张程度
36. 属于闭合性损伤的是
- A. 擦伤
 - B. 爆震伤
 - C. 撕脱伤
 - D. 火器伤
 - E. 裂伤
37. 应用破伤风抗毒素的目的是
- A. 杀死破伤风杆菌
 - B. 中和血液中的游离毒素
 - C. 抑制破伤风杆菌生长
 - D. 中和与神经结合的毒素
 - E. 清除毒素来源
38. 新生儿化脓性脑膜炎最常见的病原菌是
- A. 脑膜炎双球菌
 - B. 肺炎链球菌
 - C. 流感嗜血杆菌
 - D. 大肠埃希菌
 - E. β 型溶血性链球菌
39. 小儿生长发育最为迅速的一期是
- A. 围生期
 - B. 学龄期
 - C. 婴儿期
 - D. 幼儿期
 - E. 学龄前期
40. 急性肾小球肾炎前驱感染最常见的病原体是
- A. 金黄色葡萄球菌
 - B. 大肠埃希菌
 - C. 肺炎链球菌
 - D. A 组 β 型溶血性链球菌
 - E. 柯萨奇病毒
41. 中性粒细胞与淋巴细胞比例两次相等的年龄是
- A. 4~6 天, 4~6 月
 - B. 4~6 周, 4~6 岁
 - C. 4~6 天, 4~6 岁
 - D. 4~6 月, 4~6 岁
 - E. 4~6 周, 7~8 岁
42. 慢性宫颈炎病理变化中, 最常见的是
- A. 宫颈糜烂
 - B. 宫颈息肉
 - C. 宫颈肥大
 - D. 宫颈腺体囊肿
 - E. 宫颈管炎
43. 滴虫性阴道炎直接传染的方式是
- A. 性交
 - B. 公共浴池
 - C. 游泳池
 - D. 坐式马桶
 - E. 妇科检查器具

44. 有关正常育龄妇女体内孕激素功能的描述, 不正确的是
- A. 促进乳腺腺泡发育
 - B. 促进阴道上皮细胞脱落
 - C. 有升高体温的作用
 - D. 促使子宫内膜增生
 - E. 使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜
45. 护士应当帮助患者了解自己的病情、理解护理程序的程序及意义, 这是尊重患者的
- A. 健康权
 - B. 隐私权
 - C. 姓名权
 - D. 否决权
 - E. 知情同意权
46. 对于大多数传染病来说, 最多见的表现是
- A. 病原体被清除
 - B. 隐性感染
 - C. 显性感染
 - D. 病原携带状态
 - E. 潜伏性感染
47. 营养心脏的血管是
- A. 主动脉
 - B. 冠状动脉
 - C. 肺动脉
 - D. 肺静脉
 - E. 升主动脉
48. 肝硬化患者出现全血细胞减少, 最主要的原因是
- A. 功能性肾衰竭
 - B. 营养吸收障碍
 - C. 上消化道大量出血
 - D. 脾功能亢进
 - E. 凝血因子合成减少
49. 患者李某, 女, 75岁, 胃癌晚期, 表现为神志不清, 肌张力消失, 心音低钝, 脉搏细弱, 血压 80/40mmHg, 呈间歇呼吸。患者此时处于
- A. 濒死期
 - B. 临床死亡期
 - C. 生物学死亡期
 - D. 生理学死亡期
 - E. 脑死亡期
50. 患者张某, 男, 50岁, 肺癌广泛转移, 病情日趋恶化, 患者常向家属发脾气, 对医务人员工作不满, 此时的心理反应属于
- A. 接受期
 - B. 忧郁期
 - C. 协议期
 - D. 愤怒期
 - E. 否认期
51. 张女士阑尾炎手术后康复出院, 对于出院患者床单位处理错误的是
- A. 污被服撤下, 送洗
 - B. 被褥曝晒 6 小时
 - C. 病床、床旁桌椅用洗涤剂擦洗
 - D. 脸盆、痰杯用消毒液浸泡
 - E. 铺备用床
52. 刘女士, 78岁, 因呼吸困难, 不能平卧, 家属给患者吸氧后前来就诊。门诊护士应让该患者
- A. 提前就诊
 - B. 提供各种检查记录
 - C. 到隔离门诊就诊
 - D. 按挂号顺序就诊
 - E. 立即送抢救室抢救
53. 患者刘某, 感染破伤风, 神志清楚, 全身肌肉阵发性痉挛、抽搐, 所住病室环境下列哪项不符合病情要求
- A. 室温 18~20℃
 - B. 相对湿度 50%~60%
 - C. 门、椅脚钉橡皮垫
 - D. 保持病室光线充足

- E. 开门、关门动作轻
54. 患者，女性，36岁，体重80公斤，意识清楚，为择期剖宫产者，准备去手术室时，应选择
- 轮椅运送
 - 平车挪动法
 - 平车单人搬运法
 - 平车两人或三人搬运法
 - 平车四人搬运法
55. 王某，男，54岁，中毒性细菌性痢疾，体温39℃，脉搏124次/分，血压80/50mmHg，患者最适宜的卧位是
- 平卧位，头偏向一侧
 - 头高脚低位
 - 头低脚高位
 - 中凹位
 - 侧卧位
56. 某患者，发热、咳嗽伴病侧胸痛，诊断为结核性胸膜炎，有大量胸腔积液，其应取的体位是
- 头低足高位，头偏向一侧
 - 患侧卧位
 - 平卧位，头偏向一侧
 - 端坐卧位
 - 去枕仰卧位
57. 于先生，建筑工人，左下肢外伤后未得到及时、正确的处理而导致感染破伤风。为该患者更换敷料后，污染敷料的处理方法是
- 高压灭菌后再清洗
 - 过氧乙酸浸泡后清洗
 - 送焚烧炉焚烧
 - 丢入污物桶后再集中处理
 - 在日光下曝晒后再清洗
58. 护士小李在为患者张某行导尿术时，发现手套破裂，她应该
- 用无菌纱布将破裂处包裹好
 - 用无菌治疗巾包裹手指操作
 - 立即更换无菌手套
 - 再套上一双新的无菌手套
 - 用乙醇棉球擦拭破裂处
59. 门诊换药室的护士小王正在用无菌持物钳夹取物品，她的操作方法中错误的是
- 检查发现无菌持物钳使用未超过24小时，可以继续使用
 - 用无菌持物钳夹取无菌油纱布
 - 到远处取物时，将无菌持物钳和无菌容器一并拿到要取物品处取物
 - 取放无菌持物钳时，钳端闭合
 - 使用时持物钳钳端向下
60. 患者，男，75岁，因心力衰竭绝对卧床，一日，发现骶尾部皮肤红、肿，起小水疱，皮下有硬结，有时有渗液，患者诉疼痛，患者此时的情况最可能是
- 压疮淤血红润期
 - 压疮炎症浸润期
 - 压疮浅度溃疡期
 - 局部皮肤感染
 - 压疮前期
61. 患者，男，19岁，踢足球时不慎摔倒至左侧胫骨骨折，经石膏固定1周后，患处出现压疮，分析其最主要的原因是
- 石膏透气性差，患处出汗多，汗液刺激皮肤
 - 石膏过松
 - 石膏固定后患者卧床时间长
 - 运动减少致食欲下降、营养不良
 - 石膏衬垫不平整
62. 患者，男，63岁，患肺炎链球菌肺炎，口温40℃，脉搏120次/分，口唇干燥，下列护理措施中不妥的是
- 卧床休息
 - 每4小时测量一次体温
 - 鼓励饮水
 - 冰袋放于头顶、足底处
 - 每日口腔护理2~3次

63. 某单位组织体检,在测量血压时,护士回答职员关于血压方面的咨询,下列说法错误的是
- A. 运动、恐惧时血压升高
 - B. 血压在傍晚时较清晨时低
 - C. 右上肢血压高于左上肢血压
 - D. 中年以前女性血压比男性血压低
 - E. 下肢收缩压一般比上肢收缩压高
64. 李先生因消化道溃疡需做大便隐血试验,试验期内可进食
- A. 动物血
 - B. 豆制品
 - C. 绿色蔬菜
 - D. 肉类
 - E. 动物内脏
65. 李先生,严重烧伤,需记录出入液量,下列不需要计入排出量的内容是
- A. 呕吐物
 - B. 胸水和腹水
 - C. 胃肠减压液
 - D. 胆汁
 - E. 汗液
66. 某术后患者,医嘱为流质饮食,下列不符合其饮食原则的是
- A. 一切食物成流体
 - B. 无刺激性
 - C. 易于吞咽和消化
 - D. 少食多餐
 - E. 烹调时不放食盐
67. 患者,男性,36岁,建筑工人,在工地被钢筋砸伤头部,致脑外伤并脑水肿。此时宜采用的措施是
- A. 冰袋
 - B. 冰槽
 - C. 热水袋
 - D. 热水坐浴
 - E. 红外线照射
68. 产妇张某,分娩时会阴部撕伤,局部红、肿、热、痛,给予湿热敷,操作时应特别注意
- A. 床单上铺橡胶中单
 - B. 每5分钟更换敷料一次
 - C. 执行无菌操作
 - D. 水温调节适度
 - E. 伤口周围涂凡士林
69. 患者,男性,65岁,腹泻,下列措施不当的是
- A. 嘱患者增加活动
 - B. 遵医嘱给予止泻药
 - C. 给予流质或半流质饮食
 - D. 保持肛周清洁,并涂油膏
 - E. 观察并记录排便次数和性状
70. 王先生,38岁,患有慢性细菌性痢疾。遵医嘱行保留灌肠,措施正确的是
- A. 应在晚间睡眠前灌入
 - B. 灌肠时取右侧卧位
 - C. 肛管插入7~10cm
 - D. 液面距肛门40cm
 - E. 灌肠后宜保留20~30分钟
71. 患者李某,因慢性心功能不全服用洋地黄类药物,护士应重点观察
- A. 胃肠道反应
 - B. 是否成瘾
 - C. 心率、心律
 - D. 尿液的性状
 - E. 有无皮疹
72. 患者王某,患慢性支气管炎,痰液黏稠,不易咳出,为使痰液易于排出,遵医嘱给予氧气雾化吸入治疗,下列操作错误的是
- A. 吸入前患者应先漱口
 - B. 药液稀释在5ml以内
 - C. 氧流量需6~8L/min
 - D. 氧气湿化瓶中应加入蒸馏水
 - E. 嘱患者吸气时应按住出气口
73. 患者郭某,患急性肺炎,注射青霉素数

- 秒钟后出现胸闷、气短、面色苍白、出冷汗及濒死感，脉搏细弱，测血压 60/40mmHg，此时首先应采取的急救措施是
- 给予胸外心脏按压
 - 注射强心药
 - 进行人工呼吸
 - 皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素 1ml
 - 给予呼吸兴奋药
74. 张某，男，45 岁，由于大量失血，需输入库存血 1200ml，为防止枸橼酸钠中毒反应，护士需按医嘱静脉推注下列哪种药物
- 肝素
 - 枸橼酸钠
 - 枸橼酸钙
 - 碳酸氢钠
 - 氯化钙
75. 周某，35 岁，里急后重、腹泻 2 天，粪便呈果酱样，怀疑为阿米巴原虫感染，需留取粪便标本送检，应如何采集粪便标本
- 排便于清洁便盆内，取不同部位粪便送检
 - 排便于清洁便盆内，取中央部位粪便送检
 - 排便于加温便盆内，取不同部位粪便送检
 - 排便于加温便盆内，连同便盆送检
 - 排便于消毒便盆内，取不同部位粪便送检
76. 张某，肺心病伴呼吸衰竭，表现为呼吸困难，并有精神、神经症状，恰当的给氧方法是
- 低流量、低浓度持续给氧
 - 乙醇湿化给氧
 - 加压给氧
 - 低流量间断给氧
 - 高浓度、高流量持续给氧
77. 李女士，35 岁，以“广泛性焦虑，伴惊恐发作”而收入院，以下护士的做法不妥的是
- 建立起良好的护患关系
 - 鼓励患者表达内心感受
 - 帮助患者学会放松技巧
 - 反复强调其能力和优势
 - 患者拒绝交谈时追问其理由
78. 患者，男性，45 岁，最近一段时间感觉情绪低落，无精打采，失眠，早醒，觉得日子很没劲，对什么都没有兴趣。医生诊断为抑郁发作，此患者一日之内的情绪变化有一定的规律，下列描述正确的是
- 晨轻暮重
 - 晨重暮轻
 - 中午起逐渐加重
 - 中午最严重以后减轻
 - 半夜最重
79. 患者，女，15 岁，因 1 个月后要参加中考，1 个月以来晚间入睡困难，每日睡眠 2~3 小时，白天上课精力不集中，学习成绩下降。该种睡眠状态称为
- 矛盾性失眠
 - 生理性失眠
 - 心理性失眠
 - 心理生理性失眠
 - 适应性失眠
80. 患者，女，35 岁，营业员，因食积，医生给予消食导滞法治疗，口服保和丸，患者最佳的服药时间是
- 空腹服用
 - 饭前服用
 - 饭后服用
 - 睡前服用
 - 两餐间服用
81. 护士小张在肿瘤科工作，长年接触抗肿瘤化疗药物，她应享受的权利是

- A. 定期体检的权利
B. 职业健康监护的权利
C. 赔偿的权利
D. 社会保险的权利
E. 医疗保险的权利
82. 护士李某在 A 省进行了执业注册, 后因工作调动变更执业注册到 B 省, 后又聘任到 C 省工作, 当其需要执业注册延续时, 申请部门为
A. A 省卫生厅
B. B 省卫生厅
C. C 省卫生厅
D. A 省或 C 省卫生厅
E. A 省和 C 省卫生厅
83. 患儿赵某, 因发热 3 日到县医院就诊, 门诊接诊医生张某检查后发现赵某的颊黏膜上有柯氏斑, 拟诊断为麻疹。张某遂嘱患儿赵某的家长带赵某去市传染病医院就诊。按照《传染病防治法》的规定, 张某应当
A. 请上级医生会诊, 确诊后再转院
B. 请上级医生会诊, 确诊后隔离治疗
C. 向医院领导报告, 确诊后由防疫部门进行转送隔离
D. 向医院领导报告, 确诊后对赵某就地隔离
E. 在规定时间内, 向当地防疫机构报告
84. 患者, 男性, 59 岁, 情绪激动后突然晕倒, 经 CT 检查发现为脑出血, 急诊行开颅手术, 术后送入神经外科病房。患者神志不清, 脏器功能紊乱, 给予监护。对该患者采取的最佳护理方式是
A. 个案护理
B. 功能制护理
C. 小组制护理
D. 责任制护理
E. 综合护理
85. 护士小王准备为患者输液, 发现液体有混浊现象, 她立即与药房联系退换事宜。这种控制手段属于
A. 前馈控制
B. 同期控制
C. 反馈控制
D. 直接控制
E. 成本控制
86. 护士在为患者实施热敷时由于疏忽造成患者 II 度烫伤, 面积为体表面积 0.15%。这种情况属于
A. 护理纠纷
B. 一般差错
C. 严重差错
D. 医疗事故
E. 护理事故
87. 患者王某, 住院后, 在病房把电视声调得很响, 引起别的患者的不满, 此时护士应对其采用的一种语言表达方式为
A. 解释性语言
B. 暗示性语言
C. 劝说性语言
D. 安慰性语言
E. 鼓励性语言
88. 患者王某来自偏远的山区, 没有文化, 她住院后, 护士像妈妈对待孩子一样细心体贴地照顾她。这种护患关系的模式属于
A. 主动-被动型
B. 指导-合作型
C. 共同参与型
D. 平等互助型
E. 帮助-被帮助型
89. 患者王某, 女, 78 岁, 退休干部, 因冠心病住院治疗, 住院前三天与护士们关系融洽。第四天, 年轻护士小张在为其进行静脉输液时, 静脉穿刺三次均失败, 患者非常不满, 和护士产生语言冲

突。影响护士和患者沟通的因素为

- A. 护士职业情感
- B. 护士的专业技能
- C. 护士的情感状况
- D. 护士的个人经历
- E. 护士的沟通技巧

90. 患者王某,男,63岁,因急性肠炎住院,患者住院后一直对医护人员说,自己的病很严重,要求给予特殊的看护和治疗,并对其家属过度依赖,不肯下床,甚至吃饭也要求护士或家属来喂。患者的这种行为属于

- A. 角色行为强化
- B. 角色行为缺如
- C. 角色行为冲突
- D. 角色行为消退
- E. 角色行为减弱

91. 老年男性,因夜间受凉突然出现尿潴留,其最可能的原因是

- A. 尿道狭窄
- B. 膀胱结石
- C. 膀胱肿瘤
- D. 前列腺增生
- E. 膀胱结核

92. 患者,男性,50岁,急性胆管炎、胆结石患者,该患者不能使用吗啡止痛的原因是

- A. 促进感染扩散
- B. 影响病情观察
- C. 加重胆道梗阻
- D. 诱发呼吸抑制
- E. 引发肝损害

93. 患者,男性,67岁,胰腺癌,有明显黄疸,该患者术前准备中必须补充的维生素是

- A. 维生素 A
- B. 维生素 B
- C. 维生素 C

D. 维生素 D

E. 维生素 K

94. 患者,男性,34岁,计算机工程师,近期感觉久坐后下肢沉重酸胀,容易疲劳。护士指导其在工作期间定时站立和活动下肢以促进下肢血液循环,其原理是利用

- A. 小腿肌泵收缩功能
- B. 胸腔吸气期负压
- C. 心脏舒张期负压
- D. 静脉瓣膜向心单向开放
- E. 地心对血柱的吸引力

95. 某患者外伤后,右侧第3肋骨1处开放性骨折,第4~7肋骨各有2处闭合性骨折,无气胸体征,其不会出现的病理生理改变是

- A. 反常呼吸运动
- B. 纵隔扑动
- C. 胸膜腔负压消失
- D. 回心血量下降
- E. 缺氧、二氧化碳潴留

96. 患者,男,50岁,间歇无痛性血尿3个月,经检查诊断为左侧肾癌,该患者出现血尿表明是

- A. 早期肾癌
- B. 晚期肾癌
- C. 肿瘤内出血
- D. 肾癌已侵入肾盏、肾盂黏膜
- E. 肾癌已侵入肾门

97. 老年男性,因膀胱癌行经尿道膀胱肿瘤电切术,该患者术后2年内肿瘤复发率在

- A. 20%以上
- B. 30%以上
- C. 40%以上
- D. 50%以上
- E. 60%以上

98. 2岁小儿,来医院保健门诊就诊,此年