

高级卫生专业技术资格考试

副主任护师 / 主任护师

考题精编

姚会艳 孙 哲 管素萍 主编

✓ 紧扣考试大纲

✓ 紧贴命题方向

✓ 题目选排合理

✓ 结合临床实践



第四军医大学出版社



中国医药出版社有限公司 中国医药出版社

副主任护师、主任护师 考题精编

主编 王 燕 副主编 王 燕 王 燕

副主任护师、主任护师
考题精编

中国医药出版社有限公司
中国医药出版社



高级卫生专业技术资格考试

副主任护师/主任护师考题精编

主 编 姚会艳 孙 哲 管素萍

副主编 李秀女 刘 辉 崔海波 张翠霞 张旭彤
刘玉英 张 颖 张卫红 薛燕星 刘爱玲
王志丹 董谏楣

编 委 何昊蔚 高静丽 苏 珊 焦 赛 田彦杰
李 兴 郭玉霞 张玉珍 管红玲 崔 霞
石晓华 陈劲松 张 亚 张灵芝 宋玲玉
董睿颖 刘晓冬 赵淑灵 唐明明 王秀容

图书在版编目(CIP)数据

副主任护师/主任护师考题精编/姚会艳,孙哲,管素萍主编.—西安:第四军医大学出版社,2009.11

ISBN 978-7-81086-707-8

I. 副… II. ①姚… ②孙… ③管… III. 护理学—资格考核—习题 IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 192758 号

副主任护师/主任护师考题精编

主 编 姚会艳 孙 哲 管素萍

责任编辑 朱德强

出版发行 第四军医大学出版社

地 址 西安市长乐西路 17 号(邮编:710032)

电 话 029-84776765

传 真 029-84776764

网 址 <http://press.fmmu.sn.cn>

印 刷 北京富博印刷有限公司

版 次 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

开 本 787×1092 1/16

印 张 47.5

字 数 1505 千字

书 号 ISBN 978-7-81086-707-8/R·605

定 价 99.00 元(含光盘 1 张)

(版权所有 盗版必究)

前 言

全国初、中级卫生专业技术资格考试从 2001 年开始正式实施。考试通过后可取得相应的专业技术资格,而各地高级卫生专业技术资格考试则逐步采用了考评结合的审核办法。各用人单位以此作为聘任相应技术职务的必要依据。

目前,各地高级卫生专业技术资格考试实行各省区独立组织、独立命题、自主确定合格标准的考试制度,已经覆盖临床医学、药学、护理、医技等各科室的 100 多个专业,每年参加考试的考生多为申请晋升副主任护师、主任护师等高级职称的临床医生,考试内容较之初、中级资格考试更贴近实践,试题具有一定难度。广大考生走上考场之前对考试形式及难度不了解,市场上也难找到相关考试辅导教材,对于如何备考没有头绪。

为了帮助考生熟悉考试、做好考前复习,我社组织国内知名医学院校各科专家、学者编写了本套习题集。本套丛书紧扣考试大纲,贴近命题内容,各科题目的选排既考虑知识点的全面性,又结合考试实际,突出重点,使考生在有限时间内扎实掌握大纲所要求的知识,顺利通过考试。

《高级卫生专业技术资格考试——副主任护师/主任护师考题精编》一书主要面向参评高级职称的临床护理人员,共含内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、社区护理学、护理健康教育学,医院感染护理学、护理管理学八大部分。题型主要分为单项选择题、多项选择题、病例分析题三大类,并配有参考答案。另外,在高级卫生资格考试中,部分地区采用人机对话形式,也就是在计算机上通过考试软件进行答题,为了帮助考生熟悉操作和考试形式,我们专门开发了相应的上机考试智能软件,考生安装此软件后即可做相应练习。软件也带有答案检验功能,方便考生检查自己复习水平。

最后,希望通过我们的努力帮助广大考生顺利通过考试。同时对各位抽出时间与精力参与本书编写的各科专家学者表示感谢。

编 者

目 录

第一篇 内科护理学	1
第一章 呼吸系统疾病患者的护理.....	1
第二章 循环系统疾病患者的护理.....	38
第三章 消化系统疾病患者的护理.....	71
第四章 泌尿系统疾病患者的护理.....	100
第五章 血液及造血系统患者的护理.....	117
第六章 内分泌与代谢疾病患者的护理.....	137
第七章 风湿性疾病患者的护理.....	150
第八章 理化因素所致疾病患者的护理.....	162
第九章 传染病患者的护理.....	165
第十章 神经系统疾病患者的护理.....	178
第二篇 外科护理学	196
第一章 水、电解质、酸碱代谢失调患者的护理.....	196
第二章 外科休克患者的护理.....	204
第三章 多器官功能障碍综合征.....	210
第四章 麻醉患者的护理.....	215
第五章 复苏.....	219
第六章 外科重症监护.....	223
第七章 外科围手术期护理.....	227
第八章 疼痛患者的护理.....	233
第九章 外科营养支持患者的护理.....	236
第十章 外科感染患者的护理.....	239
第十一章 损伤患者的护理.....	246
第十二章 器官移植患者的护理.....	253
第十三章 肿瘤患者的护理.....	254
第十四章 颈部疾病患者的护理.....	260
第十五章 乳房疾病患者的护理.....	266
第十六章 腹外疝患者的护理.....	271
第十七章 急性化脓性腹膜炎患者的护理.....	275
第十八章 腹部损伤患者的护理.....	278
第十九章 胃、十二指肠疾病患者的护理.....	282
第二十章 肠疾病患者的护理.....	288

第二十一章	直肠肛管疾病患者的护理	298
第二十二章	门静脉高压症患者的护理	305
第二十三章	肝脏疾病患者的护理	311
第二十四章	胆道疾病患者的护理	318
第二十五章	胰腺疾病患者的护理	327
第二十六章	外科急腹症患者的护理	332
第二十七章	周围血管疾病患者的护理	337
第二十八章	颅内压增高患者的护理	343
第二十九章	颅脑损伤患者的护理	347
第三十章	常见颅脑疾病患者的护理	352
第三十一章	胸部损伤患者的护理	356
第三十二章	脓胸患者的护理	361
第三十三章	肺部疾病外科治疗患者的护理	364
第三十四章	食管癌患者的护理	368
第三十五章	心脏疾病患者的护理	371
第三十六章	泌尿、男性生殖系统疾病的主要症状和检查	375
第三十七章	泌尿系统损伤患者的护理	378
第三十八章	泌尿系结石患者的护理	384
第三十九章	泌尿、男性生殖系统结核患者的护理	387
第四十章	泌尿系统梗阻患者的护理	389
第四十一章	泌尿、男性生殖系统肿瘤患者的护理	392
第四十二章	男性性功能障碍、节育者的护理	396
第四十三章	肾上腺疾病患者的护理	397
第四十四章	骨科患者的一般护理	399
第四十五章	骨与关节损伤患者的护理	404
第四十六章	骨与关节感染患者的护理	410
第四十七章	腰腿痛及颈肩痛患者的护理	415
第四十八章	骨肿瘤患者的护理	421
第三篇	妇产科护理学	424
第一章	女性生殖系统解剖与生理	424
第二章	分娩期妇女的护理	429
第三章	妊娠期妇女的护理	435
第四章	产褥期妇女的护理	441
第五章	新生儿保健	447
第六章	高危妊娠妇女的护理	452
第七章	妊娠期并发症妇女的护理	458
第八章	妊娠合并症妇女的护理	464

第九章 异常分娩的护理	471
第十章 分娩期并发症妇女的护理	479
第十一章 产后并发症的护理	490
第十二章 遗传咨询与产前检查	495
第十三章 妇科护理病历	499
第十四章 妇科恶性肿瘤化疗患者的护理	501
第十五章 妇科腹部手术患者的护理	505
第十六章 女性生殖系统炎症患者的护理	509
第十七章 妊娠滋养细胞疾病患者的护理	516
第十八章 月经失调患者的护理	520
第十九章 外阴、阴道手术患者的护理	525
第二十章 不孕症妇女的护理	529
第二十一章 妇女保健	533
第二十二章 计划生育妇女的护理	537
第二十三章 妇产科诊疗及手术患者的护理	541
第二十四章 妇产科常用护理技术	546
第四篇 儿科护理学	551
第一章 绪论	551
第二章 生长发育	554
第三章 儿童保健	561
第四章 儿童营养与喂养	567
第五章 住院患儿护理及其家庭支持	573
第六章 新生儿及新生儿疾病患儿的护理	578
第七章 营养障碍疾病患儿的护理	584
第八章 消化系统疾病患儿的护理	590
第九章 呼吸系统疾病患儿的护理	596
第十章 循环系统疾病患儿的护理	602
第十一章 泌尿系统疾病患儿的护理	608
第十二章 造血系统疾病的护理	614
第十三章 神经系统疾病患儿的护理	619
第十四章 内分泌系统疾病患儿的护理	624
第十五章 免疫性疾病患儿的护理	629
第十六章 遗传代谢性病患儿的护理	634
第十七章 结核病患儿的护理	639
第十八章 传染病患儿的护理	644
第十九章 寄生虫病患儿的护理	649
第二十章 危重症患儿的护理	652

第二十一章	中毒和休克、呼吸骤停	657
第二十二章	肿瘤患儿的护理	659
第五篇	社区护理学	662
第六篇	护理健康教育学	681
第七篇	医院感染护理学	696
第八篇	护理管理学	725

第一篇 内科护理学

第一章 呼吸系统疾病患者的护理

一、单项选择题 (A型题)

1. 肺炎链球菌肺炎的铁锈色痰的最主要原因

- A. 痰内有大量红细胞
- B. 痰内混有大量肺泡巨噬细胞
- C. 是纤维蛋白和红细胞结合的产物
- D. 红细胞破坏后释放含铁血黄素
- E. 以上都不是

参考答案: D

2. 社区获得性肺炎最常见的病原菌

- A. 军团菌
- B. 葡萄球菌
- C. 肺炎克雷白杆菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 绿脓杆菌

参考答案: D

3. 肺真菌病诊断主要依靠

- A. 临床表现
- B. X线典型表现
- C. 血清学试验
- D. 抗原皮肤试验
- E. 痰真菌培养及菌型鉴定

参考答案: E

4. 肺炎链球菌肺炎伴感染性休克患者, 首选补充血容量的液体为

- A. 生理盐水
- B. 5% 葡萄糖
- C. 10% 葡萄糖
- D. 低分子右旋糖酐
- E. 林格氏液

参考答案: D

5. 关于医院获得性肺炎, 哪项不正确

- A. 多继发于有各种原发疾病的危重患者, 治疗困难
- B. 革兰氏阳性球菌所占比例最高, 常为混合

感染

C. 耐药细菌日益增多

D. 一些非致病菌亦常导致医院获得性肺炎

E. 在医院内感染的肺炎

参考答案: B

6. 关于肺炎链球菌肺炎, 下列哪项错误

- A. 可表现为大叶性肺炎或小叶性肺炎
- B. 一般不引起肺组织坏死或形成空洞
- C. 肺炎消散后, 多留有纤维瘢痕
- D. 治疗首选青霉素 G
- E. 少数患者可并发脓胸

参考答案: C

7. 急性肺脓肿的治疗原则

- A. 止咳、祛痰、解痉和抗感染
- B. 改善通气, 积极抗感染
- C. 积极抗感染, 充分引流痰液
- D. 支持疗法、祛痰、有效抗生素
- E. 中西医结合, 全身用药与局部用药相结合

参考答案: C

8. 急性肺脓肿抗生素治疗停药指征

- A. 中毒症状消失
- B. 咳嗽、咳痰、咯血症状明显好转
- C. 胸片空洞液平消失
- D. 血白细胞总数及分类正常
- E. X线胸片显示空洞、炎症病灶完全吸收消失

参考答案: E

9. 有效抗生素治疗下, 影响肺脓肿疗效的主要原因

- A. 未充分休息
- B. 脓液引流不畅
- C. 未配合中药治疗
- D. 未使用祛痰剂
- E. 脓肿部位

参考答案: B

10. 急性肺脓肿最主要的临床表现是

- A. 畏寒、高热
- B. 不同程度咯血
- C. 胸痛与呼吸运动相关
- D. 肺部干湿性啰音
- E. 咳大量脓臭痰

参考答案: E

11. 关于肺脓肿, 哪项错误

- A. 致病菌常来源于上呼吸道、口腔分泌物
- B. 多为混合感染, 包括厌氧、需氧、兼性厌氧菌感染
- C. 吸入性肺脓肿的厌氧菌感染达 80% 以上
- D. 吸入性肺脓肿常为单发
- E. 仰卧位时误吸, 脓肿好发于下叶后基底段

参考答案: E

12. 关于血源性肺脓肿的描述, 哪项不正确

- A. 往往继发于皮肤感染, 骨髓炎
- B. 脓毒菌栓引起肺小血管栓塞、炎症、坏死形成肺脓肿
- C. 常为两上肺多发病灶
- D. 致病菌以葡萄球菌、链球菌为主
- E. 有咳嗽, 咳痰不多, 极少咯血

参考答案: C

13. 判断肺结核有传染性最主要的依据是

- A. 结核菌素试验阳性
- B. 痰结核菌检查阳性
- C. 血沉增快
- D. 胸部 X 线检查发现空洞
- E. 反复咯血

参考答案: B

14. 结核菌主要的传播途径为

- A. 呼吸道
- B. 消化道
- C. 泌尿道
- D. 生殖道
- E. 破损的皮肤、黏膜

参考答案: A

15. 最易导致慢性肺心病的是

- A. 原发型肺结核
- B. 血行播散型肺结核
- C. 浸润型肺结核

D. 慢性纤维空洞型肺结核

E. 结核性胸膜炎

参考答案: D

16. 肺结核患者服用抗结核药后出现视力减退、视野缩小, 主要考虑是什么药物的副作用

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 链霉素
- D. 吡嗪酰胺
- E. 乙胺丁醇

参考答案: E

17. 最常见的成人肺结核是

- A. 原发型肺结核
- B. 血行播散型肺结核
- C. 浸润型肺结核
- D. 慢性纤维空洞型肺结核
- E. 结核性胸膜炎

参考答案: C

18. 肺结核大咯血最主要的致死原因是

- A. 失血性休克
- B. 重度贫血
- C. 窒息
- D. 心力衰竭
- E. 呼吸衰竭

参考答案: C

19. 为预防肺结核的发生和流行, 在下列措施中最为关键的一环是

- A. 自出生后开始定期接种卡介苗
- B. 隔离排菌结核患者
- C. 合理化疗治愈排菌患者
- D. 加强营养、锻炼身体增强抵抗力
- E. 为易感者及密切接触排菌患者预防性投药

参考答案: C

20. 最简便的杀灭结核菌的方法是

- A. 阳光暴晒 2 小时
- B. 煮沸 1 分钟
- C. 70% 酒精接触 2 分钟
- D. 来苏水接触 2 ~ 12 小时
- E. 直接焚烧带有病菌的痰纸

参考答案: E

21. 关于结核病的治疗, 哪项错误

- A. 应坚持早期、联合、大量、规律和全程用药
 B. 有结核中毒症状, X 线下病灶有浸润
 C. 病灶部分硬结细菌阴性者, 可先观察
 D. 吡嗪酰胺能杀灭吞噬细胞内的结核菌
 E. 初治病例如条件允许, 尽量采用短程化疗
 参考答案: A
22. 原发性肺结核, 下列哪项是错误的
 A. 初次感染部位多在上叶底部、中叶和下叶上部
 B. 结核菌可引起淋巴管炎和淋巴结炎
 C. 原发病灶和淋巴结都不发生干酪样坏死
 D. 症状多轻微而短暂
 E. 多发生于儿童
 参考答案: C
23. 周围型肺癌最常见的组织类型是
 A. 鳞状上皮癌
 B. 肺泡细胞癌
 C. 腺癌
 D. 未分化癌
 E. 转移癌
 参考答案: C
24. 哪种肺癌对化疗最敏感
 A. 鳞状上皮癌
 B. 肺泡细胞癌
 C. 腺癌
 D. 未分化癌
 E. 大细胞癌
 参考答案: D
25. 对中央型肺癌诊断的最有价值的检查为
 A. 纤维支气管镜下活组织检查
 B. 高分辨率 CT
 C. 肺部磁共振检查
 D. 胸部 X 线
 E. 开胸肺活检
 参考答案: A
26. 闭合性气胸的排气治疗, 下列哪项正确
 A. 积气量少于该侧胸腔容量 30%, 不抽气
 B. 积气量多时应立即将气抽尽, 恢复肺功能
 C. 积气量多时, 应立即闭式水瓶式引流
 D. 积气量多时, 可一天多次抽气, 每次 1L, 直到抽尽
 E. 积气量多时, 可每日或隔日抽气 1 次, 每次小于 1L
 参考答案: E
27. 引起自发性气胸最常见的疾病是
 A. 慢性阻塞性肺疾病
 B. 肺结核
 C. 肺癌
 D. 支气管扩张
 E. 尘肺
 参考答案: A
28. 闭合性气胸胸膜腔内压力变化正确的是
 A. 胸膜腔内压力持续升高
 B. 胸膜腔内压抽气后压力维持不变
 C. 胸膜腔内压力明显超过大气压
 D. 抽气后胸膜腔内压力下降不复升
 E. 抽气后胸膜腔内压力下降, 但有迅速回升
 参考答案: D
29. 关于气胸的处理, 哪项是错误的
 A. 气胸量小于 20%。症状轻微, 不需排气
 B. 如肺萎缩时间长, 宜用高负压排气
 C. 交通性气胸应作胸腔闭式引流
 D. 血气胸可作低位胸腔插管引流
 E. 复发性气胸, 可用四环素注入胸腔造成粘连
 参考答案: B
30. 关于张力性气胸, 哪项错误
 A. 常继发于慢性阻塞性肺疾病或肺结核
 B. 胸腔压力超过大气压
 C. 可使纵隔严重移位, 影响心脏血液回流
 D. 必须紧急抽气减压
 E. 一般抽气减压后, 胸腔内压力不再上升
 参考答案: E
31. 关于胸腔抽气减压术, 哪项错误
 A. 当肺压缩 > 20% 时, 应考虑抽气减压
 B. 每日或隔日抽气一次
 C. 肺大部复张后, 余下积气可自行吸收
 D. 每次尽可能将气体抽尽
 E. 穿刺点一般在病侧第 2 前肋间隙锁骨中线外侧
 参考答案: D
32. 严重 II 型呼吸衰竭不宜高浓度给氧的原因
 A. 缺氧不是主要原因

- B. 可引起氧中毒
- C. 降低颈动脉窦化学感受器的兴奋性
- D. 促使二氧化碳排除过快
- E. 诱发代谢性碱中毒

参考答案: C

33. 下列哪项不是呼吸衰竭时应用呼吸机的目的

- A. 增加通气量
- B. 减少呼吸功消耗
- C. 改善通气/血流比例失调
- D. 降低氧耗量
- E. 纠正休克

参考答案: E

34. 有关机械辅助呼吸的呼气末正压方式治疗ARDS原理哪项是错误的

- A. 促进肺泡水肿消退
- B. 增加功能残气量
- C. 减少肺内动静脉分流
- D. 增加吸入氧浓度
- E. 扩张萎陷的肺泡

参考答案: D

35. 慢性呼吸衰竭的患者, 下列哪项处理不利于呼吸道通畅

- A. 糖皮质激素
- B. 采用快速利尿剂
- C. 口服或雾化祛痰剂
- D. 痰液黏稠者补液
- E. 无力排痰者翻身拍背

参考答案: B

36. 支气管扩张的最主要病因是

- A. 支气管-肺组织感染和支气管阻塞
- B. 支气管先天发育障碍
- C. 肺囊性纤维化
- D. 遗传性 α_1 抗胰蛋白酶缺乏
- E. 机体免疫功能失调

参考答案: A

37. 支气管扩张大咯血的病理基础是

- A. 感染所致黏膜充血水肿
- B. 病灶部位毛细血管通透性增高
- C. 慢性溃疡侵蚀肺小血管
- D. 动脉终末支扩张形成动脉瘤
- E. 支气管壁破坏

参考答案: D

38. 支气管扩张症咯血时下列表现哪项是错误的

- A. 反复发生, 程度不等
- B. 咯血量与病情严重程度相一致
- C. 咯血后一般无明显中毒症状
- D. 咯血后一般恢复较快
- E. 可伴有大量脓痰

参考答案: B

39. 慢性阻塞性肺病(COPD)最确切的定义是指

- A. 单纯性慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿
- B. 喘息性慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿
- C. 具有气道阻塞特征的慢支和肺气肿
- D. 慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿及肺心病
- E. 支气管哮喘合并阻塞性肺气肿及肺心病

参考答案: C

40. 肺心病形成肺动脉高压的最重要的因素是

- A. 长期反复发作的慢性炎症
- B. 肺毛细血管床减少
- C. 肺细小动脉痉挛
- D. 血容量增多
- E. 血液黏稠度增加

参考答案: C

41. 诊断早期肺心病的最主要依据是

- A. 长期呼吸道病史
- B. 右心衰竭体征
- C. 肺气肿及肺部啰音
- D. 肺动脉高压及右心肥大征象
- E. 高碳酸血症

参考答案: D

42. 浸润性肺结核最多发生的部位是

- A. 上叶前段
- B. 上叶尖后段
- C. 下叶内基底段
- D. 中叶内侧段
- E. 中叶外侧段

参考答案: B

43. 诊断呼吸衰竭的血气标准是

- A. $\text{PaO}_2 < 8.6\text{kPa}$ (65mmHg) 和 (或) 伴有 $\text{PaCO}_2 > 7.3\text{kPa}$ (55mmHg)
- B. $\text{PaO}_2 < 6.7\text{kPa}$ (50mmHg) 和 (或) 伴有 $\text{PaCO}_2 > 8.0\text{kPa}$ (60mmHg)

- C. $\text{PaO}_2 < 8.0\text{kPa}$ (60mmHg) 和 (或) 伴有 $\text{PaCO}_2 > 7.3\text{kPa}$ (55mmHg)
- D. $\text{PaO}_2 < 8.0\text{kPa}$ (60mmHg) 和 (或) 伴有 $\text{PaCO}_2 > 6.7\text{kPa}$ (50mmHg)
- E. $\text{PaCO}_2 < 8.6\text{kPa}$ (65mmHg) 和 (或) 伴有 $\text{PaCO}_2 6.7\text{kPa}$ (50mmHg)

参考答案: D

44. 关于典型支气管哮喘的临床表现, 下列哪项描述是正确的

- A. 发作性吸气性呼吸困难伴哮鸣音
- B. 发作性呼气性呼吸困难伴哮鸣音
- C. 哮喘发作越重, 哮鸣音越强
- D. 肺内同时闻及哮鸣音及水泡音
- E. 夜间阵发性呼吸困难

参考答案: B

45. 肺结核患者发热的特点是

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 午后潮热
- E. 波浪热

参考答案: D

46. 抗生素治疗急性肺脓肿如有效, 疗程应至少应该

- A. 4周
- B. 5周
- C. 6周
- D. 7周
- E. 8周

参考答案: E

47. 肺结核痰菌阳性患者的短程化疗方案最好是

- A. 异烟肼加链霉素加对氨基水杨酸1年
- B. 异烟肼加对氨基水杨酸加氨硫脲1年
- C. 利福平加异烟肼3~5个月, 前2个月加链霉素或乙胺丁醇强化
- D. 利福平加乙胺丁醇加对氨基水杨酸1年
- E. 利福平加异烟肼6~9个月, 前2个月用链霉素或乙胺丁醇强化

参考答案: E

48. 对肺炎链球菌肺炎的诊断, 下列哪项最有意义

- A. X线示肺部大片状阴影, 呈肺叶或肺段分布

- B. 痰培养肺炎链球菌阳性
- C. 肺部可闻及湿性啰音
- D. 血常规白细胞总数增高, 可见中毒颗粒
- E. 肺部可闻及支气管呼吸音

参考答案: B

49. 下列除哪项病因以外, 都与肺癌的发生有关

- A. 吸烟
- B. 病毒感染
- C. 大气污染
- D. 职业因素
- E. 过敏因素

参考答案: E

50. 关于浸润型肺结核, 下面哪项是错误的

- A. 是最常见的继发性肺结核
- B. 多见于成年人
- C. 病灶常位于肺尖
- D. 包括结核球
- E. 不包括干酪性肺炎

参考答案: E

51. 人感染结核菌后是否发病, 与下列哪项无关

- A. 侵入结核菌的数量
- B. 侵入结核菌的毒力
- C. 侵入结核菌的耐药性
- D. 机体对结核菌免疫力
- E. 机体对结核菌的变态反应

参考答案: C

52. 阻塞性肺气肿出现下列哪种情况即可诊断为呼吸衰竭

- A. 发绀、呼吸困难
- B. 出现神经、精神症状
- C. 二氧化碳结合力升高
- D. 心慌、多汗、血压升高
- E. 动脉血氧分压低于7.98kPa (60mmHg)

参考答案: E

53. 肺气肿患者最通常的主诉是

- A. 胸及胸骨后痛
- B. 发热和咳嗽
- C. 咳嗽和咳痰
- D. 气短
- E. 体重减轻

参考答案: D

54. 呼吸衰竭时缺氧与二氧化碳潴留的最主要发病原理是

- A. 通气/血流比例失调
- B. 弥散功能障碍
- C. 肺泡通气量不足
- D. 氧耗量增加
- E. 肺内动静脉分流增加

参考答案: C

55. 阻塞性肺气肿的肺功能检查最有价值的是

- A. 潮气量
- B. 肺活量
- C. 流量—容积 (V—V) 曲线测定
- D. 残气量 (RV) 及残气量/肺总量 (RV/TLC) 百分比测定
- E. 最大通气量

参考答案: D

56. 导致慢性肺心病的最常见病因是

- A. 支气管哮喘
- B. 慢性纤维空洞型肺结核
- C. 尘肺
- D. 慢性支气管炎
- E. 弥漫性支气管扩张

参考答案: D

57. 慢性支气管炎的预防方面, 首先应强调

- A. 戒烟
- B. 改善环境卫生
- C. 预防感冒
- D. 避免着凉
- E. 加强锻炼

参考答案: A

58. 下列哪项不是休克型肺炎的治疗原则

- A. 补充血容量
- B. 应用血管活性物质
- C. 控制感染
- D. 应用强心剂
- E. 应用糖皮质激素

参考答案: D

59. 关于肺炎链球菌肺炎的临床表现中, 下列哪项是错误的

- A. 最常见的症状是突发的寒战、发热、咳嗽、咳痰与胸痛

B. 咳痰呈红棕色胶冻状

C. 可出现呕吐、腹痛、腹泻

D. 严重者可出现昏迷

E. 可出现发绀与口周疱疹

参考答案: B

60. 下述哪项不是慢支发病外因

- A. 病毒和细菌感染
- B. 吸烟
- C. 大气污染
- D. 寒冷气候
- E. 饮酒

参考答案: E

61. 下列因素除哪种以外, 均与慢支发病有关

- A. 大气污染
- B. 吸烟
- C. 感染
- D. 过敏因素
- E. 维生素 B 缺乏

参考答案: E

62. 体位改变时咳嗽咳痰多见于

- A. 急性支气管炎
- B. 支气管肺癌
- C. 浸润型肺结核
- D. 支气管扩张症
- E. 慢性心功能不全

参考答案: D

63. 普通感冒最常见的病原体是

- A. 柯萨奇病毒
- B. 流感嗜血杆菌
- C. 埃可病毒
- D. 副流感病毒
- E. 鼻病毒

参考答案: E

64. 疱疹性咽峡炎最常见的病原体是

- A. 埃可病毒
- B. 鼻病毒
- C. 柯萨奇病毒
- D. 副流感病毒
- E. 流感嗜血杆菌

参考答案: C

65. 细菌性咽—扁桃体炎最常见的病原体是

- A. 肺炎链球菌
B. 奴卡菌
C. 葡萄球菌
D. 溶血性链球菌
E. 流感嗜血杆菌
参考答案: D
66. 下面哪项不是急性气管 - 支气管炎的常见病原菌
A. 肺炎链球菌
B. 肺炎克雷白杆菌
C. 葡萄球菌
D. 溶血性链球菌
E. 流感嗜血杆菌
参考答案: B
67. 诊断慢性支气管炎的主要依据
A. 肺功能测定
B. 痰细菌检测
C. 肺部体征
D. 临床症状
E. 胸片检查
参考答案: D
68. 慢性支气管炎的临床分型为
A. 单纯型、喘息型、混合型
B. 单纯型、喘息型、迁延型
C. 单纯型、喘息型
D. 单纯型、喘息型、急发型
E. 急发型、迁延型、稳定型
参考答案: C
69. α_1 -抗胰蛋白酶缺乏性肺气肿与哪项因素最有关
A. 代谢紊乱
B. 免疫功能低下
C. 遗传
D. 细菌感染
E. 支气管阻塞
参考答案: C
70. 慢性支气管炎的慢性迁延期是指
A. 咳、痰、喘症状迁延 2 年以上
B. 咳、痰、喘症状迁延 1 个月以上
C. 咳、痰、喘症状迁延 2 个月以上
D. 咳、痰、喘症状迁延 3 个月以上
E. 咳、痰、喘症状迁延半年以上
参考答案: D
71. 我国引起肺心病最常见病因
A. 肺结核
B. 慢性支气管炎、肺气肿
C. 支气管扩张
D. 肺间质纤维化
E. 支气管哮喘
参考答案: B
72. 下列哪项不符合慢性支气管炎咳痰特点
A. 多为白色黏痰
B. 急性发作期可出现黏液脓痰
C. 可为浆液泡沫痰
D. 夜间痰量较多
E. 偶有痰中带血
参考答案: D
73. 关于慢性支气管炎的描述, 哪项错误
A. 指气管 - 支气管黏膜的慢性感染性炎症
B. 主要表现为咳嗽、咳痰或伴喘息
C. 常并发阻塞性肺气肿
D. 吸烟是其主要病因
E. 临床可分为单纯型、喘息型
参考答案: A
74. 关于慢性支气管炎体征特点的描述, 下列哪项错误
A. 早期可无任何异常体征
B. 急性发作期可有散在干湿啰音
C. 并发肺气肿时, 可有肺气肿体征
D. 湿啰音多在肺底部和背部
E. 喘息型可闻及哮鸣音, 而且容易很快完全消失
参考答案: E
75. 下列哪项不是阻塞性肺气肿的诊断依据
A. 胸片两肺透亮度增加, 横膈低平
B. 肺功能测定为阻塞性通气功能障碍
C. 两肺叩诊过清音, 呼吸音减低
D. 口唇和甲床发绀
E. 在慢性支气管炎基础上出现逐渐加重的呼吸困难
参考答案: D
76. 慢性肺源性心脏病的 X 线表现, 哪项错误

- A. 常有肺、胸基础疾病表现
- B. 可有急性肺部感染的表现
- C. 肺动脉段明显突出或其高度 $\geq 6\text{mm}$
- D. 右心室肥大征
- E. 右下肺动脉干扩张, 其横径 $\geq 10\text{mm}$ 。其横径与血管横径之比 ≥ 1.07

参考答案: E

77. 最常见的咯血原因是

- A. 支气管扩张
- B. 慢性支气管炎
- C. 肺结核
- D. 支气管肺癌
- E. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄

参考答案: C

78. 护理咯血窒息患者的第一步骤是

- A. 解除呼吸道阻塞
- B. 加压给氧
- C. 使用呼吸兴奋剂
- D. 输血
- E. 口对口人工呼吸

参考答案: A

79. I型呼吸衰竭可出现

- A. 低氧血症不伴有二氧化碳潴留
- B. 低氧血症伴有二氧化碳潴留
- C. 仅有二氧化碳潴留
- D. 血气分析提示 $\text{PaO}_2 50\text{mmHg}$
- E. 以上都不是

参考答案: A

80. II型呼吸衰竭可给予吸入的氧浓度是

- A. 25% ~ 29%
- B. < 50%
- C. > 50%
- D. 35% ~ 40%
- E. 100%

参考答案: A

81. 临床上常用确诊支气管扩张的手段是

- A. X线透视
- B. X线胸片
- C. 支气管造影
- D. 高分辨CT
- E. 磁共振检查

参考答案: D

82. 支气管扩张出现

- A. 急性刺激性干咳
- B. 长期晨间咳嗽
- C. 带喉音的咳嗽
- D. 带金属音的咳嗽
- E. 变换体位时咳嗽

参考答案: E

83. 支气管哮喘发作首选

- A. 肾上腺素
- B. 麻黄素
- C. 氨茶碱
- D. 氢化可的松
- E. 西地兰

参考答案: C

84. 指导慢性阻塞性肺气肿患者做腹式呼吸时, 吸气与呼气时间之比为

- A. 1:1
- B. 1:1.5
- C. 1:2 或 1:3
- D. 2:1
- E. 1.5:1

参考答案: C

85. 抢救大咯血窒息最关键的措施是

- A. 立即进行人工呼吸
- B. 立即使用呼吸中枢兴奋剂
- C. 立即给予鼻导管吸氧
- D. 立即采取解除呼吸道梗阻的措施
- E. 立即输液、输血、注射止血剂

参考答案: D

86. 重症哮喘的患者如呼吸困难加重, 出现下列哪种情况提示病情严重

- A. 大汗淋漓
- B. 张口呼吸
- C. 奇脉
- D. 发绀
- E. 哮鸣音减弱或消失

参考答案: E

87. 治疗肺炎杆菌肺炎首选的抗生素是

- A. 氨基苷类抗生素
- B. 青霉素