

成药下乡手册

CHENGYAO

XIAXIANG

SHOUCE

第一册



中国医药公司河南省公司编印

前 言

在党的领导下,在总路线,人民公社,大跃进三面红旗的光辉照耀下,随着工农业生产的发展,广大劳动人民生活的日益改善,因而,对于医药工作也提出了新的要求。为了适应新形势的需要,迅速普遍开展药品下乡,积极组织常用的中新成药到农村,方便群众用药,并提高基层经营人员的业务水平和农民群众的医药知识起见,现根据我省医药公司1955年出版的“下乡成药手册”进行了修订与补充。

下乡成药手册将根据农村需要的中新成药分编为若干手册,陆续出版。本册(第一册)收载了常用新药成药60种,敷料3种、避孕器具3种。所列入的品种以卫生部和省卫生厅核定的处方为主,并将一部分群众有使用习惯的外省成药列入。重点介绍了每个品种的名称,别名,主要成分与含量,性状,作用与用途,用法与用量,保管方法等。药品用量均为成人剂量(系指18岁及以上至60岁以下)其他年龄均按老幼剂量折算表计算。所载入的品种剂量,如指按片服用时,系指本册所介绍之品种含量规格而言。各地同一品种含量规格与本册不同者,应按含量折算服用,不得按本册所指数量服用。所收载品种系根据疗效分类,如某一种药品有两种以上疗效,则按主要作用归类。

由于編写時間仓卒及編者业务水平的限制,在內容选
与叙述上难免存在缺点和錯誤,請讀者給予指正,以便
及时加以糾正和补充。

中国医药公司河南省公司

一九六三年十二月

目 录

前言

一、解热止痛药

解热止痛片	1
小儿退热片	2
天字头痛粉	2

二、磺胺类药

磺胺噻唑片	3
小儿消炎散	4
磺胺咪片	5

三、健胃药

小儿消食片	7
健胃片	7
小苏打片	8
大黃苏打片	9
胃特灵	10
酵母片	10
食母生	11

四、驅虫药

宝塔糖	11
驅蛔灵片	12
六一宝塔糖	13
驅蛔灵糖浆	13

五、抗疟药

止疟片	14
-----	----

小儿疟疾片	15
-------	----

六、补血营养药

紅色补丸	17
补血片	17
人造补血药	18
当归浸膏片	19
艾罗补汁	19
維他葡萄糖	20
維他鈣片	21
維生素AD滴剂	21
濃維生素AD滴剂	22

七、止咳祛痰药

止咳祛痰片	22
小儿止咳糖浆	23

八、夏令药品

仁 丹	24
十滴水	25
清凉油	25
薄荷喉症片	26
痱子粉	26

九、眼药

沃古林眼药水	29
磺胺噻唑眼药膏	29
黃氧化汞眼药膏	30

白敬宇眼药膏·····	31
青霉素眼膏·····	31
金霉素眼膏·····	32

十、外用药

青霉素软膏·····	32
消治龙药膏·····	33
磺胺嘧啶软膏·····	33
癣药水·····	34
秃疮膏·····	35
疥疮药·····	35
冻疮膏·····	36
红药水·····	36
紫药水·····	37
碘 酊·····	38

十一、杀虫药

1. 滴滴涕类制剂介绍·····	38
滴滴涕粉剂·····	39
可湿性滴滴涕粉·····	40
滴滴涕喷射剂·····	41
滴滴涕乳剂·····	41

2. 六六六类制剂介绍·····	42
六六六粉剂·····	43
可湿性六六六粉·····	43
六六六烟熏剂·····	44

十二、敷料

药用纱布·····	45
药用棉花·····	46
胶布·····	46

十三、避孕药品和器具简单介绍

避孕药片·····	47
避孕药膏·····	48
阴莖套·····	49
子宫帽·····	49
节育环·····	49

附录:

一、老幼剂量折算表·····	50
二、药物的衡量制·····	50

一、解热止痛药

解热止痛片

〔别名〕 复方阿司匹林片, APC 片

〔主要成分与含量〕 每片内含

阿司匹林	0.2268 克
非那昔汀	0.1620 克
咖啡因	0.0324 克

〔性状〕 本品为白色无臭略有酸而带苦味的小圆片。

〔作用与用途〕 本品有退热止痛的作用, 适用于治疗伤风, 感冒, 神经痛, 头痛, 关节痛, 风湿痛, 牙痛等症。不适用于剧烈的痛, 如心绞痛, 腹部的疼痛及伤口痛。

〔用法与用量〕 成人量: 每日三次, 每次一片。如为止痛用, 服一片后, 痛不止时, 半小时后, 再服一片。一昼夜连续服用, 不超过六片。

60 岁以上老人和 18 岁以下按老幼剂量折算表计算服用。

〔注意事项〕

1. 本品是一种剧药, 服用时不宜超过上述用量, 服用过多, 可能引起呕吐, 发疹, 腹泻, 虚脱等现象。

2. 对阿司匹林有过敏反应的病人(即服后有发疹或气喘等副作用)应当忌用。

〔保管方法〕 密闭, 在干燥的地方保存。

〔注〕 优散痛片, 撒烈痛片, 解热止痛散等的疗效与本品相近似。

小 儿 退 热 片

〔主要成分与含量〕 每片内含

阿司匹林 0.0567 克

非那昔汀 0.041 克

〔性状〕 本品为白色,无臭略酸而带苦味的小圆片。

〔作用与用途〕 小儿伤风发热,轻度头痛。

〔用法与用量〕 以温开水冲服,或混合饮食内服下,服时亦可将药片研成粉末,以帮助吞服。每隔八小时服一次,五个月以上每次服 1/4 片,(三个月以内婴儿禁用)。

1 至 2 岁每次服半片 2 至 4 岁每次服一片

4 至 6 岁每次服二片 6 至 8 岁每次服三片

〔注意事项〕

1. 本品服用过多,可能引起呕吐,发疹,腹泻,或虚脱现象,所以应按规定量服用。

2. 本品不可久服,服用一天后,如不见效,速请医生诊治。

〔保管方法〕 密闭,在干燥的地方保存。

天 字 头 痛 粉

〔主要成分与含量〕 每包内含

阿斯匹林 0.3 克

非那昔汀 0.3 克

咖啡因 0.05 克

〔作用与用途〕 治疗头痛、牙痛、感冒和神經痛。

〔用法与用量〕 头痛时每服一包，将药倒在杯中，用少許溫开水溶化吞服或傾于舌面用溫开水送下亦可。

〔注意事項〕 同解热止痛片。

〔保管方法〕 密閉，在干燥的地方保存。

二、磺胺類药

磺胺噻唑片

〔別名〕 噻唑片，消炎片，ST 片，夕安片

〔主要成分与含量〕 每片内含

磺胺噻唑 0.5 克

〔性状〕 本品为白色，无臭无味的小圓片。

〔作用与用途〕 本品适用于治疗肺炎，脑膜炎，中耳炎，乳腺炎，扁桃腺炎，膀胱炎，淋病，丹毒，疮疖化膿等症。

〔用法与用量〕 成人量：每日服四次，每次二片，60 岁以上和 18 岁以下按老幼剂量折算表計算。不論成人或老幼第一次均可按上述用量加倍服用。每次并应加同量的小苏打片同服。

〔注意事項〕 本品使用期間应多喝水，并服用小苏打。如发现明显的中毒現象，应立即停止使用。

〔保管方法〕 装在遮光的容器內密閉保存。

小 儿 消 炎 散

〔主要成分与含量〕 每片内含

磺胺噻唑 0.2 克

碳酸氢钠 0.2 克

〔性状〕 本品为白色或微黄色,无臭,味略咸苦的粉末。

〔作用与用途〕 本品适用于治疗小儿发热咳嗽,呼吸加快,腹泻,痢疾,麻疹发热,疮疖,咽喉肿疼等。

〔用法与用量〕 七个月以下婴儿,每日服四次,每次服三分之一包至半包。

八个月至一岁每日服四次,每次一包。

一岁至二岁每日服五次,每次一包。

三岁至四岁每日服四次,每次二包。

五岁至十二岁每日服四次,每次三包。

〔注意事项〕 同磺胺噻唑片。

〔保管方法〕 避光,在干燥的地方保存,本品中因含有碳酸氢钠,吸湿后容易与磺胺噻唑起作用渐变黄色(变成磺胺噻唑钠)。如稍变色,亦不妨碍使用,因疗效没有改变,亦无毒性,但为了不使病人发生怀疑,保管时仍须特别注意防潮。

磺胺胍片

〔别名〕 磺胺胍片,止痢片, S. G. 片

〔主要成分与含量〕 每片内含

磺胺胍 0.5 克

〔性状〕 本品为白色无臭，无味的小圓片。

〔作用与用途〕 本品适用于治疗一般的腹泻及赤血痢疾。

〔用法与用量〕 成人量：第一次服二至四片，以后每隔四小时服二片，至大便次数减少，无血膿存在时改为每隔六小时服二片，至大便次数恢复正常后两天，停止服用，宜多喝开水。60岁以上18岁以下按老幼剂量折算表服用。

〔注意事項〕

1. 在服药期間忌服盐类泻药（如硫酸鎂）。

2. 服用量大，次数多，应与等量碳酸氫鈉片同服。

3. 本品系剧药，应按照规定用法服用，可在服药前后多飲开水，服药时发生恶心，嘔吐，眩暈等应停药。

〔保管方法〕 本品見光，受热顏色会緩緩变深，变质。应密閉保存。

磺胺类药又叫消炎药。这类药物的作用并不是直接杀死細菌，而是抑制細菌的生长和繁殖，使細菌得不到营养，再加上人体的抵抗力，使細菌慢慢因饥饿衰弱而死亡。

服用磺胺类药时，必須注意用法和用量，服用太少或时断时續地服用，就不能发生药效。吃多了又容易引起毒性反应。所以一定要按照规定的用法和用量服用。服用期間避免晒太阳，服药時間以七天为限，在用药二到三天后，如仍不見效，应請医生診治。

驱蛔灵糖浆



河南省郑州化学制药厂出品

〔用途〕

驅除腸蛔虫，蟯虫。

〔用法〕

驅蛔虫：一日服 12—24 毫升，一次或分二次服用。

驅蟯虫：一日服二次，一次服 2—8 毫升。

三、健胃药

小儿消食片

〔主要成分与含量〕 每片内含

大黄末	0.075 克
碳酸氢钠	0.15 克
茴香油	0.003 克

〔性状〕 本品为淡黄色,微香而带苦味的小圆片。

〔作用与用途〕 本品适用于小儿消化不良,大便不通,肚痛,腹胀等病。

〔用法与用量〕 每日三次

1 岁以内每次服半片	1 至 2 岁每次服一片
3 至 5 岁每次服 1 片半	6 至 9 岁每次服 2 片
10 岁以上每次服 3 片	

服用时将片子压碎化在温开水内送下。

〔保管方法〕 放在冷暗干燥地方,用后把瓶塞盖紧,以免受潮。

健胃片

〔主要成分与含量〕 每片内含

龙胆粉	0.075 克
碳酸氢钠	0.175 克

〔性状〕 本品为灰白色，有特殊臭，味苦而带咸的小圆片。

〔作用与用途〕 本品有增进食欲，帮助消化，中和胃酸的作用。此药中的碳酸氢钠，是制酸药，龙胆能刺激胃液的分泌，有健胃作用，两种药配合，是很好的健胃药。

〔用法与用量〕 成人量：每日三次，每次服 2 至 4 片，饭后服用。60 岁以上和 18 岁以下按老幼剂量折算表。

〔注意事项〕

1. 本品长期服用，能养成习惯性，故在吃过一个时期以后应停药几天，换用其他药物。

2. 吃药期间，忌用铁类补血药。

3. 因慢性疾病如肺结核，心脏病等或孕妇产前及产后所引起的消化不良，食欲不振，最好服用盐酸硫胺片（即维生素 B₁ 片）或酵母片，因这两种药长期服用，没有妨碍。

〔保管方法〕 密闭，在干燥的地方保存，本品受潮，容易松散和变质，应注意防潮。

小 苏 打 片

〔别名〕 碳酸氢钠片，重碳酸钠片，重曹片

〔主要成分与含量〕 每片内含

碳酸氢钠 0.5 克或 0.3 克的两种片子。

〔性状〕 本品为白色，无臭，味咸而略苦的小圆片。

〔作用与用途〕 本品为制酸药，适用于胃酸过多（烧心）此外可和其他药物同用。

如服磺胺噻唑片同时服小苏打可降低尿的酸性，可避免尿中析出结晶，而损害肾脏。

〔用法与用量〕 成人量：每日三次，每次服 0.5 克的 1—2 片。

60 岁以上老人与 18 岁以下按老幼剂量折算表计算，12 岁以下最好用健胃片。

〔注意事项〕

1. 服小苏打后虽能立刻起到中和胃酸的作用，但因作用时间短，反而容易引起继发性胃酸过多的症状，故不应长期服用。

2. 严重胃溃疡病人禁用，因小苏打在胃里能产生二氧化碳气体，这种气体，可以使胃扩张，并刺激溃疡面，易发生胃穿孔的危险。

〔保管方法〕 密闭，在干燥的地方保存。

大 黄 苏 打 片

〔别名〕 大黄碳酸氢钠片

〔主要成分与含量〕 每片内含

大黄粉	0.15 克
碳酸氢钠	0.15 克
薄荷油	适 量

〔性状〕 本品为黄棕色小圆片，味苦，有薄荷油的香气味，和略有凉味。

〔作用与用途〕 本品为制酸健胃剂，适用于胃酸过多，消化不良，食欲不振等症。

〔用法与用量〕 每次服 1—3 片，饭后服。

〔保管方法〕 密闭保存。

胃 特 灵

〔别名〕 复方氢氧化铝凝胶片。

〔主要成分与含量〕 每片内含

干燥氢氧化铝凝胶 0.2 克

颠茄流浸膏 0.003 毫升

碳酸氢钠 0.1 克

〔性状〕 本品为黄白色的片剂。

〔作用与用途〕 本品有收敛及保护胃粘膜与中和胃酸的作用，适用于治疗消化性溃疡。

〔用法与用量〕 口服，每日服三次每次 2 片。

〔保管方法〕 干燥处密闭保存。

酵 母 片

〔别名〕 干酵母片，酿母片

〔主要成分与含量〕 每片内含

酵母 0.5 克

〔性状〕 本品为淡黄白色有特异臭气之小圆片。

〔作用与用途〕 本品主要用于消化不良，食欲不振，并可用来预防或治疗因缺乏维生素乙所引起的疾病，（如脚气病，神经炎，癞皮病）。因酵母内含多量的维生素乙，核黄素（维生素乙₂）和菸酸等，因此具有这几种维生素的治疗作用。本品还含有大量的蛋白质，因此，具有营养价值。

〔用法与用量〕 成人量：每日三次，每次服4至6片，小孩减半。

〔保管方法〕 密閉, 在干燥凉爽的地方保存, 本品受潮容易发霉生虫, 应特別注意保管, 如已变霉生虫就不能再用。

食 母 生

〔主要成分与含量〕 每片内含

乾酵母 0.2 克

〔性状〕 本品为淡黄棕色的片剂, 味甜, 有檸檬及橙皮的香气。

〔作用与用途〕 本品为消化不良, 食慾不振、脚气病、神經炎、癩皮病及其它缺乏維生素乙所引起的疾病的輔助治疗剂。

〔用法与用量〕 口服, 每日三次, 每次 4—6 片。

〔保管方法〕 干燥密閉保存。

四、驅 虫 药

宝 塔 糖

〔主要成分与含量〕 每粒内含

山道年 0.004 克

酚 酞 0.008 克

〔作用与用途〕 驅除蛔虫

〔用法与用量〕 每日一次, 早飯后半小時嚼碎后服用連服二天。

1—2 岁服 $1/2$ —1 粒

3—4 岁服 2—3 粒

5—6 岁服 4—4 $\frac{1}{2}$ 粒 7—8 岁服 5—5 $\frac{1}{2}$ 粒
9—10 岁服 6 粒

〔注意事項〕

1. 本品为剧药不宜多服。
2. 服药时不宜空腹或过饱，服药期间忌食油脂性食物。
3. 本品对患有肾脏病或急性胃肠道疾病的儿童禁用。

〔注〕 山道年散，山道年甘汞片，与本品疗效相似。

〔保管方法〕 放避光容器内，密闭保存。

驅 蛔 灵 片

〔別名〕 枸橼酸哌嗪片

〔主要成分与含量〕 每片内含

枸橼酸哌嗪 0.48 克

〔作用与用途〕 驅除蛔虫、蟯虫。

〔用法与用量〕 驅蛔虫：一日服 4—8 片，一次服用或分两次早晚服用。

驅蟯虫：一日服二次，一次 1—3 片。

〔說明〕

1. 本品具有毒性低，服用手續簡便(不需另服泻药)的优点。服用本品五小时后，能使蛔虫活动力减低，继即被麻痺，失去对腸粘膜之吸附能力，随粪便排出体外，排出的蛔虫，顏色正常，多能稍为活动，不致在人体内因虫死后产生毒素而引起副作用。

2. 本品对蟯虫、蛔虫病虽有較高之疗效，但蟯虫卵之体外感染力极强，因此在疗程中与治疗后，衣褲被褥等应进行消毒，并用黄降汞油膏涂敷肛門，以防再度感染。

〔保管方法〕 密闭保存。