

★★★★★全国(中级)主管护师职称晋升考试专用、全国卫生技术资格统一考试推荐用书
李凡成 何清湖◎总主编

以全国统编教材章节为蓝本编写，紧扣教学大纲，揭示各门课程重点。

护理学专业 主管护师 技术资格 主管护师 考试试题集

HULIXUE ZHUANYE ZHUGUAN HUSHI JISHU ZIGE
KAO SHI XITIJI


[主管护师分册]

主编◎李凡成 何清湖

特别提示读者

该系列丛书出版5年，读者调查满意度为98%；
全新改版，只要认真答题，考试合格率达85%；
命题准确，经典试题，知识集中，重点突出，从茫茫书海中
选择本书是您最明智和聪明的选择！

2011年最新版本



山西出版集团
山西科学技术出版社

护理学专业

主修课程与实践技能

主修课程
杏林行医录

主修课程
杏林行医录

主修课程
杏林行医录

主修课程
杏林行医录

2011年最新版本

护理学专业

主管护师技术资格考试习题集

(主管护师分册)

总主编 李凡成 何清湖

主 编 罗坤华 聂 颖

副主编 范瑜洁 钟 捷 李 英 周小云 商临萍

编 者 范瑜洁 罗坤华 聂 颖 李 英 钟 捷

方 辉 童 敏 许 畅 刘菊英 陈偶英

周云莲 张建影 王 华 余艳兰 杨 进

陈 红 蒋 玲 李晓屏 冯 进 李东雅

秘 书 赵彦琴 刘 峰

图书在版编目(CIP)数据

护理学专业主管护师技术资格考试习题集 / 李凡成,
何清湖主编. —太原: 山西科学技术出版社, 2011.1

ISBN 978-7-5377-3788-3

I. ①护… II. ①李… ②何… III. ①护理学 - 资格
考核 - 习题 IV. ①R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 207634 号

护理学专业主管护师技术资格考试习题集

主 编: 罗坤华 聂 颖

出版发 行: 山西科学技术出版社

社 址: 太原市建设南路 15 号

编辑部电话: 0351-4922073

发行部电话: 0351-4922121

电子信 箱: cbszzc 2643@sina.com

印 刷: 山西德胜华印业有限公司

开 本: 787 × 1168 1/16

字 数: 610 千字

印 张: 19

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 次修订再版印刷

印 数: 5000 册

书 号: ISBN 978-7-5377-3788-3

定 价: 45.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

编写说明

护理学专业技术资格考试为广大护理专业技术人员所关心。本套《护理学专业技术资格考试复习题集》包括护士资格考试、护师资格考试、主管护师资格考试、高级护师资格考试四个分册，每个分册的复习提纲均以 2011 年度全国卫生专业技术资格考试护理学考试大纲为主调，以医学院校护理学本科专业教材及职业技术学院护理学专业教材为蓝本，结合护理学专业临床实际，由教学与临床经验丰富的医学高校及附属医院护理学专业技术人员精心编写而成。旨在为广大护理专业技术人员提供良好的考前自学、复习的良师益友，通过相关分册的自学复习，更好的巩固已学得的知识，提高学习效果和应试能力。

各分册的复习题型，均与考试题型一致，其中护士、护师、主管护师资格考试的复习题型只有单选题，高级护师资格考试复习题型除单选题外，还有名词解释与简答题。

由于时间紧迫，在编写中可能存在某些缺陷甚至错误，恳请广大护理技术人员批评指正。

李凡成 何清湖

目 录

| | |
|----------------|-----|
| 一、内科护理学 | 1 |
| 二、外科护理学 | 75 |
| 三、妇产科护理学 | 167 |
| 四、儿科护理学 | 204 |
| 五、社区护理学 | 240 |
| 六、相关专业知识 | 274 |

内科护理学

1. 鼻由外鼻、鼻腔和鼻窦组成，对吸入气体的作用是

- A. 过滤、保湿、加温
- B. 过滤、干燥、加温
- C. 干燥、加温
- D. 过滤、加温
- E. 保湿、加温

答案：A

2. 环状软骨在声带下方，是喉梗阻进行

- A. 气管插管的部位
- B. 环甲膜穿刺的部位
- C. 气管切开的部位
- D. 支气管镜检的部位
- E. 输氧管插管的部位

答案：B

3. 肺泡总面积约 $100m^2$ ，一般只有多少肺泡进行气体交换

- A. $1/5$
- B. $1/10$
- C. $1/15$
- D. $1/20$
- E. $1/25$

答案：D

4. 肺泡毛细血管网非常丰富，总面积达

- A. $50m^2 \sim 100m^2$
- B. $60m^2 \sim 100m^2$
- C. $70m^2 \sim 100m^2$
- D. $80m^2 \sim 100m^2$
- E. $90m^2 \sim 100m^2$

答案：B

5. 正常成人潮气量为

- A. $100mL \sim 500mL$

- B. $200mL \sim 500mL$

- C. $300mL \sim 500mL$

- D. $400mL \sim 500mL$

- E. $500mL$ 以上

答案：D

6. 正常成人每分钟通气量为

- A. $2L \sim 8L$

- B. $3L \sim 8L$

- C. $4L \sim 8L$

- D. $5L \sim 8L$

- E. $6L \sim 8L$

答案：E

7. 呼吸中枢位于

- A. 大脑皮层
- B. 中脑
- C. 延髓
- D. 间脑
- E. 脑桥

答案：C

8. 会厌、喉部疾患和气管受压或异物时，咳嗽声为

- A. 犬吠样
- B. 干性或刺激性
- C. 慢性连续性
- D. 金属音
- E. 嘶哑性

答案：A

9. 吸气性呼吸困难，吸气时间延长，重者出现

- A. 锁骨上窝凹陷
- B. 胸骨上窝凹陷
- C. 肋间隙凹陷



- D. 三凹征
 - E. 四凹症
- 答案: D

10. 中等量咯血每天为
- A. 60mL~500mL
 - B. 70mL~500mL
 - C. 80mL~500mL
 - D. 90mL~500mL
 - E. 100mL~500mL
- 答案: E

11. 急性上呼吸道感染有多少是病毒所致
- A. 10%~20%
 - B. 30%~40%
 - C. 50%~60%
 - D. 70%~80%
 - E. 90%以上
- 答案: D

12. 细菌性咽、扁桃体炎多由哪种细菌引起
- A. 金黄色葡萄球菌
 - B. 大肠杆菌
 - C. 溶血性链球菌
 - D. 结核杆菌
 - E. 拟杆菌
- 答案: C

13. 急性气管、支气管炎的治疗原则不包括
- A. 止咳
 - B. 祛痰
 - C. 平喘
 - D. 控制感染
 - E. 补充水分和营养
- 答案: E

14. 有关慢性支气管炎诊断标准, 咳嗽、咳痰反复发作时间应为
- A. 每年发作至少 1 个月, 持续 1 年以上
 - B. 每年发作至少 2 个月, 持续 2 年以上
 - C. 每年发作至少 2 个月, 持续 3 年以上
 - D. 每年发作至少 3 个月, 持续 2 年以上
 - E. 每年发作至少 3 个月, 持续 4 年以上
- 答案: D

15. 慢性支气管炎最主要的并发症是
- A. 肺出血
 - B. 支气管扩张
 - C. 小叶性肺炎
 - D. 肺栓塞
 - E. 肺气肿、肺心病
- 答案: E

16. 慢性阻塞性肺气肿特别是肺大泡的病人易并发
- A. 自发性气胸
 - B. 肺部急性感染
 - C. 慢性肺源性心脏病
 - D. 呼吸衰竭
 - E. 肺栓塞
- 答案: A

17. 慢性阻塞性肺气肿最主要的护理诊断是
- A. 体液不足
 - B. 体液过多
 - C. 气体交换受损
 - D. 低效性呼吸型态
 - E. 不能维持自主呼吸
- 答案: C

18. 慢性阻塞性肺气肿的饮食指导内容不包括
- A. 保证每日足够的热量、蛋白质
 - B. 补充适宜的水分、纤维素
 - C. 进餐前多活动, 促进食欲
 - D. 避免食用易引起便秘、产气食品
 - E. 少食多餐、细嚼慢咽
- 答案: C

19. 支气管哮喘典型的临床症状是
- A. 胸闷
 - B. 胸痛
 - C. 咯血
 - D. 干咳
 - E. 反复发作性喘息伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难
- 答案: E

20. 支气管哮喘发作禁用
- A. 地塞米松
 - B. 氨茶碱
 - C. 沙丁胺醇

D. 肾上腺素

E. 吗啡

答案：E

21. 在形成肺心病的过程中，导致肺动脉高压形成最重要的因素是

A. 缺氧

B. 高碳酸血症

C. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

D. 电解质紊乱

E. 肺部感染

答案：A

22. 下列哪项不是肺心病的并发症

A. 肺性脑病

B. 酸碱平衡失调

C. 心律失常

D. 支气管炎

E. DIC

答案：D

23. 肺心病致呼吸衰竭动脉血气分析多显示为

A. 动脉血氧分压降低

B. 动脉血氧分压增高

C. 动脉血氧分压降低伴二氧化碳潴留

D. 动脉血二氧化碳分压降低

E. 动脉血二氧化碳潴留

答案：C

24. 肺心病每天应给予热量至少

A. 8.54kJ / kg

B. 9.54kJ / kg

C. 10.54kJ / kg

D. 11.54kJ / kg

E. 12.54kJ / kg

答案：E

25. 肺心病应合理用氧，一般原则是持续

A. 低浓度给氧

B. 低流量给氧

C. 低浓度、低流量给氧

D. 高浓度给氧

E. 高流量给氧

答案：C

26. 肺心病进行“冬病夏治”，其治疗原则为

A. 清热解毒，扶正固本

B. 活血化瘀，扶正固本

C. 清热凉血，扶正固本

D. 止咳化痰，扶正固本

E. 行气活血，扶正固本

答案：B

27. 支气管扩张重要的发病因素是

A. 肺结核

B. 肿瘤压迫

C. 肺囊性纤维化

D. 支气管-肺组织感染和支气管阻塞

E. 支气管内结石

答案：D

28. 支气管扩张病人应多饮水，每天

A. 1000mL 以上

B. 1100mL 以上

C. 1200mL 以上

D. 1300mL 以上

E. 1500mL 以上

答案：E

29. 支气管扩张病人引流时，如病变位于下叶各底段者，床脚抬高

A. 10cm~50cm

B. 20cm~50cm

C. 30cm~50cm

D. 40cm~50cm

E. 50cm 以上

答案：C

30. 医院内获得性肺炎，最常见的致病菌是

A. 病毒

B. 衣原体

C. 真菌

D. 革兰阳性球菌

E. 革兰阴性杆菌

答案：E

31. 对肺炎病人应调节好休息环境，其

A. 室温为 18℃~19℃，湿度 55%~60%

B. 室温为 18℃~20℃，湿度 55%~60%

C. 室温为 18℃~24℃，湿度 55%~60%

- D. 室温为 18℃~26℃，湿度 55%~60%
E. 室温为 18℃~28℃，湿度 55%~60%

答案：B

32. 肺炎球菌肺炎的典型症状是

- A. 咳白泡沫痰
B. 咳黏液脓性痰
C. 咳铁锈色痰
D. 咳清稀痰
E. 咳血痰

答案：C

33. 肺炎支原体肺炎好发于

- A. 儿童及青年人
B. 新生儿
C. 成年女性
D. 成年男性
E. 老年人

答案：A

34. 治疗肺炎支原体肺炎首选药为

- A. 青霉素
B. 链霉素
C. 红霉素
D. 庆大霉素
E. 先锋霉素

答案：C

35. 军团菌肺炎的潜伏期为

- A. 1 天~10 天
B. 2 天~10 天
C. 3 天~10 天
D. 4 天~10 天
E. 5 天~10 天

答案：B

36. 我国现有肺结核病人约 600 万人, 占世界结核病人总数的

- A. 1 / 2
B. 1 / 3
C. 1 / 4
D. 1 / 5
E. 1 / 6

答案：C

- 37. 适合结核菌生长的 pH 为**
A. 6.5~7.2
B. 6.6~7.2

- C. 6.7~7.2
D. 6.8~7.2
E. 6.9~7.2

答案：D

38. 结核菌素试验结果阴性的判断是皮肤硬结直径小于

- A. 1mm
B. 3mm
C. 5mm
D. 7mm
E. 9mm

答案：C

39. 确诊肺结核的主要依据是

- A. X 线的典型征象
B. 病人的自觉症状
C. 长期午后潮热
D. 痰中找到结核菌
E. 痰中带血

答案：D

40. 肺结核的化疗原则不包括

- A. 早期、联用
B. 适量
C. 规律治疗
D. 全程治疗
E. 间歇疗法

答案：E

41. 肺结核病人需高度重视饮食营养的护理, 成人每日补充蛋白质总量应为

- A. 50g~60g
B. 70g~80g
C. 90g~120g
D. 130g~140g
E. 150g 以上

答案：C

42. 下列哪项不属于控制结核病流行的基本原则

- A. 控制传染源
B. 切断传播途径

- C. 增强免疫力
- D. 降低易感性
- E. 不随地吐痰

答案：E

43. 吸入性肺脓肿的厌氧菌感染达

- A. 50%以上
- B. 60%以上
- C. 70%以上
- D. 80%以上
- E. 90%以上

答案：D

44. 急性肺脓肿病人如感染不能控制，于发病的10~14天突然咳出大量脓臭痰和坏死组织，每日量可达

- A. 100mL~500mL
- B. 200mL~500mL
- C. 300mL~500mL
- D. 400mL~500mL
- E. 500mL以上

答案：C

45. 急性肺脓肿病人白细胞总数可达

- A. (5~6) ×10⁹/L
- B. (6~10) ×10⁹/L
- C. (15~20) ×10⁹/L
- D. (20~30) ×10⁹/L
- E. (30~35) ×10⁹/L

答案：D

46. 慢性肺脓肿病人实验室检查显示

- A. 红细胞和血红蛋白减少
- B. 白细胞减少
- C. 血小板减少
- D. 淋巴细胞减少
- E. 白蛋白减少

答案：A

47. 下列哪项不是肺脓肿病人咳嗽、咳痰的护理

- A. 鼓励病人有效咳嗽
- B. 经常活动和变换体位以利排痰
- C. 增加液体摄入量
- D. 注意观察痰的性质、颜色、气味和量
- E. 晨起、饭后、睡前助病人漱口，做好口腔护理

答案：E

48. 国内调查显示男性肺癌与吸烟有关的占肺癌的

- A. 30%~40%
- B. 40%~50%
- C. 60%~70%
- D. 80%~90%
- E. 90%以上

答案：D

49. 摄取的食物中哪样物质含量少，则患肺癌的危险性高

- A. 维生素 A
- B. 维生素 B
- C. 维生素 C
- D. 维生素 D
- E. 维生素 E

答案：A

50. 肺癌病人行痰脱落细胞检查，非小细胞癌的阳性率可达

- A. 30%~40%
- B. 40%~50%
- C. 60%~70%
- D. 70%~80%
- E. 90%以上

答案：D

51. 部分中央型肺癌病人首发症状为

- A. 咳嗽
- B. 咯血
- C. 呼吸困难
- D. 发热
- E. 喘鸣

答案：B

52. 肺癌病人在化疗期间出现恶心、呕吐，可遵医嘱给予病人口服或肌内注射

- A. 维生素 B₁10mg
- B. 维生素 B₆10mg
- C. 灭吐灵 10~20mg
- D. 阿托品 0.5mg
- E. 氯苯西林 1g

答案：C



53. 对肺癌病人照射部位皮肤的护理哪项不妥

- A. 嘱病人勿擦去皮肤照射部位的标志
- B. 局部禁涂凡士林等难以清洗的药膏
- C. 宜穿宽松柔软的衣服，防止摩擦
- D. 洗澡时局部皮肤用肥皂搓擦
- E. 有渗出性皮炎局部涂鱼肝油软膏

答案：D

54. 一般认为哪种肺癌的预后较好

- A. 腺癌
- B. 鳞癌
- C. 小细胞未分化癌
- D. 大细胞癌
- E. 混合癌

答案：B

55. 可造成严重循环障碍而危及生命的气胸是

- A. 闭合性气胸
- B. 交通性气胸
- C. 张力性气胸
- D. 单纯性气胸
- E. 开放性气胸

答案：C

56. 气胸的并发症不包括

- A. 脓气胸
- B. 血气胸
- C. 纵隔气肿、皮下气肿
- D. 呼吸衰竭
- E. DIC

答案：E

57. 急性气胸，肺萎陷 > 20% 时，肺功能测定呈现

- A. 限制性通气障碍
- B. 限制性换气障碍
- C. 限制性肺活量降低
- D. 限制性潮气量增加
- E. 限制性每分钟潮气量降低

答案：A

58. 自发性气胸的一般治疗和对症处理措施不包括

- A. 休息
- B. 吸氧
- C. 去除诱因
- D. 对症处理

E. 排气治疗

答案：E

59. 为气胸病人紧急排气，其穿刺部位常在患侧

- A. 锁骨中线内侧第二肋间或腋前线 4~5 肋间
- B. 锁骨中线外侧第二肋间或腋前线 1~2 肋间
- C. 锁骨中线外侧第二肋间或腋前线 3~4 肋间
- D. 锁骨中线外侧第二肋间或腋前线 4~5 肋间
- E. 锁骨中线外侧第一肋间或腋前线 4~5 肋间

答案：D

60. 人工气箱排气，一般 1 次抽气量不超过

- A. 1L
- B. 2L
- C. 3L
- D. 4L
- E. 5L

答案：A

61. 气胸病人行胸腔闭式引流，胸膜腔的压力应保持在

- A. $0.5\text{cmH}_2\text{O} \sim 1\text{cmH}_2\text{O}$ 以下
- B. $1\text{cmH}_2\text{O} \sim 2\text{cmH}_2\text{O}$ 以下
- C. $2\text{cmH}_2\text{O} \sim 3\text{cmH}_2\text{O}$ 以下
- D. $3\text{cmH}_2\text{O} \sim 4\text{cmH}_2\text{O}$ 以下
- E. $4\text{cmH}_2\text{O} \sim 5\text{cmH}_2\text{O}$ 以下

答案：B

62. 气胸病人给予吸氧，氧流量控制在

- A. $1\text{min} \sim 5\text{L/min}$
- B. $2\text{min} \sim 5\text{L/min}$
- C. $3\text{min} \sim 5\text{L/min}$
- D. $4\text{min} \sim 5\text{L/min}$
- E. $5\text{min} \sim 5\text{L/min}$

答案：B

63. 气胸病人行胸腔闭式引流，其液平面应低于引流管胸腔出口

- A. 20cm
- B. 40cm
- C. 60cm
- D. 80cm
- E. 100cm

答案：C

64. 为加速胸腔内气体排出，鼓励病人多长时间进行一次深呼吸和咳嗽练习或吹气球

- A. 1h
- B. 2h
- C. 3h
- D. 4h
- E. 5h

答案：B

65. 气胸的预后取决于原发病、气胸的类型约 1 / 3

气胸 2~3 年内可能

- A. 同侧复发
- B. 对侧复发
- C. 前侧复发
- D. 后侧复发
- E. 双侧复发

答案：A

66. 下列哪项检测结果符合 II 型呼吸衰竭

- A. $\text{PaO}_2 > 60 \text{ mmHg}$, $\text{PaCO}_2 < 50 \text{ mmHg}$
- B. $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$
- C. $\text{PaO}_2 < 67 \text{ mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$
- D. $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$, $\text{PaCO}_2 < 50 \text{ mmHg}$
- E. $\text{PaO}_2 > 50 \text{ mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 60 \text{ mmHg}$

答案：B

67. 脑组织的耗氧量大，约为全身耗氧量的

- A. 1 / 9~1 / 4
- B. 1 / 8~1 / 4
- C. 1 / 7~1 / 4
- D. 1 / 6~1 / 4
- E. 1 / 5~1 / 4

答案：E

68. 通常完全停止供氧多长时间即可引起不可逆的脑损害

- A. 1min~2min
- B. 2min~3min
- C. 3min~4min
- D. 4min~5min
- E. 5min~6min

答案：D

69. 呼吸衰竭的临床表现不包括

- A. 发热

B. 呼吸困难

C. 发绀

D. 精神、神经症状

E. 血液循环系统症状

答案：A

70. 代偿性呼吸性酸中毒血气分析显示

- A. PaCO_2 降低, $\text{pH} \geq 7.35$
- B. PaCO_2 升高, $\text{pH} \geq 7.35$
- C. PaCO_2 升高, $\text{pH} \geq 6.35$
- D. PaO_2 降低, $\text{pH} \geq 7.35$
- E. PaO_2 升高, $\text{pH} \geq 7.35$

答案：B

71. 尼可刹米是最常用的呼吸中枢兴奋剂，常规用量为

- A. 0.075g~0.75g 静注
- B. 0.175g~0.375g 静注
- C. 0.275g~0.375g 静注
- D. 0.375g~0.75g 静注
- E. 0.375g~0.85g 静注

答案：D

72. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒在哪种情况下可适量补碱

- A. 当 $\text{pH} < 7.20 \text{ mmol/L}$, $\text{HCO}_3^- < 18 \text{ mmol/L}$ 时
- B. 当 $\text{pH} < 7.00 \text{ mmol/L}$, $\text{HCO}_3^- < 18 \text{ mmol/L}$ 时
- C. 当 $\text{pH} < 7.20 \text{ mmol/L}$, $\text{HCO}_3^- < 20 \text{ mmol/L}$ 时
- D. 当 $\text{pH} > 7.20 \text{ mmol/L}$, $\text{HCO}_3^- < 18 \text{ mmol/L}$ 时
- E. 当 $\text{pH} < 7.20 \text{ mmol/L}$, $\text{HCO}_3^- > 20 \text{ mmol/L}$ 时

答案：A

73. 呼吸衰竭时水电解质紊乱主要表现为

- A. 低钾、低氯、低钠
- B. 高钾、低钙
- C. 高钙、低镁
- D. 高镁、高钠
- E. 高氯、高钠

答案：A

74. 呼吸衰竭病人在抢救时应常规鼻饲

- A. 高蛋白，高脂肪饮食
- B. 低蛋白，高脂肪饮食
- C. 高蛋白，高脂肪、低碳水化合物饮食
- D. 高蛋白，高脂肪、高碳水化合物饮食

E. 高蛋白，低碳水化合物饮食

答案：C

75. 呼吸衰竭病人的护理下列哪项欠妥

- A. 监测生命体征
- B. 做好氧疗护理
- C. 促进和指导病人进行有效的呼吸
- D. 指导病人适当休息和活动
- E. 告诉病人的病情预后不良

答案：E

76. II型呼吸衰竭病人慎用的药物是

- A. 氨茶碱
- B. 地西洋
- C. 洛贝林
- D. 尼可刹米
- E. 回苏灵

答案：B

77. 下列哪项不是保持呼吸道通畅，促进痰液引流的措施

- A. 指导并协助病人进行有效咳嗽、咳痰
- B. 每1h~2h翻身1次
- C. 吸痰，并注意无菌操作
- D. 饮水、雾化吸入药物以湿化并排出痰液
- E. 按医嘱正确使用抗生素

答案：E

78. 对呼吸衰竭病人的保健指导内容下列哪项是错误的

- A. 讲解保健知识
- B. 鼓励病人进行呼吸运动锻炼
- C. 经常参加当地的大型公众活动以调节情志
- D. 指导病人正确用药
- E. 指导病人合理休息与活动，增强体质

答案：C

79. ARDS临床特点为急性呼吸窘迫和难治性低氧血症，其病死率达

- A. 10%~20%
- B. 20%~30%
- C. 30%~40%
- D. 50%~70%
- E. 70%~80%

答案：D

80. ARDS的主要病理改变是

- A. 肺广泛充血、水肿和肺泡内透明膜形成
- B. 进行性的呼吸窘迫
- C. 肺部可闻及湿啰音
- D. 通常的吸氧疗法不能改善症状
- E. X线胸片检查呈轻度间质改变，边缘模糊的肺纹理增多

答案：A

81. 动脉血气分析氧合指数正常值为

- A. 100mmHg~200mmHg
- B. 200mmHg~300mmHg
- C. 300mmHg~400mmHg
- D. 400mmHg~500mmHg
- E. 500mmHg~600mmHg

答案：D

82. 下列哪项指标的降低是ARDS诊断的必要条件

- A. 动脉血氧分压
- B. 氧合指数
- C. 肺泡气与动脉血氧分压差
- D. 肺毛细血管楔压
- E. 氧饱和度

答案：B

83. ARDS伴有左心衰竭时，肺毛细血管楔压一般

- A. <4ccmH₂O
- B. <6ccmH₂O
- C. <8ccmH₂O
- D. <10ccmH₂O
- E. <12ccmH₂O

答案：E

84. 迅速纠正缺氧是抢救ARDS最重要的措施，一般需高浓度给氧，使

- A. PaO₂>40mmHg, SaO₂>90%
- B. PaO₂>50mmHg, SaO₂>90%
- C. PaO₂>60mmHg, SaO₂>90%
- D. PaO₂>60mmHg, SaO₂>70%
- E. PaO₂>60mmHg, SaO₂>80%

答案：C

85. ARDS早期一般不宜输

- A. 晶体液
- B. 胶体液

- C. 平衡液
- D. 生理盐水
- E. 葡萄糖液

答案：B

86. ARDS 处于高代谢状态，需补充营养，其中蛋白质每日应

- A. $\geq 1\sim 3\text{g}/\text{kg}$
- B. $\geq 2\sim 3\text{g}/\text{kg}$
- C. $\geq 3\sim 4\text{g}/\text{kg}$
- D. $\geq 4\sim 5\text{g}/\text{kg}$
- E. $\geq 5\sim 6\text{g}/\text{kg}$

答案：A

87. 胸腔积液的穿刺点一般在

- A. 肩胛下第 2~3 肋间隙或腋中线第 6~7 肋间隙
- B. 肩胛下第 3~4 肋间隙或腋中线第 6~7 肋间隙
- C. 肩胛下第 5~6 肋间隙或腋中线第 6~7 肋间隙
- D. 肩胛下第 7~9 肋间隙或腋中线第 6~7 肋间隙
- E. 肩胛下第 9~10 肋间隙或腋中线第 6~7 肋间隙

隙

答案：D

88. 为胸腔积液病人首次抽液的排液量不宜超过

- A. 400mL
- B. 500mL
- C. 600mL
- D. 700mL
- E. 800mL

答案：C

89. 胸腔抽液过程中出现哪种情况，应立即停止抽液

- A. 眩晕反应
- B. 牵拉反应
- C. 气急反应
- D. 扩张反应
- E. 胸膜反应

答案：E

90. 纤维支气管镜检查术前

- A. 2h 禁食禁水
- B. 4h 禁食禁水
- C. 6h 禁食禁水
- D. 8h 禁食禁水

- E. 10h 禁食禁水

答案：B

91. 心脏的兴奋传导途径是

- A. 窦房结—结间束—房室束—房室结—蒲肯野细胞
- B. 房室结—房室束—窦房结—结间束—蒲肯野细胞
- C. 蒲肯野细胞—房室束—房室结—左右束支
- D. 房室结—节间束—窦房结—房室束—蒲肯野细胞
- E. 窦房结—结间束—房室结—房室束—蒲肯野细胞

答案：E

92. 下列心脏传导系统的细胞中自律性最高的是

- A. 结间束
- B. 蒲肯野细胞
- C. 希斯束
- D. 房室结
- E. 窦房结

答案：E

93. 二尖瓣位于什么部位

- A. 左右心室之间
- B. 右心室与主动脉之间
- C. 左侧房室之间
- D. 左心室与主动脉之间
- E. 右侧房室之间

答案：C

94. 心脏的血液供应主要来自于

- A. 左冠状动脉
- B. 右冠状动脉
- C. 冠状动脉
- D. 肺动脉
- E. 肺静脉

答案：C

95. 在循环系统中，毛细血管又称为

- A. 阻力血管
- B. 功能血管
- C. 容量血管
- D. 直捷通路
- E. 动静脉短路



答案：B

96. 交感神经对血液循环的调节不正确的是

- A. 交感神经兴奋时使心率加快
- B. 交感神经兴奋时使心肌收缩力增强
- C. 交感神经兴奋 α 、 β 受体调节血液循环
- D. 交感神经兴奋时使血压升高
- E. 交感神经兴奋时通过乙酰胆碱能受体产生与副交感神经相反的作用

答案：E

97. 循环系统病人出现呼吸困难最常见原因是

- A. 急性心肌梗死
- B. 高血压性心脏病
- C. 急性右心衰竭
- D. 急性左心衰竭
- E. 心包压塞

答案：D

98. 心功能不全指的是

- A. 心脏舒张功能下降，机体静脉系统瘀血
- B. 肺循环瘀血，肺水肿
- C. 在静脉回流正常的情况下，心脏排出的血液不足以维持组织代谢需要
- D. 心脏收缩舒张功能障碍，体循环血压过低心脏收缩舒张功能障碍
- E. 心脏收缩功能下降，机体动脉系统供血不足

答案：C

99. 咯粉红色泡沫痰提示

- A. 右心衰竭
- B. 左心衰竭
- C. 全心衰竭
- D. 心肌炎
- E. 支气管扩张

答案：B

100. 下列关于心功能一级病人的护理正确的是

- A. 绝对卧床但应半卧
- B. 照常工作增加午睡
- C. 可照常工作
- D. 限制活动
- E. 稍事活动

答案：B

101. 降低心脏前负荷时可以选用的药物是

- A. 多巴胺
- B. 硝普钠
- C. 阿拉明
- D. 硝酸甘油
- E. 多巴酚丁胺

答案：D

102. 左心室后负荷增加常见于

- A. 肺动脉高压
- B. 严重贫血
- C. 体循环阻力过高
- D. 回心血量增加
- E. 血容量不足

答案：C

103. 左心衰竭的护理诊断是

- A. 体液不足
- B. 活动无耐力
- C. 清理呼吸道无效
- D. 有窒息的危险
- E. 营养失调

答案：C

104. 左心衰竭肺瘀血的护理诊断是

- A. 气体交换受损
- B. 活动无耐力
- C. 组织灌注不足
- D. 营养失调
- E. 皮肤完整性受损

答案：A

105. 心力衰竭的特点是

- A. 肺循环和（或）体循环瘀血
- B. 心脏扩大
- C. 肺循环和体循环交通
- D. 静脉回流降低
- E. 进行性呼吸困难

答案：A

106. 心源性呼吸困难最先出现的是

- A. 急性肺水肿
- B. 阵发性夜间呼吸困难
- C. 劳力性呼吸困难
- D. 心源性哮喘

E. 端坐呼吸

答案：E

答案：C

107. 心脏病患者出现端坐呼吸时，下列护理措施不妥的是

- A. 密切观察生命体征、呼吸困难和发绀的程度
- B. 持续低流量吸氧
- C. 加强生活护理，减少体力活动
- D. 侧卧位，减轻心脏负担
- E. 保持情绪稳定，降低交感神经兴奋性

答案：D

108. 端坐呼吸是指

- A. 劳累或情绪激动时发生呼吸困难，休息可缓解
- B. 睡眠中憋醒，被迫站立位伴咳粉红色泡沫痰
- C. 多发生在夜间，睡眠中突然憋醒
- D. 体力活动时发生呼吸困难，口含硝酸甘油可缓解
- E. 休息时病人感到呼吸困难，不能平卧，被迫取坐位或半卧位

答案：E

109. 对心源性水肿患者实施的护理措施要点中，哪项不妥

- A. 保持患者身心休息，减轻心脏负荷
- B. 保持皮肤清洁，干燥，防止破损和感染
- C. 限制钠盐的摄入
- D. 老年患者输液速度不可太快
- E. 应用排钾利尿剂期间，注意血压的变化

答案：E

110. 下列哪项不是右心衰竭临床表现

- A. 恶心、呕吐
- B. 早期在身体疏松部位出现水肿
- C. 肝肿大、肝区胀痛
- D. 颈静脉怒张
- E. 口唇发绀

答案：E

111. 肝颈静脉回流征阳性是指

- A. 心源性肝硬化伴黄疸和肝功能损害
- B. 长期右心衰时肝持续淤血形成肝硬化
- C. 急性肝淤血者出现肝肿大、压痛
- D. 压迫病人腹部或肝脏时颈静脉充盈消失
- E. 压迫病人腹部或肝脏时颈静脉充盈更加明显

112. 有关左心衰竭的描述，不正确的是

- A. 肺循环淤血
- B. 劳力性呼吸困难出现较晚
- C. 咳白色泡沫样痰
- D. 发生急性肺水肿可咳大量粉红色泡沫痰
- E. 左心室增大，心界向左扩大

答案：B

113. 左心功能不全最早出现的典型症状是

- A. 胃肠道症状
- B. 心悸、乏力
- C. 下肢水肿
- D. 呼吸困难
- E. 咳嗽、咳痰

答案：D

114. 右心功能不全时常见症状为

- A. 呼吸困难
- B. 咳嗽、咳痰
- C. 少尿
- D. 心悸
- E. 胃肠道症状

答案：E

115. 下列药物中属于保钾利尿剂的是

- A. 依他尼酸（利尿酸）
- B. 环戊甲噻嗪
- C. 吲塞米（速尿）
- D. 安体舒通
- E. 氢氯噻嗪

答案：D

116. 护士给予慢性心衰患者的饮食指导不妥的是

- A. 应少量多餐
- B. 饮食应清淡、易消化
- C. 每日摄盐量应少于 5g
- D. 增加味精和酱油等调味品的食用，以促进食欲
- E. 限制腌制食品和碳酸饮料

答案：D

117. 慢性心衰病人的病情观察，不包括

- A. 关节活动范围和肢体活动能力
- B. 皮肤黏膜发绀情况