

醫學心悟（三）

蜀王公集

醫學心悟第三卷

天都普明子程國彭鍾齡著

中風門

中風者。真中風也。有中腑。中臟。中血脉之殊。中腑者。中在表也。外有六經之形症。與傷寒六經傳變之症無異也。中太陽用桂枝湯。中陽明葛根湯加桂枝。中少陽小柴胡湯加桂枝。其法悉具。傷寒門。茲不贅。中臟者。中在裏也。其人眩仆昏冒。不醒人事。或痰聲如曳鋸。宜分臟腑寒熱而治之。假如其人素挾虛寒。或

暴中新寒則風水相遭寒冰徹骨而風爲寒風矣假如其人素有積熱或鬱火暴發則風乘火勢火借風威而風爲熱風矣爲熱風多見閉症其症牙關緊急兩手握固法當疏風開竅先用搐鼻散吹之次用牛黃丸灌之若大便閉結腹滿脹悶火勢極盛者以三化湯攻之爲寒風多見脫症其症手撒脾絕眼合肝絕口張心絕聲如鼾肺絕遺尿腎絕更有兩目直視搖頭上竄髮直如粧汗出如珠皆脫絕之症法當溫補元氣急用大劑附子理中湯灌之若痰涎壅盛以三生飲加人參灌之間亦有寒

痰壅塞介乎閉脫之間不便驟補者用半夏橘紅各一兩濃煎至一杯以生薑自然汁對沖頻頻灌之其人卽甦然後按其虛而調之然予自揣生平用附子理中治愈者甚多其用牛黃丸治愈者亦恒有之惟三化湯一方並未舉用此必天時地土人事之不同然寒熱之劑屹然並立古方具在法不可泯故兩存之以備參酌中血脉者中在經絡之中也其症口眼歪斜半身不遂是也大秦艽湯主之偏在左倍用四物湯偏在右佐以四君子湯左右俱病佐以八珍湯並虎骨膠丸此治真中之大法

也。

口噤角弓反張。痙病也。但口噤而兼反張者。是已成痙也。小續命湯。口噤而不反張者。是未成痙也。大秦艽湯。其痙病俱見前傷寒兼症中。宜細加查核。

不語有心脾腎三經之異。又有風寒客于會厭。卒然無音者。大法若因痰迷心竅。當清心火。牛黃丸。神仙解語丹。若因風痰聚于脾經。當導痰涎。二陳湯加竹瀝薑汁。並用解語丹。若因腎經虛火。土炎當壯水之主。六味湯加遠志石菖蒲。若因腎經虛寒。

通當益火之源。劉河潤地黃飲子。或用虎骨膠丸加鹿茸。若風寒客于會厭。聲音不揚者。用甘桔湯加疎散藥。

遺尿謂之腎絕。多難救。然反目遺尿者爲腎絕。若不反目。但遺尿者。多屬氣虛。重用參蓍等藥補之。則愈。

桂枝湯 葛根湯 小柴胡湯俱見傷寒

搐鼻散 治一切中症。不醒人事。用此吹鼻中。有嚏者生。無嚏者難治。

細辛去葉 皂角去皮弦各一兩 半夏生用五錢

爲極細末、磁瓶收注、勿泄氣、臨用吹一二分入鼻孔中取嚏。
牛黃丸 治中風痰火閉結、或瘓癰癱瘓、語言蹇澁、恍惚眩暈、
精神昏憤、不省人事、或喘嗽痰壅、煩心等症。

牛黃 六錢

射香

龍腦

以上三味另研

羚羊角

當歸

酒洗

防風

黃芩

柴胡

白术

麥冬

去心

白芍

各七錢

桔梗

白茯苓

杏仁

去皮尖

川芎

大豆黃卷

阿膠

各八錢

蒲黃

人參

去蘆

神曲

各一兩二錢五分

雄黃另研

甘草二兩

五錢

白斂

肉桂去皮

乾薑

各三錢

犀角銚一兩

乾山藥三兩

大棗五十枚蒸

兩

爛去皮核

核

金箔

六伯五十片內存二伯片爲衣

爲細末、煉蜜同棗膏丸、每兩作十丸、用金箔爲衣、每服一丸、溫水化下。

三化湯 治中風入臟、熱勢極盛、閉結不通、便溺阻隔不行、乃
風火相搏而爲熱風者、本方主之、設內有寒氣、大便反鞭、名
曰陰結、陰結者得和氣緩日寒冰自化、不可誤用攻藥、誤卽

不能復救慎之慎之。

厚朴姜汁炒 大黃酒蒸

枳實麪炒、羌活各一錢五分

水煎服

附子理中湯見中寒

治寒風中臟陰冷極盛脫症隨見此風

水相遭而爲寒風者急服此藥猶可得生夫病屬脫症設誤用疏通開竅之藥如人旣入井而又加之以石也必須參附大劑飲之方爲合法

三生飲、治寒風中臟六脈沉細痰壅喉響不省人事乃寒痰

厥逆之候。

生南星

生烏頭

去皮尖

生附子

各一錢
五分

生姜

五片

生木香

五分

水煎服。薛立齋云。三生飲乃行經絡治寒痰之良藥。斬關奪旗之神劑。每服必用人參兩許。駕馭而行。庶可驅外邪而補真氣。否則不惟無益。適以取敗。觀先哲用蓍附术附參附等湯。其義可見。

大秦艽湯 治風中經絡口眼歪斜半身不遂或語言蹇澁乃

血弱不能養于筋、宜用養血疏風之劑、經云、治風先治血、血行風自滅、是也。

秦艽一錢

甘草炙

川芎

當歸

芍藥

生地

熟地

自製

茯苓

羌活

獨活

白术

防風

白芷

黃芩

酒炒各八分

細辛二分

水煎服、如或煩燥口渴、加石膏一錢五分、陰雨、加生薑三片、春夏加知母八分、

竊謂本方初時宜用。若日久。則以四物四君爲主。而以風藥佐之。庶收全功。

四物湯

四君子湯

八珍湯

俱見虛症

虎骨膠丸

見癰症

小續命湯

見傷寒發癰

神仙解語丹

白附子 炮

石菖蒲 去毛

遠志 去心

甘草 水泡炒

天麻

全蝎 去尾足
草水洗

羌活

南星 牛胆製多次
更佳各一兩

木香 五錢

右爲末、麪糊丸、龍眼大、每服一丸、薄荷湯下、

二陳湯

陳皮

茯苓

半夏

姜汁炒熟

甘草

炙各一錢五分

薑一片、大棗二枚、水煎服、

六味湯

見後類中門

地黃飲子

熟地九蒸晒
二錢 巴戟去心
一錢 山萸肉去核
一錢 肉蓯容焙
一錢 酒浸

石斛

附子炮
一錢

五味子杵炒
一錢 白茯苓各一
錢

石菖蒲去毛桂心

麥冬去心

遠志

去心甘草水泡炒各五分

入薄荷少許薑一片棗二枚水煎服。氣虛加人參二錢。

甘桔湯見傷寒咽痛

類中風

類中風者謂火中虛中濕中寒中暑中氣中食中惡中也。共有一八種與真中相類而實不同也。然類中有與真中相兼者須細察其形症而辨之。凡真中之症必連經絡多見歪斜偏廢之候與類中之專氣致病者自是不同。然而風乘火勢邪乘虛入寒。

風相搏暑風相炫飲食招風種種變症所在多有務在詳辨精
細果其爲真中也則用前驅風法果其爲類中也則照本門施
治果其爲真中類中相兼也則以兩門醫法合治之斯無弊耳
茲舉類中諸症詳列於左俾學者觸目洞然也

一曰火中火之自外來者名曰賊寢火也火之自內出者名曰
子虛火也中火之症良由將息失宜心火暴盛腎水虛衰不
能制之故卒然昏倒不可作寢火論假如怒動肝火逍遙散
心火鬱結牛黃清心丸肺火壅遏貝母瓜蔞散思慮傷脾加

味歸脾湯。腎水枯涸。虛火上炎者。六味地黃湯。若腎經陽虛。
火不歸原者。八味地黃湯。劉河潤地黃飲子並主之。此治火
中之法也。或問火中而用桂附者何也。答曰。腎陽飛越。則丹
田虛冷。其痰涎上壅者。水不歸原也。面赤煩躁者。火不歸原
也。惟桂附八味能引火歸原。火歸水中。則水能生木。木不生
風。而風自熄矣。

二曰虛中。凡人體質虛弱。過于作勞。傷損元氣。以致痰壅氣浮。
卒然昏倒。宜用六君子湯主之。中氣下陷者。補中益氣湯主。