

2010^年 护士执业资格考试 模拟试卷

崔景晶 于秀荣 王梅林 主编

- ◆ 包含仿真试卷 5 套
- ◆ 覆盖历年高频考点



提高复习效率 掌握考试重点



化学工业出版社
生物·医药出版分社

2010^年 护士执业资格考试 模拟试卷

崔景晶 于秀荣 王梅林 主编



化学工业出版社
生物·医药出版分社

· 北京 ·

本书紧扣最新考试大纲,各科目占分比例、题型与真题相同,难度以近3年真题的平均难度为准,高频率出现的考点覆盖率达到75%。本书可帮助考生在较短的时间内,全面掌握重要考点、迅速提高应试能力。本书适合参加护士执业资格考试的考生参考。

图书在版编目(CIP)数据

2010年护士执业资格考试模拟试卷/崔景晶,于秀荣,王梅林
主编. —北京:化学工业出版社,2010.1
ISBN 978-7-122-07173-6

I. 2… II. ①崔…②于…③王… III. 护士-资格考核-习题
IV. R192.6-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第213488号

责任编辑:赵兰江 蔡红
责任校对:吴静

装帧设计:关飞

出版发行:化学工业出版社 生物·医药出版分社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印装:北京云浩印刷有限责任公司
787mm×1092mm 1/16 印张9¼ 字数264千字 2010年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:23.00元

版权所有 违者必究

前言

根据《中华人民共和国执业护士法》，卫生部制定并实施了护士资格考试制度，自 1995 年起每年举行一次执业护士资格考试。国家进行护士执业资格考试的目的是全面提高护理人员的护理水平，限制不合格护理人员从事护理行业，其最终目标是确保从业护士为病人提供高水平的优质护理服务。

护士执业资格考试的主要内容为护理基本理论、基本知识、基本技能，涉及内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、护理学基础 5 门课程。为此，我们组织了各专业富有经验的护理学教师，针对本次考试编写了该书，使考生体验考试的题型和难度，同时复习、掌握重要的考点。

“紧扣新编大纲、覆盖考点率高、题型难度均衡、注重简洁时效”是本书的特点。本书紧扣 2010 年卫生部护理资格考试委员会和国家医学考试中心修订的考试大纲，根据考试范围准确把握历年考点，高频率出现的考点覆盖率达到 75%，各科目占分比例和题型严格按照真题标准，难易度以近 3 年真题的平均难度为准，用最为简洁的语言，尽可能少的篇幅，使考生在尽可能短的时间内，全面掌握重要考点、迅速提高应试能力、轻松应对资格考试。

为了迅速提高考生应试水平和顺利通过考试，我们从各个方面做了不懈地努力，由于时间比较紧，编写内容多，疏漏之处在所难免，还恳请同行专家和广大考生批评指正。

最后，衷心祝愿考生朋友们顺利通过本次考试，成为一名优秀的白衣天使！

编者
2009 年 12 月

目 录

模拟试卷（一）	1	模拟试卷（四）	80
基础知识	1	基础知识	80
相关专业知识	7	相关专业知识	86
专业知识	13	专业知识	92
专业实践技能	20	专业实践技能	99
模拟试卷（二）	27	模拟试卷（五）	106
基础知识	27	基础知识	106
相关专业知识	33	相关专业知识	112
专业知识	39	专业知识	118
专业实践技能	47	专业实践技能	125
模拟试卷（三）	54	参考答案	132
基础知识	54	模拟试卷（一）	132
相关专业知识	60	模拟试卷（二）	134
专业知识	67	模拟试卷（三）	135
专业实践技能	73	模拟试卷（四）	137
		模拟试卷（五）	139

模拟试卷 (一)

基础知识

一、以下每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 支气管哮喘发作最常见的诱因是
A. 药物
B. 感染
C. 气候
D. 精神因素
E. 剧烈活动
2. 尿液外观呈洗肉水样、血样或有血凝块时称为
A. 镜下血尿
B. 肉眼血尿
C. 管型尿
D. 蛋白尿
E. 尿量异常
3. 下列药物需要避光滴注的是
A. 硝普钠
B. 硝酸甘油
C. 酚妥拉明
D. 氨茶碱
E. 多巴胺
4. 关于铁剂的叙述不正确的是
A. 口服液体铁剂最好用吸管
B. 胃酸缺乏会引起铁吸收障碍
C. 服铁剂时要避免使用抗酸药
D. 铁剂可引起恶心、腹泻、便秘
E. 右旋糖酐铁是最常用的口服铁剂
5. 环磷酰胺主要的不良反应是
A. 心脏损害
B. 脱发
C. 胃肠道反应
D. 出血性膀胱炎
E. 口腔溃疡
6. 系统性红斑狼疮属于
A. 自身免疫性疾病
B. 组织炎症性疾病
C. 感染性疾病
D. 地理环境性疾病
E. 多种药物所致疾病
7. 判断病人为浅昏迷的主要依据是
A. 无任何自主运动
B. 一切反射均消失
C. 强烈疼痛刺激可出现痛苦表情
D. 对声、光等刺激无反应
E. 全身肌肉松弛
8. 咯血致死的主要原因为
A. 肺不张
B. 肺部感染
C. 情绪紧张
D. 窒息
E. 左心衰
9. 心前区疼痛最常见的原因
A. 心绞痛、心肌梗死
B. 心包炎
C. 心血管神经症
D. 胸膜炎累及心包
E. 胸膜炎累及胸膜壁层
10. 当大便次数每天超过 () 次, 便质稀薄, 容量及水分增加时称为腹泻
A. 5 次
B. 6 次
C. 4 次
D. 3 次
E. 2 次
11. 在我国引起肝硬化的主要原因是
A. 日本血吸虫病
B. 酒精中毒
C. 胆汁淤积
D. 循环障碍
E. 病毒性肝炎
12. 尿路刺激征不包括
A. 尿频
B. 尿痛
C. 多尿
D. 尿急

- E. 排尿不尽感
13. 与支气管哮喘发作有关的免疫球蛋白是
A. IgA B. IgG
C. IgE D. IgD
E. IgM
14. 在引起消化性溃疡的损害因素中, 占主导地位的是
A. 胃酸-胃蛋白酶 B. 幽门螺杆菌感染
C. 非甾体类抗炎药 D. 饮食失调
E. 精神因素
15. 再生障碍性贫血时禁用
A. 青霉素 B. 氯霉素
C. 达那唑 D. 林可霉素
E. 新鲜冷冻血浆
16. 体重超过标准体重的 () 称肥胖
A. 10% B. 20%
C. 30% D. 40%
E. 35%
17. 哪项属于引起脑血管疾病的可干预的因素
A. 饮食因素 B. 年龄
C. 性别 D. 种族
E. 家族遗传性
18. 抗癫痫药物苯妥英钠适宜的服药时间是
A. 晨起服用 B. 饭前服用
C. 饭后服用 D. 随饭吞服
E. 任意时间
19. 大叶性肺炎最常见的致病菌是
A. 克雷白杆菌 B. 肺炎球菌
C. 铜绿假单胞菌 D. 葡萄球菌
E. 肺炎支原体
20. 不属于系统性红斑狼疮的病因是
A. 环境因素 B. 遗传
C. 病毒 D. 性激素
E. 生活习惯
21. 剧烈频繁的呕吐不可能导致机体
A. 丢失大量的胃液
B. 电解质紊乱
C. 血液检查血红蛋白含量下降
D. 脱水
E. 营养障碍
22. 外科病人最易发生哪种体液代谢失调
A. 等渗性脱水 B. 高渗性脱水
C. 低渗性脱水 D. 慢性水中毒
E. 急性水中毒
23. 有效循环血量是指
A. 全身的血容量
B. 机体维持正常代谢所需要的血量
C. 单位时间内在心血管系统进行循环的血量
D. 在肝、脾、淋巴窦中贮存的血量
E. 以上都不是
24. 腰麻术后去枕平卧 6h 是为防止
A. 头痛 B. 血压下降
C. 恶心、呕吐 D. 呼吸抑制
E. 意外情况发生
25. 关于胸外心脏按压, 下列错误的是
A. 成人患者按压部位为胸骨中、下 1/3 交界处
B. 成人患者按压频率为大于 100 次/分
C. 成人患者按压的深度为胸骨下陷 4~5cm
D. 幼儿患者按压的深度为胸骨下陷 2~3cm
E. 幼儿患者按压部位为胸骨中点
26. 外科营养支持病人的营养液配制后冷藏的有效期为
A. 2h B. 4h
C. 8h D. 12h
E. 24h
27. 下列哪一种是闭合性损伤
A. 擦伤 B. 刺伤
C. 挫伤 D. 切割伤
E. 裂伤
28. 急性感染患者病程一般发生在几周内
A. 2 周内 B. 1 月内
C. 3 周内 D. 在 3 周至 2 月内
E. 4 周内
29. 浅 II 度烧伤创面特点
A. 水疱基底苍白 B. 水疱基底潮红
C. 皮肤干燥、红斑 D. 创面焦黄失去弹性
E. 树枝状栓塞静脉
30. 测得基础代谢率是 +40%, 则甲状腺功能为
A. 正常 B. 轻度甲亢
C. 中度甲亢 D. 重度甲亢
E. 偏低
31. 急性乳腺炎感染细菌大多数是
A. 变形杆菌 B. 大肠杆菌
C. 金黄色葡萄球菌 D. 白色葡萄球菌
E. 溶血性链球菌
32. 下列急性腹膜炎的临床表现最有诊断价值的是
A. 持续性腹痛 B. 肠鸣音减弱

- C. 移动性浊音 D. 腹膜刺激征
E. 腹胀、呕吐
33. 与原发性肝癌的发生关系最密切的是
A. 脂肪肝 B. 肝炎后肝硬化
C. 血吸虫感染 D. 酒精中毒
E. 营养障碍
34. 急性胰腺炎的常见致病因素是
A. 适量饮酒 B. 胆道疾病
C. 消化性疾病 D. 十二指肠反流
E. 不良饮食
35. 血栓闭塞性脉管炎的护理, 正确的是
A. 适量吸烟 B. 可穿高跟鞋
C. 避免肢体活动 D. 患肢用热水袋加温
E. 测皮温、观察疗效
36. 头皮外伤后, 出血易扩散的疏松结缔组织层是
A. 皮肤 B. 皮下组织
C. 帽状腱膜层 D. 帽状腱膜下层
E. 颅骨骨膜
37. 下列哪项是开放性气胸的主要病理生理变化
A. 反常呼吸运动
B. 纵隔摆动
C. 进行性伤侧肺压缩
D. 呼吸无效腔增加
E. 血氧分压下降
38. 食管癌切除应包括肿瘤上下端的长度是
A. 3cm B. 5cm
C. 7cm D. 8cm
E. 9cm
39. 膀胱镜检查后病人出现血尿和疼痛, 下列哪项处理不妥
A. 给止痛药
B. 给镇静、安定药
C. 嘱少饮水, 减少排尿
D. 卧床休息
E. 用抗生素
40. 新鲜骨折是指骨折后
A. 2周内 B. 3周内
C. 4周内 D. 5周内
E. 6周内
41. 下述哪项不属于胎儿附属物
A. 胎盘 B. 子宫肌壁
C. 胎膜 D. 脐带
E. 羊水
42. 分娩过程中最主要的产力是
A. 腹压 B. 膈肌收缩力
C. 肛提肌收缩力 D. 子宫收缩力
E. 腹肌收缩力
43. 自然流产按照发展的不同阶段分为几种临床类型, 其中不包括
A. 习惯性流产 B. 难免流产
C. 完全流产 D. 不全流产
E. 先兆流产
44. 活跃期停滞是指
A. 活跃期胎头下降速度每小时小于 1cm
B. 活跃期超过 16h
C. 活跃期超过 8h
D. 进入活跃期后, 胎头不再下降达 2h 以上
E. 进入活跃期后, 宫口不再扩张达 2h 以上
45. 输卵管妊娠最常见的原因是
A. 输卵管发育不良 B. 内分泌失调
C. 输卵管炎症 D. 输卵管功能异常
E. 输卵管手术史
46. 关于骨盆的说法不恰当的是
A. 骨盆前浅后深, 其大小、形态直接影响分娩
B. 骨盆入口平面呈横椭圆形
C. 骨盆出口平面是最狭窄的平面
D. 中骨盆平面呈纵椭圆形
E. 坐骨棘是胎先露下降位置的重要标志点
47. 外阴阴道假丝酵母菌病的诱因不包括
A. 妊娠 B. 糖尿病
C. 长期应用雌激素 D. 肥胖
E. 长期哺乳
48. 有关女性生殖系统自然防御功能的说法不正确的是
A. 两侧大阴唇自然合拢
B. 碱性黏液栓塞宫颈管, 且宫颈内口紧闭
C. 阴道口闭合, 阴道前后壁紧贴
D. 输卵管纤毛向伞端方向摆动和输卵管的蠕动
E. 子宫内膜周期性剥脱
49. 新生儿生理性黄疸的原因应除外
A. 红细胞量多, 寿命短
B. 肝脏 Y、Z 蛋白含量少
C. 肝脏葡萄糖醛酸转移酶活性低下
D. 肠道葡萄糖醛酸苷酶活性低
E. 肝细胞排泄胆红素的能力低下
50. 新生儿寒冷损伤综合征病因不包括

- A. 棕色脂肪少 B. 体表面积相对较大
C. 寒冷损伤 D. 免疫功能低下
E. 皮下脂肪饱和脂肪酸含量较多
51. 引起鹅口疮的病原体为
A. 链球菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 白色念珠菌
D. 铜绿假单胞菌 (绿脓杆菌)
E. 大肠杆菌
52. 小儿肺炎病理生理变化中, 最重要的改变为
A. 低氧血症 B. 酸碱代谢失衡
C. 毒血症 D. 脏器功能异常
E. 肺水肿
53. 引起小儿营养不良最常见的病因为
A. 饮食因素 B. 急慢性传染病
C. 迁延性腹泻 D. 发热性疾病
E. 免疫缺陷
54. 水痘病毒属于
A. 肠道病毒 B. 副黏病毒
C. 疱疹病毒 D. 流感病毒
E. 以上都不是
55. 2岁以前小儿呼吸运动的主要形式为
A. 胸式呼吸 B. 腹式呼吸
C. 胸腹式呼吸 D. 肋间肌呼吸
E. 辅助呼吸肌呼吸
56. 小儿重症肺炎的特点为
A. 肺部啰音明显
B. 呼吸道症状重
C. 伴有神经、循环及消化系统和全身中毒症状
D. $WBC > 20 \times 10^9/L$
E. 病原多为金黄色葡萄球菌
57. 某患者于中午进餐后, 晚6时左右出现上腹痛, 伴呕吐。查体: 体温 $37.7^\circ C$, 上腹部压痛明显, 无放射痛, 肠鸣音亢进, 血、便常规正常。该患者最可能患有以下哪种疾病
A. 急性胃炎 B. 急性胰腺炎
C. 急性胆囊炎 D. 急性肠炎
E. 胃溃疡
58. 某肺炎球菌肺炎病人病程延长, 在抗生素治疗下体温退后复升, 白细胞持续上升, 应考虑
A. 抗生素剂量不足 B. 细菌产生耐药性
C. 并发症存在 D. 休克先兆
E. 机体抵抗力低下
59. 某原发性高血压2级病人, 突然血压升至 $230/130mmHg$, 伴剧烈头痛、恶心、呕吐、抽搐及嗜睡, 应考虑发生
A. 高血压危象
B. 高血压脑病
C. 短暂性脑缺血发作
D. 脑栓塞
E. 脑出血
60. 王女士因失血性休克入院, 经抢救后给予留置导尿, 24h内引流尿液350ml, 此状况属于
A. 少尿 B. 尿潴留
C. 尿量正常 D. 无尿
E. 尿量偏少
61. 某糖尿病患者, 早餐前1h皮下注射胰岛素, 易发生低血糖的时间是
A. 晚餐前 B. 晨起时
C. 中餐前 D. 夜间
E. 早餐前
62. 一病人因高热2天未能进食, 自述口渴、口干、尿少色黄, 查体: 脱水征, 尿比重1.028, 血清钠浓度为 $157mmol/L$ 。治疗首选应先给
A. $3\% \sim 5\%$ 的高张盐水
B. 5% 碳酸氢钠
C. 5% 葡萄糖溶液
D. 葡萄糖盐水
E. 平衡液
63. 患者, 女性, 30岁。甲状腺手术后声音嘶哑, 是下列哪项损伤引起
A. 喉上神经损伤 B. 喉返神经损伤
C. 甲状旁腺误切 D. 气管误伤
E. 甲状腺切除过多
64. 患者, 女性, 27岁。产后3周体温升高, 右侧乳房疼痛, 局部红肿, 有波动感。最主要的处理措施是
A. 吸乳器排出 B. 33% 硫酸镁湿敷
C. 局部物理疗法 D. 及时切开引流
E. 全身应用抗生素
65. 患者, 男性, 63岁。患有肝硬化2年, 近半年来全身乏力、纳差, 经常有牙龈、鼻出血及全身皮肤黏膜的出血点。检查: 脾轻度肿大。分析造成出血倾向的主要原因是
A. 毛细血管脆性增加
B. 肝脏对激素的灭活作用减弱

C. 白蛋白合成减少

D. 营养缺乏

E. 脾功能亢进

66. 患者, 男性, 60岁。下肢静脉高位结扎及剥脱术后5h, 因站立引起小腿伤口出血不止。紧急的处理方法是

A. 用止血带止血 B. 指压止血

C. 站立位包扎 D. 手术止血

E. 让病人平卧, 抬高患肢, 加压包扎

67. 某产妇, 经阴顺产一女婴, 产后第4天, 双乳房胀痛, 乳汁排流不畅, 最常见的原因是

A. 进食少

B. 卧床时间长、活动少

C. 未及早按摩、热敷乳房

D. 未给新生儿早吸吮、多吸吮

E. 乳头凹陷

68. 某孕妇, 孕38周, 头先露, 临产10h后, 助产娩出一体重2800g活女婴。15min后胎盘娩出, 子宫间歇性出血300ml, 检查: 胎盘胎膜完整, 宫体柔软, 呈袋状, 经按摩后宫缩好转, 出血量减少, 检查宫颈未见损伤, 阴道伤口出血不多。产后出血原因最可能是

A. 软产道损伤 B. 子宫收缩乏力

C. 胎盘、胎膜残留 D. 凝血功能障碍

E. 子宫循环血量增多

69. 李某, 女, 28岁。因“足月妊娠”入院。经测量, 孕妇坐骨结节间径为8cm, 被告知“出口横径狭窄”, 病人询问正常出口横径的正常值, 其平均值应为

A. 11cm B. 10cm

C. 9.5cm D. 9cm

E. 8.5cm

70. 一新生儿, 男, 胎龄32周。生后1周。外周血血红蛋白140g/L。其母咨询补充铁剂的时间。

A. 立即开始 B. 生后1个月

C. 生后2个月 D. 生后3个月

E. 无需补充

71. 患儿女, 4个月。体重6kg。生后不久即出现腹泻, 大便每天4~5次, 黄色稀糊状, 无特殊臭味, 食欲好, 无呕吐, 母乳喂养, 未加辅食。腹泻原因最可能为

A. 生理性腹泻 B. 慢性腹泻

C. 迁延性腹泻 D. 真菌性肠炎

E. 病毒性肠炎

72. 患儿女, 1岁。因发热、拒食3天就诊。查体: 精神不振, 咽部充血, 咽腭弓软腭可见疱疹。心肺听诊无异常。诊断疱疹性咽峡炎。病原体为

A. 呼吸道合胞病毒 B. 腺病毒

C. 流感病毒 D. 柯萨奇病毒

E. 冠状病毒

二、以下提供若干个案例, 每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息, 在每道下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(73~75题共用病例)

李女士50岁, 有冠心病病史, 在搬运重物时突然感到胸骨后堵塞、烧灼感, 并伴有大汗淋漓、面色苍白、表情焦虑, 查体: 血压170/95mmHg, 心率明显增快。

73. 据以上症状可初步诊断李女士为

A. 胃肠炎 B. 心绞痛

C. 心力衰竭 D. 心肌梗死

E. 低血糖反应

74. 李女士以上症状的诱因是

A. 体力活动 B. 情绪激动

C. 寒冷 D. 年老体弱

E. 不能确定

75. 正确的护理措施是

A. 休息含服硝酸甘油

B. 口服广谱消炎药

C. 口服地高辛

D. 给予高渗糖

E. 观察病情

(76~78题共用病例)

男性, 28岁, 自述突然心慌、胸闷, 听诊心率200次/分, 心律齐, 血压正常。

76. 你考虑病人是

A. 窦性心动过速 B. 室上性心动过速

C. 室性心动过速 D. 房颤

E. 室颤

77. 若该病人病情发作持续时间较长, 病史尚不清楚, 你采取何种较简单有效的治疗措施

A. 刺激呕吐反射或嘱屏气

B. 静脉注射去乙酰毛花苷K(西地兰)

C. 静脉注射新福林

D. 静脉注射利多卡因

E. 口服阿托品

78. 若用心电示波监护该病人时, 荧光屏上突然出现完全不规则的大波浪曲线, 且 QRS 波与 T 波消失。你考虑下列哪项处理措施不妥

A. 严密观察病情变化

B. 可于心内注射利多卡因

☒ C. 可施行同步电除颤

☒ D. 可施行非同步电除颤

E. 立即做胸外心脏按压和口对口人工呼吸

(79~80 题共用病例)

病人, 女性, 56 岁。有胆总管结石病史, 今早进食油腻食物后, 突然出现腹痛、发热、黄疸, 精神不好, 血压下降, 病情进展迅速。

79. 该病人最可能的诊断是

A. 急性梗阻性化脓性胆管炎

B. 急性胆管炎

C. 急性胆囊炎

D. 急性胰腺炎

E. 急性坏死性肠炎

80. 该病人的处理原则是

A. 急诊手术治疗

B. 边抗休克, 边手术

C. 抗休克治疗

D. 抗生素治疗

E. 营养支持治疗

(81~83 题共用病例)

患者, 男性, 38 岁。与朋友聚餐后突发上腹部剧烈疼痛, 后转为右下腹并伴有固定压痛点, 诊断为“急性阑尾炎”, 准备手术治疗。

81. 急性阑尾炎腹痛起始于脐周或上腹的机制是

A. 胃肠功能紊乱 B. 内脏神经反射

C. 躯体神经反射 D. 阑尾位置不定

E. 阑尾管壁痉挛

82. 急诊手术前, 正确的是

A. 禁食 12h, 禁饮 4h

B. 半卧位, 应用抗生素

C. 肌注镇痛药

D. 肥皂水灌肠通便

E. 右下腹皮肤准备

83. 手术后 24h 内, 最常见的并发症是

A. 切口裂开

B. 切口感染

C. 盆腔脓肿

D. 门静脉炎

E. 腹腔内出血

(84~86 题共用病例)

患儿女, 6 个月。8 个月早产, 出生体重 2200 克, 母乳喂养, 现体重 8kg。家长发现孩子多汗、夜惊。查体: 精神好, 前囟 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$, 平软, 可见枕秃, 心肺听诊无异常。

84. 最可能的诊断为

A. 先天性甲状腺机能低下

B. 软骨营养不良

C. 维生素 A 缺乏

D. VitD 缺乏性佝偻病

E. 营养不良

85. 该病最主要的病因为

A. 日光照射不足 B. 生长发育迅速

C. 慢性腹泻 D. 药物影响

E. 人工喂养

86. 学龄前期和学龄期儿童惊厥的常见病因应除外

A. 颅脑外伤

B. 脑肿瘤

C. 脑脓肿

D. 癫痫

E. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症

三、以下提供若干组考题, 每组考题共使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题关系密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次, 多次或不被选择。

(87~89 题共用备选答案)

A. 肾小球滤过率降低

B. 肾小管重吸收增加

C. 大量白蛋白丢失

D. 继发性醛固酮增多

E. 继发性心功能不全

87. 急性肾小球肾炎水肿的主要原因是

88. 原发性肾病综合征水肿的最主要原因是

89. 原发性高血压水肿可能的原因是

(90~92 题共用备选答案)

A. 嗜睡

B. 意识模糊

C. 昏睡

D. 浅昏迷

E. 深昏迷

90. 病人出现错觉、幻觉属于

91. 病人无意识, 但瞳孔对光反应等仍存在属于

92. 病人不易唤醒, 但压迫眶上神经可醒属于

(93~95 题共用备选答案)

A. 肝肿大

- B. 脾功能亢进
C. 腹水
D. 食管、胃底静脉曲张
E. 内分泌失调
93. 肝硬化最突出的临床表现是
94. 肝硬化失代偿期常出现鼻、牙龈出血，其原因是
95. 肝硬化失代偿期出现肝掌、蜘蛛痣，其原因是
- (96~99 题共用备选答案)
- A. 胎产式 B. 胎先露
C. 胎方位 D. 胎姿势

- E. 胎儿
96. 胎儿纵轴与母体纵轴之间的关系
97. 最先进入母体骨盆入口的胎儿部分
98. 胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系
(99~100 题备选答案)
- A. 先天性铁储存不足
B. 铁摄入不足
C. 铁丢失过多
D. 铁吸收减少
E. 生长发育快
99. 6 月~2 岁小儿发生缺铁的内因主要是
100. 青春期少女发生缺铁的主要原因

相关专业知 识

一、以下每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 判断结核菌素试验结果的最重要指标是
- A. 红斑直径 B. 风团大小
C. 硬结直径 D. 发疹时间
E. 有无水泡
2. 降糖作用最强的药物是
- A. 优降糖 B. D860
C. 达美康 D. 糖适平
E. 降糖灵
3. 腹部触诊有揉面感可见于
- A. 肝硬化 B. 肝性昏迷
C. 严重脱水 D. 饥饿
E. 结核性腹膜炎
4. 缺铁性贫血最重要的治疗是
- A. 少量输血 B. 病因治疗
C. 补充铁剂 D. 补充维生素 C
E. 脾切除
5. 肝性脑病合并碱中毒时应选用
- A. 谷氨酸 B. 精氨酸
C. 鸟氨酸 D. 色氨酸
E. 半胱氨酸
6. 评估急性肾盂肾炎最有意义的检查是
- A. 尿红细胞计数 B. 中段尿培养
C. 酚红排泄试验 D. 尿酸碱度
E. 血尿素氮
7. 诊断肺心病的主要依据是

- A. 肺动脉高压及右心室肥厚
B. 肺性脑病
C. 肺气肿体征
D. 长期慢支及肺部疾病史
E. 心电图见“肺型 P 波”
8. 可提示左心衰竭的脉搏是
- A. 脉搏短绌 B. 缓脉
C. 奇脉 D. 交替脉
E. 水冲脉
9. 听诊时于心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音为
- A. 二尖瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全
C. 主动脉瓣狭窄 D. 主动脉瓣关闭不全
E. 三尖瓣关闭不全
10. 临床上容易观察发绀的部位是
- A. 手掌 B. 口唇
C. 胸部 D. 腹部
E. 四肢
11. 胸廓饱满，前后径与左右径约相等，肋间隙增宽，称为
- A. 鸡胸 B. 扁平胸
C. 漏斗胸 D. 桶状胸
E. 胸廓膨隆
12. 做尿常规检查应留取
- A. 12h 尿液
B. 24h 尿液，加入 5ml 甲苯防腐
C. 新鲜尿液
D. 24h 尿液，加入 5ml 浓盐酸防腐
E. 24h 尿液，检查前低蛋白饮食 3 天
13. 尿蛋白定性检查，蛋白增多常见于

- A. 心脏病
B. 肾脏病
C. 慢性阻塞性肺疾病
D. 脑部损伤
E. 食入蛋白过多
14. 血中白蛋白/球蛋白的正常比例为
A. (1~2):1 B. (1.5~2):1
C. (3~4):1 D. (1.5~2.5):1
E. (1.5~3.5):1
15. 胆囊或胰腺超声检查应禁食
A. 4h B. 6h
C. 8h D. 12h
E. 24h
16. 氨茶碱应用的护理哪项错误
A. 不宜肌内注射
B. 饭后服用可减轻胃肠道反应
C. 静脉注射浓度不宜过高
D. 注射时间不宜超过 10min
E. 急性心肌梗死及血压降低者禁用
17. 诊断肺结核最可靠的依据是
A. 胸片 B. 痰菌检查
C. 血沉检查 D. CT 检查
E. 纤维支气管镜检查
18. 能反映取血前 8~12 周血糖水平的检查是
A. 血糖 B. 尿糖
C. 血脂 D. 尿酮体
E. 糖化血红蛋白
19. 左心衰竭肺淤血的护理诊断是
A. 气体交换受损 B. 活动无耐力
C. 组织灌注不良 D. 营养失调
E. 皮肤完整性受损
20. 治疗风湿性心瓣膜病的根本方法是
A. 保护心功能
B. 改善心功能
C. 手术, 如二尖瓣分离术
D. 积极预防风湿活动
E. 控制风湿活动
21. 吸气性呼吸困难病人典型体征是
A. 呼吸困难“三凹征”
B. 肺部听诊湿啰音
C. 发绀
D. 桶状胸
E. 哮鸣音
22. 下列哪项不是引起呼吸性酸中毒的原因
A. 重度肺气肿 B. 严重气胸
C. 镇静药过量 D. 呼吸机使用不当
E. 剧烈疼痛
23. 护理全麻未清醒的病人, 最重要的是
A. 约束肢体, 防止躁动
B. 保持呼吸道通畅
C. 防止输液针头脱出
D. 保暖
E. 测血压、脉搏、呼吸
24. 洗手护士与巡回护士共同的责任是
A. 术前准备器械 B. 术中输液
C. 术中传递器械 D. 术后清点器械
E. 术后刷洗器械
25. 不符合急性肾衰特点的有
A. 肾实质破坏 B. 高血钾
C. 高钙 D. 高磷
E. 少尿
26. 以下不属于肠外营养静脉置管后输液期间并发的
A. 感染 B. 代谢紊乱
C. 导管移位 D. 血栓性浅静脉炎
E. 脂肪栓塞
27. 软组织急性化脓性感染, 在出现波动前, 需早期切开引流的是
A. 转移性脓肿 B. 脓性指头炎
C. 面部疖肿 D. 急性蜂窝织炎
E. 疖
28. 宜用 5% 氯化钠溶液做湿敷的创面是
A. 浅平、干净创面
B. 肉芽组织水肿创面
C. 脓液分泌物较多的创面
D. 铜绿假单胞菌感染的创面
E. 慢性顽固性溃疡创面
29. 乳腺癌的主要转移途径是
A. 直接浸润 B. 淋巴转移
C. 血行转移 D. 种植转移
E. 以上都不是
30. 嵌顿性疝与绞窄性疝最主要的不同点是
A. 疝内容物能否回纳
B. 疝块大小
C. 有无腹痛
D. 腹痛程度
E. 有无疝内容物血循环障碍
31. 倾倒综合征患者的饮食治疗中不正确的是
A. 少食多餐 B. 餐后散步
C. 高蛋白饮食 D. 餐时限制饮水

- E. 避免过甜、过咸食物
32. 给急腹症患者行直肠指检, 如指套染有血性黏液应考虑
- A. 急性阑尾炎 B. 急性胆囊炎
C. 急性胰腺炎 D. 消化道出血
E. 绞窄性肠梗阻
33. 内痔患者护理中, 与预防便秘的措施无关的是
- A. 每天坚持适当活动
B. 多饮水、多吃蔬菜
C. 养成每天定时排便的习惯
D. 坚持每晚肛门坐浴
E. 忌酒和辛辣食物
34. 对肝癌的定性诊断具有较高特异性的检查是
- A. 放射性核素肝扫描
B. B超
C. CT
D. 血清甲胎蛋白测定
E. 选择性肝动脉造影
35. 早期胰腺癌首选的治疗方法是
- A. 胰头十二指肠切除术
B. 化疗
C. 放疗
D. 栓塞治疗
E. 中西医结合治疗
36. 下肢静脉曲张剥脱术后护理, 哪项正确
- A. 卧床休息 10 天 B. 患肢制动
C. 只允许床上活动 D. 早期下床活动
E. 1 周后方可行走
37. 抢救重症颅脑损伤的病人, 首先采取的护理措施是
- A. 冬眠疗法 B. 应用脱水药
C. 保持呼吸道通畅 D. 早期应用抗生素
E. 高压氧治疗
38. 膀胱内充满尿液, 其压力增高, 迫使少量尿液自尿道口溢出, 称为
- A. 真性尿失禁 B. 尿潴留
C. 尿痿 D. 充盈性尿失禁
E. 尿频
39. 气胸穿刺部位是
- A. 伤侧锁骨中线第 2 肋间
B. 腋中线和腋后线中间 6~8 肋间
C. 伤侧锁骨中线第 6~8 肋间
D. 腋中线和腋后线中间 3~4 肋间
E. 腋中线和腋后线中间 7~10 肋间
40. 脊柱骨折的病人急救运送方法, 正确的是
- A. 用软担架搬运
B. 三人平托放于硬板抬送
C. 二人抱持搬运
D. 一人抱持搬运
E. 一人背负搬运
41. 晚期妊娠的临床表现不包括
- A. 子宫增大 B. 自觉胎动
C. 早孕反应 D. 胎心
E. 尿频
42. 子痫孕妇的治疗应首选
- A. 解痉药 B. 镇静药
C. 利尿药 D. 降压药
E. 降低颅内压药
43. 妊娠合并心脏病产妇何时开始使用抗生素以预防感染
- A. 无论什么时候使用均可
B. 产后立即给予抗生素
C. 产程开始后开始使用至产后 1 周
D. 分娩期开始持续至整个产褥期
E. 入院后即使用
44. 若想了解胎儿肺成熟度, 可测定羊水的
- A. 肌酐比值 B. 胆红素比值
C. 淀粉酶比值 D. 脂肪细胞比值
E. 卵磷脂/鞘磷脂比值
45. 前置胎盘终止妊娠时, 首选的处理是
- A. 剖宫产
B. 阴道分娩
C. 阴道分娩, 产钳助产
D. 阴道分娩, 胎头吸引器助产
E. 阴道分娩试产, 失败后剖宫产
46. 下列有关双合诊的说法中错误的是
- A. 是妇科最常用的检查方法
B. 检查时应仔细、认真, 动作轻柔
C. 台垫和检查器械应每人更换
D. 月经期可照常检查
E. 检查前需指导病人自主排尿
47. 下列疾病及其主要传染方式配对错误的是
- A. 滴虫阴道炎—性交直接传染
B. 外阴阴道假丝酵母菌病—性交直接传染
C. 梅毒—性交直接传染
D. 尖锐湿疣—性交直接传染
E. 获得性免疫缺陷综合征—性交直接传染
48. 对于功血病人具有诊断、治疗双重作用的检查方法是

- A. 分段诊刮 B. 宫颈活检
C. 诊断性刮宫 D. 宫腔镜检查
E. 腹腔镜检查
49. 新生儿体液总量占体重的
A. 85% B. 82%
C. 78% D. 75%
E. 70%
50. 高渗性脱水的特点为
A. 细胞外液减少为主
B. 血浆总量减少为主
C. 细胞内液减少为主
D. 间质液减少为主
E. 细胞外液减少为主, 伴细胞内液减少
51. 开始加添蛋黄的月龄为
A. 1~2个月 B. 2~3个月
C. 4~6个月 D. 6~9个月
E. 10~12个月
52. 极低出生体重儿的出生体重为
A. <3000g B. <2500g
C. <2000g D. <1500g
E. <1000g
53. 符合幼儿期特点的为
A. 体格发育最快
B. 语言思维和应人应物的能力增强
C. 识别危险的能力强
D. 自身免疫力增强, 传染病发生率低
E. 不易发生营养缺乏和消化紊乱
54. 早产儿的室温、相对湿度宜维持在
A. 18~20℃、45%~50%
B. 20~22℃、50%~55%
C. 22~24℃、50%~55%
D. 24~26℃、55%~65%
E. 26~28℃、60%~65%
55. 判断小儿生长发育、营养状况最敏感、重要的指标为
A. 身长 B. 体重
C. 头围 D. 胸围
E. 坐高
56. 小儿出生后生长发育最迅速的时期
A. 新生儿期 B. 婴儿期
C. 幼儿期 D. 学龄前期
E. 学龄期
57. 中毒型菌痢的治疗原则最重要的为
A. 控制感染 B. 扩充血容量
C. 纠正酸中毒 D. 降温止惊
E. 防治脑水肿和呼吸衰竭
58. 患者, 男性, 28岁, 近一月来劳累后出现乏力、盗汗、纳差, 无发热、咳嗽等, 今天突然大咯血来就诊, 禁忌进行的检查是
A. 外周血象 B. 心电图
C. 胸部平片 D. 支气管碘造影
E. 血液生化检查
59. 患者, 女性, 20岁, 因发热、腰痛、尿痛、尿急、尿频一天来院就诊。尿液检查, 尿红细胞5~10个/HP, 白细胞2~3个/HP, 有白细胞管型, 以往无类似发作史, 肾区有叩击痛, 确诊为急性肾盂肾炎。该病的致病菌最多见的是
A. 大肠杆菌 B. 变形杆菌
C. 葡萄球菌 D. 克雷白杆菌
E. 链球菌
60. 患者, 男性, 30岁, 体检时皮肤苍白, 有水冲脉, 有明显颈静脉搏动, 毛细血管搏动征阳性, 脉压增宽, 心尖搏动向左下移位, 可能是
A. 主动脉瓣关闭不全
B. 主动脉瓣狭窄
C. 甲状腺功能亢进
D. 二尖瓣关闭不全
E. 二尖瓣狭窄
61. 患者, 男性, 60岁, 自诉夜间尿频, 排尿时间延长, 尿不净, 一周小腹胀痛, 不能自解小便8h, 护士首先应如何处理
A. 膀胱穿刺排尿
B. 膀胱造瘘
C. 立即做好术前准备
D. 按压腹部排尿
E. 急诊做前列腺摘除
62. 患者, 女性, 40岁, 其脉搏随深吸气逐渐减弱, 甚至消失, 呼气时又有所加强, 该脉搏称为
A. 不整脉 B. 奇脉
C. 水冲脉 D. 交替脉
E. 间歇脉
63. 患者, 男性, 59岁, 体重60kg。大面积烧伤, 创面暴露3天, 自诉乏力伴恶心, 血清钠为130mmol/L。请问该患者第一天需输注5%葡萄糖氯化钠注射液的量是
A. 500ml B. 100ml
C. 1500ml D. 2000ml

E. 2500ml

64. 患者，女性，43岁。腰麻注药后，先感胸闷，继而心慌、烦躁、恶心、呕吐、血压下降，随后呼吸困难，首先考虑为
- A. 注药过快 B. 剂量过大
C. 平面过高 D. 过敏反应
E. 毒性作用
65. 患者，女性，23岁。不慎烫伤，右下肢浅Ⅱ度烧伤。创面紧急处理不正确的是
- A. 迅速脱离热源
B. 用自来水大量冲洗双下肢
C. 迅速送往医院
D. 创面涂搽龙胆紫
E. 大量补液
66. 患者，男性，40岁。行甲状腺大部分切除术后3天，出现手足疼痛，指尖针刺感并有轻度抽搐，护士应备好
- A. 氯化钾 B. 碘化钾
C. 苯巴比妥 D. 碳酸氢钠
E. 葡萄糖酸钙
67. 患者，男性，68岁。患十二指肠溃疡已经十余年。近3个月来，上腹胀满不适，伴反复呕吐酸臭味的宿食。术前诊断最可靠的检查是
- A. 胃液分析 B. B超
C. X线钡餐检查 D. 纤维胃镜检查
E. CT
68. 初产妇，临产8h后出现协调性宫缩乏力，未破膜，宫口开大5cm，无明显头盆不称。最恰当的处理是
- A. 静滴缩宫素
B. 剖宫产
C. 等待自然分娩
D. 人工破膜后静滴缩宫素
E. 肌注镇静药
69. 某产妇，前置胎盘，经阴顺产一女婴，出生1min Apgar评分为2分，应采取的措施是
- A. 保温
B. 加压给氧
C. 人工呼吸
D. 气管内插管清理呼吸道
E. 心内注射肾上腺素
70. 田某，女，35岁。葡萄胎清宫术后8个月。自述出现阴道不规则出血，同时伴有咳嗽、咳痰。病人自认为“上感”，未加注意，胸

片示双肺部散在团块状阴影。为进一步明确病变性质，应进行哪项检查

- A. 血 HCG 测定
B. B超检查
C. 脑脊液 HCG 测定
D. 病理组织学检查
E. 阴道后穹窿穿刺
71. 一发育正常小儿，30天。其母咨询应接种的疫苗为
- A. 乙肝疫苗 B. 脊髓灰质炎疫苗
C. 流脑疫苗 D. 乙脑疫苗
E. 卡介苗
72. 患儿女，3岁，已确诊动脉导管未闭。胸部X线特征性改变为
- A. 左右心室扩大 B. 肺野充血
C. 肺动脉段凸出 D. 主动脉弓增大
E. 肺门血管影增粗
73. 患儿1岁，面色蜡黄，手有震颤，外周血红细胞 $2.4 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 80g/L。血片中红细胞形态大小不等，以大红细胞为多。应给予
- A. 铁剂 B. 铁剂+维生素 C
C. 维生素 B₁₂
D. 叶酸
E. 叶酸+维生素 B₁₂

二、以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息，在每道下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(74~76 题共用病例)

患者，男性，36岁，突发性呼吸困难 1h 来诊，查体呼吸 30 次/分，呼气音延长，双肺布满哮鸣音。

74. 上述病例属于哪种呼吸困难
- A. 吸气性呼吸困难
B. 呼气性呼吸困难
C. 夜间阵发性呼吸困难
D. 混合性呼吸困难
E. 劳力型呼吸困难
75. 该病人可能的诊断是
- A. 心源性哮喘 B. 自发性气胸
C. 支气管哮喘 D. 大叶性肺炎
E. 急性支气管炎

76. 该病人的面容可能是

- A. 病危面容
- B. 无特殊病容
- C. 慢性病容
- D. 急性病容
- E. 面具病容

(77~79 题共用病例)

患者, 男性, 20 岁, 突然畏寒、发热伴有右侧胸痛一天入院, 胸透见右中肺有大片炎性浸润阴影, 入院后给予抗炎治疗, 体温逐渐下降, 病人一般情况也逐渐好转。

77. 该病人的诊断可能为

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 肺炎支原体肺炎
- C. 军团菌肺炎
- D. 肺结核
- E. 革兰阴性菌肺炎

78. 针对病人症状, 用药首选

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 林可霉素
- D. 头孢菌素
- E. 链霉素

79. 对该病人抢救中, 下列哪项不妥

- A. 胸痛取患侧卧位
- B. 气急发绀者取半卧位
- C. 高热者即使用退热剂
- D. 输液速度不应过快
- E. 密切观察生命特征、神态、尿量变化

(80~81 题共用病例)

患者, 男性, 55 岁, 体重 70kg。阵发性腹痛 2 天入院, 查体: 神志恍惚, 呼吸深快, 血压 100/60mmHg, 腹膜刺激征明显。实验室检查: pH 7.2, 血 HCO_3^- 9mmol/L。

80. 该患者出现了何种酸碱平衡紊乱

- A. 轻度代谢性酸中毒
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 呼吸性碱中毒
- D. 代谢性碱中毒
- E. 重度代谢性酸中毒

81. 此时可选择的补液方案是

- A. 5%葡萄糖氯化钠溶液
- B. 平衡盐溶液
- C. 10%葡萄糖酸钙 20ml 静脉注射
- D. 5%碳酸氢钠 250ml 静脉滴注
- E. 0.1mol/L 稀盐酸

(82~84 题共用病例)

张某, 女性, 32 岁, 患原发性甲状腺功能亢进症。入院后在清晨未起床前测病人心率 110 次/分, 血压 140/80mmHg, 拟在服用复方碘化钾溶液等术前准备后, 择期行甲状腺大部切

除术。

82. 按简便公式计算, 该病人的基础代谢率 (BMR) 为

- A. 50%
- B. 59%
- C. 109%
- D. 139%
- E. 170%

83. 术前服用碘剂的作用是

- A. 抑制甲状腺素合成
- B. 对抗甲状腺素作用
- C. 促进甲状腺素合成
- D. 抑制甲状腺素释放
- E. 减少促甲状腺激素分泌

84. 未达到手术前准备标准的是

- A. 心率小于 100 次/分
- B. BMR 小于 +20%
- C. 情绪稳定, 睡眠好转
- D. 体重增加
- E. 甲状腺体缩小变硬

(85~88 题共用病例)

某妇女, 平素月经规律, 月经周期 30 天, 月经期 3 天。现已停经 10 周, 自觉乳房触痛明显。

85. 如考虑该妇女怀孕, 除上述体征, 还可能有

- A. 恶心
- B. 自觉胎动
- C. 听到胎心
- D. 妊娠纹
- E. 以上均是

86. 化验报告提示尿妊娠试验 (+), 此试验的目的是检查

- A. 缩宫素
- B. 黄体酮
- C. 雌激素
- D. 黄体生成素
- E. 绒毛膜促性腺激素

87. 为进一步明确其是否怀孕, 应做下列哪项检查

- A. 胎心音
- B. 胎动
- C. 放射检查脊柱轮廓
- D. B 超
- E. 以上均不是

88. 该孕妇的末次月经是公历 2009 年 3 月 10 日, 预产期是

- A. 2009 年 10 月 18 日
- B. 2009 年 10 月 17 日
- C. 2009 年 11 月 18 日
- D. 2009 年 11 月 17 日
- E. 2009 年 12 月 17 日