RADIOAKTIVE ISOTOPE

IHRE HERSTELLUNG UND ANWENDUNG

VON

KURT SCHMEISER

RADIOAKTIVE ISOTOPE

IHRE HERSTELLUNG UND ANWENDUNG

VON

DR. KURT SCHMEISER

KNAPSACK-GRIESHEIM A. G., WERK KNAPSACK BEI KOLN
FRÜHER INSTITUT FÜR PHYSIK AM MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR MED. FORSCHUNG
HEIDELBERG

MIT 193 ABBILDUNGEN

SPRINGER-VERLAG
BERLIN · GÖTTINGEN · HEIDELBERG

1957

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten
Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet, dieses
Buch oder Teile daraus auf photomechanischem Wege (Photokopie, Mikrokopie)
zu vervielfältigen

© by Springer-Verlag oHG, Berlin · Göttingen · Heidelberg 1957

Printed in Germany

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
daß solche Namen im Sinn der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung
als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften

Druck der Universitätsdruckerei H. Stürtz AG., Würzburg

Vorwort

Die schnelle Entwicklung der Kernphysik und die Möglichkeit, auf künstlichem Wege radioaktive Isotope in größerer Menge herzustellen, hat sich auf viele Gebiete, sei es in der Chemie, Medizin, Biologie, Geologie, Mineralogie u. a. oder bei technischen Problemen, günstig ausgewirkt. Die Zahl der Anwendungsbeispiele ist heute schon fast unübersehbar, immer neue Möglichkeiten der Anwendung ergeben sich. Es ist ein großer Vorteil der radioaktiven Nachweismethode, daß sich die meisten Untersuchungen mit verhältnismäßig einfachem experimentellem Aufwand lösen lassen. Jedoch setzt dies eine eingehende Kenntnis der Nachweismethoden und ihre experimentelle Beherrschung voraus. Die hierzu erforderlichen Grundlagen soll das vorliegende Buch vermitteln. Es ist hervorgegangen aus einer Zahl von größeren Übersichtsbeiträgen, welche der Verfasser in Zeitschriften und Handbüchern gegeben hat, und aus einer fast zehnjährigen experimentellen Tätigkeit auf diesem Gebiet. Leider ist durch eine übermäßig starke, berufliche Inanspruchnahme die Fertigstellung des Manuskriptes etwas verzögert worden.

Einleitend wird ein kurzer Überblick gegeben über den Aufbau des Atoms und über damit zusammenhängende Fragen. Anschließend wird die Erscheinung der Radioaktivität, soweit es für das Verständnis des Folgenden notwendig ist, behandelt. Es wurde als zweckmäßig erachtet, dem eigentlichen Thema, nämlich der Messung von radioaktiven Präparaten, einen in sich abgeschlossenen Überblick über die Herstellungsmöglichkeiten radioaktiver Isotope voranzustellen. Erfahrungsgemäß tauchen nämlich bei der Anwendung radioaktiver Isotope, besonders bei medizinischen und biologischen Problemen, Fragen auf, welche ohne diese Kenntnisse vielfach nur unbefriedigend beantwortet werden können. Daß über die Wirkungsweise der verschiedenen Meßgerätetypen berichtet wird, ist selbstverständlich. Den Ausführungen über die praktische Ausmessung von α -, β - oder γ -Strahlern sind jeweils einige Grundtatsachen über das Verhalten der betreffenden Strahlung in Materie vorangestellt. Der Autoradiographie ist ein besonderer Abschnitt gewidmet. Der Abschnitt über Strahlenschutz ist textlich kurz gehalten, dürfte aber bei der reichhaltigen Beigabe von Tabellen und Abbildungen ausreichend sein. Den Abschluß des Buches bildet eine kleine Zusammenstellung von verschiedenartigen Anwendungsbeispielen.

Köln a. Rh., im Juni 1957

K. SCHMEISER

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Grundbegriffe des Atomaufbaues und der Radioaktivität sowie Möglichkeiten zur Herstellung künstlich radioaktiver Isotope	1
A. Atomaufbau und Isotopie	1
1. Protonen und Neutronen als Bausteine von Atomkernen	1
2. Kernladung und Atommasse	2
3. Symbolische Schreibweise für Atomkerne	2
4. Begriff der Isotopie, stabile Isotope	4
5. Isotopenhäufigkeit	7
6. Atomgewicht und Isotopengewicht	8
7. Massendefekt, Bindungsenergie, Packungsanteil	10
B. Radioaktivität, radioaktive Familien	11
1. Natürliche Radioaktivität	11
2. Zerfallsgesetz	11
3. Berechnung der von einem radioaktiven Präparat bis zum völligen Zerfall, emittierten Zerfallsteilchen	14
4. Zerfallskurve eines Gemisches zweier Radioisotope verschiedener Halbwertzeit	14
5. Statistische Natur des radioaktiven Zerfalls	15
6. Mutter- und Tochtersubstanzen. Radioaktive Familien	15
7. Die verschiedenen Zerfallsarten bei natürlich radioaktiven Isotopen	18
a) α -Zerfall	18
b) β -Zerfall	20
C. Umwandlung von Atomkernen, künstliche Herstellung radioaktiver Isotope	20
1. Erste Atomkernumwandlung	20
2. Wärmetönung	22
3. Verschiedene Möglichkeiten zur künstlichen Erzeugung radioaktiver Isotope	22
a) Umwandlung von stabilen Atomkernen in radioaktive Atomkerne mit Hilfe natürlicher α -Strahlen	22
b) Erzeugung von Radioisotopen mit Hilfe von künstlich beschleunigten, geladenen Teilchen (VAN DE GRAAFF-Generator, Kaskadengenerator, Zyklotron)	22
c) Atomumwandlung mittels Neutronen	25
d) Atomumwandlung mittels γ -Strahlen	26
e) Uran-Kernspaltung. Radioaktive Spaltprodukte	27
4. Umwandlungswahrscheinlichkeit	44
a) Definition des Wirkungsquerschnittes	44
b) Schwellenenergie, COULOMBScher Potentialwall, Anregungskurve	44
c) Elastische Zusammenstöße, thermische Neutronen	45
d) Wirkungsquerschnitt für Neutronen, unelastische Stöße, Neutroneneinfang	45
5. Uranmeiler, Pile	47
a) Physikalische Vorgänge im Pile	47
b) Erzeugung von Radioisotopen im Pile mit Hilfe der Überschussneutronen	49

α) Die beiden Hauptumwandlungstypen	49
β) Spezifische Aktivität, trägerlose Präparate	50
γ) Sättigungsmenge, maximale Bestrahlungszeit	51
δ) Markierte, chemische Verbindungen	52
6. Herstellung radioaktiver Isotope im Zyklotron	53
a) Trägerlose Substanzen	53
b) Wirkungsweise eines Zyklotrons	54
c) Gleichzeitige Erzeugung mehrerer Arten von Radioisotopen	54
d) Anregungskurven.	56
D. Eigenschaften künstlich erzeugter β-Strahler	58
1. Größe der Halbwertzeit	58
2. Verschiedene Absorbierbarkeit der ausgesandten Strahlung.	58
3. Verschiedene Zerfallsarten	58
a) Der β ⁻ - und β ⁺ -Zerfall	58
b) K-Einfang.	59
c) γ-Emission, Kern-γ-Strahlung	60
d) Kernisomerie	60
e) Innerer Photoeffekt, Konversionselektronen	60
f) Zerfallschemata	61
II. Nachweisgeräte für radioaktive Strahlung	62
A. Ionisationskammer	63
1. Aufbau und Wirkungsweise	63
2. Messung der gesammelten elektrischen Ladung	65
3. Nulleffekt einer Ionisationskammer	66
4. Elektroskop	66
B. GEIGER-MÜLLERSches Zählrohr	67
1. Prinzipieller Aufbau eines Zählrohrs. Zählrohrcharakteristik	67
2. Entladungsmechanismus beim GEIGER-MÜLLER-Zählrohr	68
3. Zeitlicher Verlauf des Zählrohrimpulses und der Zählrohrspannung. Begriff der Totzeit und Erholungszeit	69
4. Nachentladungen beim GEIGER-MÜLLER-Zählrohr.	70
5. Nicht selbstlöschende und selbstlöschende Zählrohre	71
6. Lebensdauer von selbstlöschenden Zählrohren	72
7. Der Nulleffekt eines GEIGER-MÜLLER-Zählrohrs	72
C. Proportionalzählrohre, Vor- und Nachteile derselben.	74
D. Szintillationszähler	76
1. Die große γ-Nachweis-Empfindlichkeit als Ausgangspunkt für die rasche Entwicklung des Szintillationszählers	76
2. Prinzipieller Aufbau und Wirkungsweise eines Szintillationszählers	77
3. Eigenschaften der Leuchtstoffe, Lichtleiter, physikalische und tech- nische Ausbeute	78
4. Empfindlichkeit von Photozelle bzw. Photomultiplier	80
5. Charakteristik des Szintillationszählers	82
6. Nulleffekt beim Szintillationszähler	82
7. Vorteile des Szintillationszählers	84
E. Einige Bemerkungen über Impulsverstärker	84
III. Durchgang von β-Teilchen durch Materie	85
A. Verhalten monoenergetischer Elektronen.	85
1. Streuung von Elektronen	85
2. Primäre, sekundäre und totale Ionisation	85

	Seite
3. Anregung von Atomen	86
4. Energieverlust homogener Elektronen durch Ionisation	86
5. Abhängigkeit der Ionisationsdichte von der Elektronenenergie	86
6. Absorption von monoenergetischen Elektronen	87
7. Energieverteilung bei monoenergetischen Elektronen nach Durchlaufen einer bestimmten Absorberdicke	88
B. Zerfallselektronen	88
1. Vergleich mit monoenergetischen Elektronen	88
2. Absorptionsgesetz	89
3. Maximale Reichweite von Zerfallselektronen	91
IV. Nachweis von β-Strahlen	93
A. Allgemeine Bemerkungen	93
1. Hohe Empfindlichkeit des radioaktiven Nachweises	93
2. Relative und absolute Messung	95
3. Standardpräparate	96
B. Zählrohrmessungen von radioaktiven Präparaten in fester Form	96
1. Einleitende Bemerkungen	96
2. Versuchsanordnung	98
3. Abhängigkeit des Meßeffectes vom Abstand des Präparates vom Zählrohr	99
4. Geometriefaktor, punktförmige und kreisförmige Präparate	100
5. Änderung der Impulshäufigkeit bei seitlicher Verschiebung des Präparates	102
6. Absorption von β -Strahlen	102
a) Absorptionsgesetz	102
b) Gleichzeitige Bestimmung zweier Radioisotope in ein und demselben Präparat	102
c) Absorption der β -Strahlen im Zählrohrfenster und in der Luftschicht	103
d) Einfluß des schrägen Durchgangs der β -Teilchen durch Luftschicht und Zählrohrfenster	104
7. Selbstabsorption von β -Strahlen	106
a) Begriffsbestimmung	106
b) Selbstabsorption bei dünner Präparateschicht	106
c) Dicke Schicht	106
d) Selbstabsorption für verschieden dicke Präparate	107
e) Berechnung des Selbstabsorptionskoeffizienten	108
f) Abhängigkeit des Selbstabsorptionskoeffizienten von der Geometrie der Meßanordnung und von der Art des Nachweisgerätes	108
8. Selbststreuung	109
9. Rückstreuung	111
C. Messung von Präparaten in flüssiger Form	112
1. Bestimmung der Aktivität kleiner Proben	112
2. Messung von Flüssigkeitsproben von etwa 15 cm ³ Volumen	114
a) VEALLScher Flüssigkeitszähler	114
b) Einfluß verschiedener Flüssigkeitsdichte auf den Meßeffect	116
c) Nulleffect des VEALLSchen Zählers	116
3. Aktivitätsmessung großer Flüssigkeitsmengen	117
4. Messung von flüssigen radioaktiven Proben mit dem Szintillationszähler	118
D. Messung gasförmiger Proben	119
1. Vorteile und Nachteile des Gaszählers	119
2. Nachweisempfindlichkeit von Gaszählern	120

	Seite
3. GEIGER-MÜLLER-Zählrohre als Gaszähler	122
a) Geeignete Gasfüllung des Zählers	122
b) Definiertes Zählvolumen und Randeffect	123
c) Wandeffect	123
4. Proportionalzähler zur Ausmessung gasförmiger radioaktiver Präparate	124
5. Messung gasförmiger, radioaktiver Proben mit der Ionisationskammer	126
6. Messung von Tritiumpräparaten	128
E. Zählverluste durch begrenztes Auflösungsvermögen	129
1. Ermittlung der Zählverluste	129
2. Experimentelle Bestimmung der Totzeit	129
3. Direkte Bestimmung der Zählverluste	130
4. Verminderung der Zählverluste durch Verwendung von Untersetzern	130
F. Genauigkeit radioaktiver Messungen	131
1. Statische Natur der Radioaktivität	131
2. Mittlerer statistischer Fehler, wahrscheinlicher und 9/10-Fehler	132
3. Berechnung des mittleren statistischen Fehlers, wenn die gesuchte Größe von mehreren Einzelmessungen abhängt	134
4. Berücksichtigung des Nulleffektes bei der Berechnung des mittleren statistischen Fehlers	134
5. Günstige Aufteilung der Gesamtmeßdauer auf Präparatmessung und Nulleffektmessung	135
6. Bestimmung des mittleren statistischen Fehlers für den Quotienten zweier Differenzen	136
7. Bestimmung des mittleren statistischen Fehlers für eine Meßgröße, bei welcher infolge der Totzeit der Zählordnung eine Korrektur an dem beobachteten Meßeffect vorgenommen werden muß	137
8. Mittlerer statistischer Fehler für Ratemeter und Ionisationskammer	137
V. Wechselwirkung von γ -Strahlung mit Materie und Nachweis derselben	138
A. Absorption von γ -Strahlung	138
1. Absorption durch photoelektrischen Effect, COMPTON-Effekt und Paarbildung	138
2. Absorptionsgesetz	139
3. Energieverteilung der γ -Quanten	139
4. COMPTON-Absorption und COMPTON-Streuung	141
B. Nachweis von γ -Strahlung mit GEIGER-MÜLLER-Zählrohren und Szintillationszählern	145
1. Zweckmäßigkeit der Messung von γ -Strahlung	145
2. Gamma-Ansprechwahrscheinlichkeit von GEIGER-MÜLLER-Zählrohren	145
3. Gamma-Messungen mit dem GEIGER-MÜLLER-Zählrohr	147
a) Bestimmung der Jod 131-Speicherung durch die Schilddrüse	147
b) Nachweis sehr energiearmer γ -Strahlung mit Hilfe eines Zinnzählrohres	148
4. Gamma-Empfindlichkeit von Szintillationszählern	150
5. Messung der Jod 131-Aufnahme durch die Schilddrüse als Beispiel des γ -Nachweises mit dem Szintillationszähler	150
6. Verwendung des Szintillationszählers zur Bestimmung der Intensität zweier γ -Strahler eines radioaktiven Präparates	154
7. Richtungsempfindliche Szintillationszähler	156
VI. Wechselwirkung von α -Strahlen mit Materie und Nachweis von α -Strahlen	157
A. Wechselwirkung mit Materie	157
1. Einleitende Bemerkungen	157
2. Ionisation und Anregung durch α -Teilchen	158

	Seite
3. Energieverlust von α -Teilchen	158
4. Streuung von α -Teilchen	159
5. Atomares Bremsvermögen von α -Teilchen, Luftäquivalent	159
6. Reichweite von α -Teilchen	159
B. Nachweis von α -Teilchen	163
1. Übersicht	163
2. A-Nachweis mit dem Proportionalzähler	163
3. A-Nachweis mit der Ionisationskammer	165
4. A-Nachweis mit den Szintillationszählern	165
VII. Absolute Messungen	166
A. Vergleich der Meßgröße mit der Impulshäufigkeit eines Eichpräparates bekannter Aktivität	166
B. Methoden zur direkten Bestimmung der absoluten Stärke eines radioaktiven Präparates	166
1. Berücksichtigung der Selbstabsorption, Streuung, Absorption, des Zerfallsschemas u. a.	166
2. Doppelzählrohre	166
3. Koinzidenzmethode	168
C. Einfluß des Zerfallsschemas auf die Impulshäufigkeit	169
VIII. Autoradiographie	171
A. Methode, Anwendungsbereich, Vorteile der Autoradiographie	171
B. Physikalische Grundlagen	172
1. Photographischer Vorgang	172
2. Photographische Emulsionen	173
3. Auflösungsvermögen	173
4. Beeinflussung des Auflösungsvermögens	175
5. Abschätzung der günstigsten Belichtungsdauer	177
C. Herstellung von Gewebeschnitten	178
1. Fixieren	179
2. Entwässern	180
3. Einbetten von Präparateschnitten	180
4. Schneiden von Präparaten mit Hilfe eines Mikrotoms	181
5. Färbung der Präparateschnitte	182
D. Die verschiedenen Techniken zur Herstellung von Autoradiogrammen	182
1. Kontaktmethode	182
a) Große und dicke Gewebeproben	182
b) Dünne Präparateschnitte	183
2. Coated-Methode	185
a) Normalmethode	185
b) Umkehrmethode	186
3. Stripping-Film-Methode	186
4. FINKSche Methode	190
5. Autoradiographie unter Verwendung flüssiger Emulsionen (wet-process-autoradiography)	190
E. Artefakte	192
F. Quantitative Autoradiographie	192
1. Vergleichsmessung mit Autoradiogrammen, welche mit Strahlungsquellen bekannter Aktivität aufgenommen worden sind	192
2. Auszählung der ausgeschiedenen Silberkörner	193

3. Photometrische Bestimmung der Schwärzung in einem Autoradiogramm	194
4. Beobachtung und Auswählen der entwickelten Körner einzelner Bahnspuren	194
IX. Strahlenwirkung, Strahlenschutz, Laboreinrichtungen	194
A. Strahlenwirkung	194
1. Allgemeines	194
2. Strahlungseinheiten	195
3. Toleranzdosis	205
B. Strahlenschutz	206
C. Vorsichtsmaßnahmen, Laboreinrichtungen	208
X. Anwendungsbeispiele für radioaktive Methoden	212
A. Beispiele mit radioaktiver Markierung	212
1. Einfaches Tracerbeispiel	212
2. Radioaktive Überwachung einer Ofenausmauerung	214
3. Synthese und Resorbierbarkeit einer mit C^{14} markierten organisch-chemischen Verbindung, radioaktiv kontrolliert.	215
4. Studium des Oxydationsmechanismus von Propen durch alkalisches Permanganat.	217
5. Bildung im Osotriazol aus Osazonen.	218
6. Kontrolle der chemischen Trennung zweier Substanzen	218
B. Quantitative Analyse mit Hilfe von radioaktiven Isotopen	219
1. Verdünnungsanalyse	219
2. Inverse Verdünnungsanalyse	219
3. Radiometrische Korrektur	220
C. Aktivierungsanalyse.	220
1. Methode.	220
2. Empfindlichkeit und Vorteile der Methode	221
3. Beispiele.	223
a) Bestimmung von Verunreinigungen durch Aufnahme der Zerfallskurve der induzierten Aktivität	223
b) Analyse eines Kalium-Natriumgemisches mit Hilfe von Absorptionsmessungen.	223
D. Verknüpfung der Aktivierungsanalyse mit papierchromatischer und elektrophoretischer Trennung chemischer Verbindungen	225
Die verschiedenen Methoden der Papierchromatographie in Verbindung mit markierten Substanzen.	225
E. Einige technische Anwendungsbeispiele	227
1. Dichtebestimmung mit Hilfe von radioaktiven Isotopen	227
2. Behälterstandsmessungen	228
3. Dickenmessung.	229
4. Gamma-Radiographie	230
a) Methode	231
b) Strahlungsquellen	231
c) Abbildungsschärfe von Materialfehlern	235
d) Belichtungsdauer.	236
e) Strahlenschutz	239
f) Aufnahmetechnik	240
g) Grenzen der γ -Radiographie	242
Sachverzeichnis	244

I. Grundbegriffe des Atomaufbaues und der Radioaktivität sowie Möglichkeiten zur Herstellung künstlich radioaktiver Isotope

A. Atomaufbau und Isotopie

I. Protonen und Neutronen als Bausteine von Atomkernen

Im Jahre 1913 machten GEIGER und MARSDEN¹ eingehende Versuche über die Streuung von α -Teilchen an Atomen. Die Versuchsanordnung war einfach. α -Strahlen durchsetzen einen schmalen Spalt, hinter dem sich in etwa 50 cm Entfernung ein Zinksulfidschirm befindet. Beim Auftreffen eines α -Teilchens leuchtet dieser auf. Verläuft der Vorgang im Vakuum, so beobachtet man auf dem Zinksulfidschirm ein scharf begrenztes Spaltbild, weil die Bahn des α -Teilchens ungestört und deshalb geradlinig ist. Das ändert sich bei Zwischenschalten von Materie z. B. in Form einer dünnen Goldfolie. Es treten nunmehr Streuungen des α -Teilchens an den Atomen des Folienmaterials auf, die beobachtbaren Ablenkungen der α -Teilchen von ihrer geradlinigen Bahn sind verhältnismäßig klein und verschieden groß (GAUSSSCHE Winkelverteilung). Es gibt dabei einen wahrscheinlichsten, mittleren Ablenkwinkel (*Streuwinkel*), der bei einer Dicke der Goldfolie von $1,6 \cdot 10^{-5}$ cm etwa 2° beträgt.

Gelegentlich, unter 10000 Fällen etwa einmal, findet man aber auch sehr große Streuwinkel (90° und mehr), welche von einem einzigen elastischen Zusammenstoß mit einer auf engstem Raum konzentrierten Masse herrühren müssen. RUTHERFORD schloß aus diesem Befund, daß die Masse des Atoms auf ein äußerst kleines Volumen konzentriert und ebenso wie das α -Teilchen positiv geladen ist. Nach dieser Auffassung besteht ein Atom aus einem positiv geladenen *Atomkern*, der nahezu die gesamte Masse des Atoms trägt, und negativ geladenen *Elektronen* (*Hüllenelektronen*), welche das Atom nach außen hin elektrisch neutral erscheinen lassen und den Atomkern umgeben, ähnlich wie die Planeten die Sonne.

Der Radius des Atomkernes ist von der Größenordnung 10^{-13} cm und beträgt für ein Atom mit dem Atomgewicht A

$$r = 1,45 \sqrt[3]{A} \cdot 10^{-13} \text{ cm.}$$

Für das Element Argon mit $A = 40$ z. B. ist $r = 4,8 \cdot 10^{-13}$ cm. Zum Vergleich sei der Atomradius von Argon angegeben; er beträgt $R = 1,3 \cdot 10^{-8}$ cm $= 3 \cdot 10^4 r$.

Auf die Tatsache, daß die Zahl Z der Hüllenelektronen identisch mit der positiven Kernladungszahl ist, hat als erster BROEK² hingewiesen. Die experimentelle

¹ GEIGER, H., u. E. MARSDEN: Proc. Roy. Soc. Lond., Ser. A 82, 495 (1909). — Phil. Mag. 25, 604 (1913). — GEIGER, H.: Proc. Roy. Soc. Lond., Ser. A 83, 492 (1910).

² BROEK, A. VAN DEN: Physik. Z. 14, 32 (1913).

Bestätigung hierzu gelang MOSELEY¹. Es bedurfte der Entdeckung des Neutrons durch CHADWICK² im Jahre 1932, nach systematischen Vorversuchen von BOTHE und BECKER³ und JOLIOT-CURIE⁴, ehe HEISENBERG⁵ die beiden Elementarteilchen *Protonen* (p) und *Neutronen* (n) als die einzigen Bausteine (Nukleonen) aller Atomkerne postulieren konnte.

Protonen sind identisch mit den Atomkernen des leichten Wasserstoffs. Sie sind einfach positiv geladen, ihre Masse beträgt, bezogen auf die Masse des Sauerstoffs = 16000, 1,00758 entsprechend $1,67248 \cdot 10^{-24}$ g. Die Masse des neutralen Wasserstoffatoms (Proton plus Hüllenelektron) ist 1,00813 entsprechend $1,67339 \cdot 10^{-24}$ g. Neutronen sind etwa ebenso schwer wie Protonen ($m_n = 1,00896$ entsprechend $1,67477 \cdot 10^{-24}$ g, s. Tabelle 1), sie sind aber, wie schon der Name sagt, elektrisch neutral.

Zum Verständnis des Aufbaues von Atomkernen aus positiv geladenen Protonen und ungeladenen Neutronen müssen wir gewisse Kernkräfte zwischen Protonen und Neutronen annehmen, welche nicht elektrischer Natur sind, über deren Eigenschaften wir aber bis heute noch keine vollkommene Vorstellung besitzen. Bis zu Entfernungen von etwa 10^{-12} cm vom Kernmittelpunkt sind allein die abstoßenden COULOMB-Kräfte zwischen den Protonen wirksam, in größerer Kernnähe überwiegen die erwähnten Kernkräfte, welche die Nukleonen eines Atomkernes zusammenhalten (*Kohäsionskräfte*).

2. Kernladung und Atommasse

Die Zahl der Protonen bestimmt die *Kernladung* und ist identisch mit der Ordnungszahl Z des betreffenden chemischen Elementes. Die positive Kernladung beträgt also $Z \cdot e$, wobei e gleich dem elektrischen Elementarquantum ist ($e = 4,8 \cdot 10^{-10}$ elektrostatische Einheiten). Das Gewicht der Atomkerne ist von der Zahl der Protonen und der Zahl der Neutronen abhängig. Die Summe beider Zahlen (Gesamtzahl der Nukleonen) nennt man *Massenzahl*. Definitionsgemäß ist diese eine ganze Zahl.

3. Symbolische Schreibweise für Atomkerne

Zur Kennzeichnung der verschiedenen Atomkerne ordnet man jedem Symbol A eines chemischen Elementes 2 Indices zu. Die übliche Schreibweise von beispielsweise

sagt aus, daß wir es mit einem Berylliumkern zu tun haben, der 4 Protonen (Index links unten = Zahl der Protonen) und 5 Neutronen in sich vereint, also die Massenzahl 9 (Index rechts oben) besitzt.

Die symbolische Schreibweise wird in der Fachliteratur nicht einheitlich gehandhabt. Häufig erscheint die Massenzahl links, statt rechts oben vom

¹ MOSELEY, H. G. J.: Phil. Mag. 26, 1024 (1913); 27, 703 (1914).

² CHADWICK, J.: Proc. Roy. Soc. Lond., Ser. A 136, 692 (1932). — Nature 129, 312 (1932).

³ BOTHE, W., u. H. BECKER: Z. Physik 66, 289 (1930).

⁴ CURIE, J., u. F. JOLIOT: C. r. Acad. Sci. Paris 194, 273, 708, 876 (1932).

⁵ HEISENBERG, W.: Z. Physik 77, 1 (1932).

Tabelle I. Zusammenstellung von Ruhmasse, Atom- und Isotopengewichte für wichtige Elementarteilchen (nach H. WATZLAWEK¹)

Elementarteilchen	Sym- bol	Ruhmasse		Atomgewicht	Isotopengewicht	Elektrische Ladung
		$1 \text{ ME} = \frac{m_{\text{Sauerstoff}}}{16}$	10^{-24} g			
Elektron						
β -Teilchen	β, e^-	$m_e = (9,108 \pm 0,010) \cdot 10^{-28}$		$A_e = 0,000549$		$e = (4,802 \pm 0,004) \cdot 10^{-10}$ Elektrost. Einheiten
Positron	e^+	m_e		A_e		$+e$
P. A. M. DIRAC 1928 C. D. ANDERSON 1932						
Proton	${}^1_1\text{p}^1$	$m_p = (1,672 \pm 0,010) \cdot 10^{-24}$		$A_p = 1,00758 \pm 0,00002$		$+e$
H^+ -Teilchen	${}^1_1\text{H}^1$	$m_H = (1,673 \pm 0,010) \cdot 10^{-24}$		$A_H = 1,008131 \pm 0,00002$	$1,008131 \pm 0,00032$	$+e$
E. MARSDEN 1914						
Neutron	${}^0_1\text{n}^1$	$m_n = (1,675 \pm 0,010) \cdot 10^{-24}$		$A_n = 1,00896 \pm 0,00006$	$1,008945 \pm 0,0025$	0
J. CHADWIK 1932						
Deuteron	${}^2_1\text{d}^2$	$m_d = (3,345 \pm 0,020) \cdot 10^{-24}$		$A_d = 2,01418 \pm 0,00002$		$+e$
F. G. BRICKWELDE G. M. MURPHY H. UREY 1932	${}^2_1\text{H}^2$ ${}^2_1\text{D}^2$	$m_D = (3,346 \pm 0,020) \cdot 10^{-24}$ Deuterium		$A_D = 2,01473 \pm 0,00002$ Deuteron	$2,014725 \pm 0,0064$	$+e$
α -Teilchen	${}^4_2\text{He}^4$	$m_\alpha = (6,647 \pm 0,040) \cdot 10^{-24}$		$A_\alpha = 4,00279 \pm 0,00007$		$+2e$
He-Kern	${}^4_2\text{He}^4$	$m_{\text{He}} = (6,649 \pm 0,040) \cdot 10^{-24}$		$A_{\text{He}} = 4,00389 \pm 0,00007$	$4,0003860 \pm 0,0031$	$+2e$
H. BECQUEREL 1896						
Photon	γ	Masse $m = \frac{h\nu}{c^2} = 7,36 \cdot 10^{-26} \cdot \gamma$ Licht- bzw. γ -Quant. $h = (6,62 \pm 0,01) \cdot 10^{-27} \text{ ergsec}$ $c = (2,99774 \pm 0,00001) \cdot 10^{10} \text{ cm/sec}$		$A_\gamma = \frac{16 m_\nu}{m_0} = \frac{16 h \nu}{m_0 c^2}$ $= 4,42 \cdot 10^{-24}$ ν in Hertz (sec^{-1})		0
M. PLANCK 1900 A. EINSTEIN 1905						

¹ WATZLAWEK, H.: Lehrbuch der technischen Kernphysik. Wien 1948.

chemischen Symbol, im obigen Beispiel also

Allgemein gilt für einen Atomkern mit p Protonen und n Neutronen die Schreibweise

wobei A das Symbol des betreffenden chemischen Elementes bedeutet.

4. Begriff der Isotope, stabile Isotope

Neben dem Wasserstoffatom, dessen Kern allein aus einem Proton besteht, gibt es in der Natur eine zweite Wasserstoffatomart (*Deuterium*), welche etwa doppelt so schwer ist. Der Kern dieses *schweren Wasserstoffs*, *Deuteron* genannt, enthält neben dem Proton noch ein Neutron. Solche Atomarten des gleichen chemischen Elementes (gleiche Ordnungszahl, also gleiche Zahl von Protonen im Kern) mit verschiedener Atommasse (Atomgewicht) nennt man *Isotope*. Da sich die Eigenschaften dieser in der Natur vorkommenden Isotope ohne äußeren Einfluß auch über längere Zeit nicht ändern, nennt man sie *stabile Isotope*.

In Abb. 1 sind die stabilen Isotope der ersten drei chemischen Elemente des periodischen Systems (s. Abb. 2 und Tabelle 2) schematisch dargestellt. Das leichte und das schwere Wasserstoff-Isotop haben wir schon erwähnt. Das Element Helium, an zweiter Stelle im periodischen System rangierend, besitzt ebenfalls zwei stabile Isotope. Die Atomkerne beider Heliumarten enthalten, weil sie dem gleichen chemischen Element angehören, 2 Protonen, dagegen ist die Zahl der Neutronen für beide Isotope verschieden, nämlich 1 bzw. 2 und damit auch die Massenzahl, nämlich 3 bzw. 4. Entsprechend der Ordnungszahl $Z = 2$ besitzt ein Heliumatom außerdem 2 Hüllenelektronen. Auch diese sind in Abb. 1 (als kleine Punkte) eingezeichnet. Bei

Abb. 1. Schematische Darstellung des Aufbaues einiger Atomkerne aus Neutronen und Protonen¹

den beiden Lithium-Isotopen ${}_3\text{Li}^6$ und ${}_3\text{Li}^7$ sind im Kern 3 Protonen mit 3 bzw. 4 Neutronen vereint, die Massenzahl beträgt 6 bzw. 7.

¹ SCHMEISEB, K.: In: Künstliche radioaktive Isotope. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1953.

0. Gruppe	1. Gruppe	2. Gruppe	3. Gruppe	4. Gruppe	5. Gruppe	6. Gruppe	7. Gruppe	8. Gruppe	0. Gruppe
Neben- gruppe	Haupt- gruppe								
2 He 4,003	1 H 1,0080	4 Be 9,013	5 B 10,82	6 C 12,010	7 N 14,008	8 O 16,000	9 F 19,00	10 Ne 20,183	18 Ar 39,944
10 Ne 20,183	11 Na 22,997	12 Mg 24,32	13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,975	16 S 32,066	17 Cl 35,457	18 Ar 39,944	26 Fe 55,85
18 Ar 39,944	19 K 39,100	20 Ca 40,08	21 Sc 44,96	22 Ti 47,90	23 V 50,95	24 Cr 52,01	25 Mn 54,93	26 Fe 55,85	27 Co 58,94
36 Kr 83,80	29 Cu 63,54	30 Zn 65,38	31 Ga 69,72	32 Ge 72,60	33 As 74,91	34 Se 78,96	35 Br 79,916	36 Kr 83,80	44 Ru 101,7
54 X 131,3	37 Rb 85,48	38 Sr 87,63	39 Y 88,92	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,95	43 Tc [99]	44 Ru 101,7	45 Rh 102,91
54 X 131,3	47 Ag 107,880	48 Cd 112,41	49 In 114,76	50 Sn 118,70	51 Sb 121,76	52 Te 127,61	53 J 126,91	54 X 131,3	76 Os 190,2
80 Rn 222	55 Cs 132,91	56 Ba 137,36	57 La 138,92	72 Hf 178,6	73 Ta 180,88	74 W 183,92	75 Re 186,31	76 Os 190,2	77 Ir 195,23
80 Rn 222	79 Au 197,2	80 Hg 200,61	81 Tl 204,39	82 Pb 207,21	83 Bi 209,00	84 Po 210	85 At [210]	86 Rn 222	86 Rn 222
80 Rn 222	87 Fr [223]	88 Ra 226,05	89 Ac 227	90 Th 232,12	91 Pa 231	92 U 238,07			

* Seltene Erden: 58 Ce 140,13 59 Pr 140,92 60 Nd 144,27 61 Pm [145] 62 Sm 150,43 63 Eu 152,0 64 Gd 156,9 65 Tb 162,46 66 Dy 164,94 67 Ho 167,2 68 Er 169,4 69 Tm 173,04 70 Yb 173,04 71 Lu 174,99

Transurane: 93 Np [237] 94 Pu [242] 95 Am [243] 96 Cm [243] 97 Bk [245] 98 Cf [245] 99 Es [246]

Abb. 2. Periodisches System der Elemente. Die oberen ganzen Zahlen bedeuten die Ordnungszahlen der Elemente, die darunterstehenden geben die Atomgewichte an. Eckige Klammern bedeuten, daß das Atomgewicht dieses künstlich gewonnenen Elementes nur für das Produkt des derzeit wichtigsten Darstellungsprozesses gilt (nach SCHWARZENBACH¹)

¹ SCHWARZENBACH, G.: Allgemeine und anorganische Chemie. Stuttgart: Georg Thieme 1942.

Die Isotopie ist schon recht lange bekannt. Während SODDY¹ bereits im Jahre 1910 auf das Vorhandensein verschiedener Atomarten ein und desselben che-

Tabelle 2. *Atomgewichte der chemischen Elemente*

	Sym- bol	Ord- nungs- zahl	Atom- gewicht		Sym- bol	Ord- nungs- zahl	Atom- gewicht
Actinium . . .	Ac	89	227,0	Neon	Ne	10	20,183
Aluminium . . .	Al	13	26,97	Neptunium . . .	Np	93	238
Americium . . .	Am	95	—	Neutron	Nn	0	1,0
Antimon	Sb	51	121,76	Nickel	Ni	28	58,69
Argon	Ar	18	39,944	Niob	Nb	41	92,91
Arsen	As	33	74,91	Osmium	Os	76	190,2
Astatin	At	85	—	Palladium	Pd	46	106,7
Barium	Ba	56	137,36	Phosphor	P	15	30,98
Beryllium	Be	4	9,02	Platin	Pt	78	195,23
Blei	Pb	82	207,21	Plutonium	Pu	94	238
Bor	B	5	10,82	Praseodym	Pr	59	140,92
Brom	Br	35	79,916	Protaktinium . . .	Pa	91	231
Cadmium	Cd	48	112,41	Quecksilber	Hg	80	200,61
Caesium	Cs	55	132,91	Radium	Ra	88	226,05
Calcium	Ca	20	40,08	Radon	Rn	86	222
Cassiopeium . . .	Cp	71	174,99	Rhenium	Re	75	186,31
Cer	Ce	58	140,13	Rhodium	Rh	45	102,91
Chlor	Cl	17	35,457	Rubidium	Rb	37	85,48
Chrom	Cr	24	52,01	Ruthenium	Ru	44	101,7
Curium	Cm	96	—	Samarium	Sm	62	150,43
Dysprosium	Dy	66	162,46	Sauerstoff	O	8	16,0000
Eisen	Fe	26	55,85	Scandium	Sc	27	45,10
Erbium	Er	68	167,2	Schwefel	S	16	32,06
Europium	Eu	63	152,0	Selen	Se	34	78,96
Fluor	F	9	19,00	Silber	Ag	47	107,880
Gadolinium	Gd	64	156,9	Silicium	Si	14	28,06
Gallium	Ga	31	69,72	Stickstoff	N	7	14,008
Germanium	Ge	32	72,60	Strontium	Sr	38	87,63
Gold	Au	79	197,2	Tantal	Ta	73	180,88
Hafnium	Hf	72	178,6	Technetium	Tc	43	—
Helium	He	2	4,003	Tellur	Te	52	127,61
Holmium	Ho	67	163,5	Terbium	Tb	65	159,2
Indium	In	49	114,76	Thallium	Tl	81	204,39
Iridium	Ir	77	193,1	Thorium	Th	90	232,12
Jod	J	53	126,92	Thulium	Tm	69	169,4
Kalium	K	19	39,096	Titan	Ti	22	47,90
Kobalt	Co	27	58,94	Uran	U	92	238,07
Kohlenstoff	C	6	12,010	Vanadium	V	23	50,95
Krypton	Kr	36	83,7	Wasserstoff	H	1	1,0080
Kupfer	Cu	29	63,57	Wismut	Bi	83	209,00
Lanthan	La	57	138,92	Wolfram	W	74	183,92
Lithium	Li	3	6,940	Xenon	X	54	131,3
Magnesium	Mg	12	24,32	Ytterbium	Yb	70	173,04
Mangan	Mn	25	54,93	Yttrium	Y	39	88,92
Molybdän	Mo	42	95,92	Zink	Zn	30	65,38
Natrium	Na	11	22,997	Zinn	Sn	50	118,70
Neodym	Nd	60	144,27	Zirkonium	Zr	40	91,22

¹ SODDY, F.: Trans. Chem. Soc. 99, 72 (1911).

mischen Elementes aufmerksam gemacht hatte, konnte THOMSON¹ mit einem *Massen-Elektroskop* nachweisen, daß das Element Neon 2 Isotope mit der Masse 20 bzw. 22 besitzt.

5. Isotopenhäufigkeit

Einige Jahre später hat ASTON² eine große Reihe von chemischen Elementen auf ihre Isotopie untersucht. Zu diesem Zweck lenkte er Atomstrahlen verschiedener chemischer Elemente durch elektrische und magnetische Felder ab, so daß Atomarten verschiedener Massen voneinander getrennt nachgewiesen werden konnten (s. Abb. 3). ASTON konnte mit dieser Methode (*Massenspektro-*

Abb. 3. Schematische Darstellung eines Massenspektrometers mit elektrischer und magnetischer Ablenkung (nach K. T. BAINBRIDGE und E. B. JORDAN³)

skopie) sehr genaue Massenangaben für die einzelnen Isotope machen. Darüber hinaus gestatteten seine Meßergebnisse Aussagen über die relative Isotopenhäufigkeit, mit welcher die einzelnen Isotope eines chemischen Elementes in der Natur vorkommen.

Diese Häufigkeit wird im allgemeinen in Prozenten ausgedrückt, bezogen auf die Gesamtzahl der insgesamt in einer Mischung der verschiedenen Isotopenarten eines chemischen Elementes vorhandenen Atome (*atomare Häufigkeit, Atom-%*). Die atomare Häufigkeit des leichten Wasserstoffs im natürlichen Wasserstoff ist 99,8%; der schwere Wasserstoff kommt nur mit einer relativen Häufigkeit von etwa 0,02% in der Natur vor. Für die beiden bekannten Chlorisotope, Cl^{35} und Cl^{37} , kennen wir die relativen Häufigkeiten 75,4% und 24,6%.

Ohne äußere Einwirkung sind die relativen Häufigkeiten der einzelnen Isotopen eines chemischen Elementes überall auf der Erde gleich groß. Es gibt aber eine Reihe von physikalischen Methoden, das eine oder andere Isotop eines Elementes *anzureichern*. Wir können in diesem Zusammenhang nicht auf einzelne Methoden eingehen⁴.

Abb. 4 zeigt den Anfang einer Isotopenkarte, in welcher den gestrichelten Feldern die stabilen Isotopen zugeordnet sind, und zwar nach der Zahl der Protonen (Abszisse) und der Zahl der Neutronen (Ordinate) geordnet (*p-n-Darstellung*). Die relative Häufigkeit ist als Prozentzahl mit eingetragen, dazu links oben in der Ecke jedes Feldes die Massenzahl M (Protonen plus Neutronen).

¹ THOMSON, J. J.: Rays of positive electricity. New York: Longmans Green & Co. 1913.

² ASTON, F. W.: Phil. Mag. 38, 709 (1919).

³ BAINBRIDGE, K. T., u. E. B. JORDAN: Phys. Rev. 50, 282 (1936).

⁴ Über stabile Isotope und ihre Anwendung als Indikatoren kann man z. B. nachlesen bei: MAURER, W., u. K. SCHMEISER, Handbuch der Physiologisch- und Pathologisch-Chemischen Analyse, Hoppe-Seyler/Thierfelder, Bd. II/2, S. 687 ff. Berlin: Springer 1955.