l'intégrale

**MÉTHODES
ET EXERCICES**

MPSI

J.-M. MONIER, G. HABERER, C. LARDON

Mathématiques

méthodes et exercices

**CONFORME
AU NOUVEAU
PROGRAMME**

Synthèse des méthodes à connaître

De nombreux exercices classés
par méthode et par difficulté

Des indications pour démarrer
la résolution

Tous les corrigés rédigés

DUNOD

l'intégrale

**MÉTHODES
ET EXERCICES**

MPSI

JEAN-MARIE **MONIER**

GUILLAUME **HABERER**

CÉCILE **LARDON**

Mathématiques

méthodes et exercices

DUNOD

Conception et création de couverture : Atelier 3+

Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage.

Le Code de la propriété intellectuelle du 1^{er} juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements

d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour

les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée.

Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l'auteur, de son éditeur ou du

Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

© Dunod, Paris, 2013
ISBN 978-2-10-059836-6

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Énoncés des exercices

De nombreux exercices de difficulté croissante sont proposés pour s'entraîner. La difficulté de chaque exercice est indiquée sur une échelle de 1 à 4.

De mal à démarrer ?

1251 Montrer que $P_2(x) = 0$, $P_3(x) = 0$, $P_4(x) = 0$, $P_5(x) \neq 0$.

1252 Écrire l'expression algébrique simplifiée en fonction de x de $P_2(x)$.

1253 Utiliser les autres compléments 1 et 2 de $X^2 + X + 1$.

1254 Remarque que $P_2(x)$ est d'un trinôme en X .

1255 Il s'agit de trouver les racines. On peut donc se limiter à la recherche de racines, qui consiste à trouver une des trois formes pour faire apparaître un carré parfait.

1256 Passer par un trinôme complet, en remarquant de sorte possible que $P_2(x) = (X^2 + X + 1)$.

1257 Recherche d'un carré parfait. L'écriture de $P_2(x)$ en un trinôme complet. Utiliser le résultat de sorte possible.

1258 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1259 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1260 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1261 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1262 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1263 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1264 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1265 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1266 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1267 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1268 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1269 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1270 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1271 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1272 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1273 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1274 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1275 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1276 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1277 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1278 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1279 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1280 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1281 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1282 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1283 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1284 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1285 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1286 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1287 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1288 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1289 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1290 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1291 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1292 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1293 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1294 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1295 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1296 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1297 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1298 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1299 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

1300 Recherche d'un carré parfait en $X^2 + X + 1$.

Énoncés des exercices

1291 Calcul d'une somme, par récurrence

Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=0}^n (-1)^k k = \frac{(-1)^n (n+1) - 1}{2}$

1292 Exemple de calcul d'une somme, raisonnement par récurrence

Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k^2-1)} = \frac{n^2+n-2}{4n(n-1)}$

1293 Somme de coefficients binomiaux de 2 en 2

Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $A_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{2k}$ et $B_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{2k+1}$

1294 Exemples simples de résolution de systèmes d'équations linéaires

a) Résoudre le système d'équations linéaires, d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} (1) & 4x - 2y = 1 \\ (2) & 6x - 3y = 2 \end{cases}$$

b) Résoudre le système d'équations linéaires, d'inconnues $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{cases} (1) & 2x + y - z = 4 \\ (2) & x - 2y + z = 1 \\ (3) & x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

1295 Exemples de résolution de systèmes d'équations linéaires avec paramètres

Résoudre et discuter les systèmes d'équations linéaires, d'inconnues $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et de paramètres $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} a) & \begin{cases} x + y - 2z = 2 \\ x - y + z = 0 \\ 4x - 2y + az = a \end{cases} \\ b) & \begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \end{cases}$$

1296 Exemple de résolution d'un système d'équations linéaires avec paramètres

Résoudre et discuter le système d'équations linéaires, d'inconnues $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et de paramètres $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - y + 2z + a = 0, & -2x + 3y + z - b = 1, & -3x + 2y + 4z - 7 = a, & -a + 2y + 3z - 2x = b. \end{cases}$$

Du mal à démarrer ?

Des conseils méthodologiques sont proposés pour bien aborder la résolution des exercices.

Corrigés des exercices

Tous les exercices sont corrigés de façon détaillée.

Corrigés des exercices

1291 Calcul d'une somme, par récurrence

On pose $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k k$. On a $S_0 = 0$ et $S_1 = -1$. On suppose que $S_{n-1} = \frac{(-1)^{n-1} n - 1}{2}$. On a :

$$S_n = S_{n-1} + (-1)^n n = \frac{(-1)^{n-1} n - 1}{2} + (-1)^n n = \frac{(-1)^n (2n) - 1}{2} = \frac{(-1)^n (2n+1) - 1}{2}$$

1292 Exemple de calcul d'une somme, raisonnement par récurrence

On pose $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k^2-1)}$. On a $T_1 = \frac{1}{1(1-1)}$ qui n'est pas défini. On suppose que $T_{n-1} = \frac{(n-1)^2 + (n-1) - 2}{4(n-1)(n-2)}$. On a :

$$T_n = T_{n-1} + \frac{1}{n(n^2-1)} = \frac{(n-1)^2 + (n-1) - 2}{4(n-1)(n-2)} + \frac{1}{n(n^2-1)}$$

1293 Somme de coefficients binomiaux de 2 en 2

On a $A_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{2k}$ et $B_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{2k+1}$. On a $A_n + B_n = 2^n$ et $A_n - B_n = 0$ si n est pair, $A_n - B_n = 1$ si n est impair.

1294 Exemples simples de résolution de systèmes d'équations linéaires

a) On a $\begin{cases} 4x - 2y = 1 \\ 6x - 3y = 2 \end{cases}$. On pose $z = 3y - 2x$. On a $\begin{cases} 4x - 2y = 1 \\ z = 3y - 2x \end{cases}$. On a $4x - 2y = 1 \Leftrightarrow 2x - y = \frac{1}{2}$. On a $z = 3y - 2x = 3y - (2x - y) = 3y - \frac{1}{2} + y = 4y - \frac{1}{2}$. On a $z = 4y - \frac{1}{2}$. On a $y = \frac{z + \frac{1}{2}}{4}$. On a $x = \frac{2z + \frac{1}{2}}{4} = \frac{2z + \frac{1}{2}}{4}$. On a $(x, y) = \left(\frac{2z + \frac{1}{2}}{4}, \frac{z + \frac{1}{2}}{4} \right)$.

b) On a $\begin{cases} 2x + y - z = 4 \\ x - 2y + z = 1 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$. On pose $z = x - 2y$. On a $\begin{cases} 2x + y - (x - 2y) = 4 \\ x - 2y + (x - 2y) = 1 \\ x - 2y + (x - 2y) = 0 \end{cases}$. On a $\begin{cases} x + 3y = 4 \\ 2x - 4y = 1 \\ 2x - 4y = 0 \end{cases}$. On a $2x - 4y = 0 \Leftrightarrow x = 2y$. On a $2y + 3y = 4 \Leftrightarrow 5y = 4 \Leftrightarrow y = \frac{4}{5}$. On a $x = 2y = \frac{8}{5}$. On a $z = x - 2y = \frac{8}{5} - \frac{8}{5} = 0$. On a $(x, y, z) = \left(\frac{8}{5}, \frac{4}{5}, 0 \right)$.

1295 Exemples de résolution de systèmes d'équations linéaires avec paramètres

a) On a $\begin{cases} x + y - 2z = 2 \\ x - y + z = 0 \\ 4x - 2y + az = a \end{cases}$. On pose $z = x - y$. On a $\begin{cases} x + y - 2(x - y) = 2 \\ x - y + (x - y) = 0 \\ 4x - 2y + a(x - y) = a \end{cases}$. On a $\begin{cases} -x + 3y = 2 \\ 2x - 2y = 0 \\ 4x - 2y + ax - ay = a \end{cases}$. On a $2x - 2y = 0 \Leftrightarrow x = y$. On a $-x + 3x = 2 \Leftrightarrow 2x = 2 \Leftrightarrow x = 1$. On a $y = x = 1$. On a $z = x - y = 0$. On a $(x, y, z) = (1, 1, 0)$.

b) On a $\begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$. On pose $z = 1 - x - y$. On a $\begin{cases} 2x + y + (1 - x - y) = 1 \\ x + y + (1 - x - y) = 1 \end{cases}$. On a $\begin{cases} x = 0 \\ 1 = 1 \end{cases}$. On a $x = 0$. On a $y + z = 1$. On a $z = 1 - y$. On a $(x, y, z) = (0, y, 1 - y)$.

1296 Exemple de résolution d'un système d'équations linéaires avec paramètres

On a $\begin{cases} x - y + 2z + a = 0 \\ -2x + 3y + z - b = 1 \\ -3x + 2y + 4z - 7 = a \\ -a + 2y + 3z - 2x = b \end{cases}$. On pose $z = x - y - \frac{a}{2}$. On a $\begin{cases} x - y + 2(x - y - \frac{a}{2}) + a = 0 \\ -2x + 3y + (x - y - \frac{a}{2}) - b = 1 \\ -3x + 2y + 4(x - y - \frac{a}{2}) - 7 = a \\ -a + 2y + 3(x - y - \frac{a}{2}) - 2x = b \end{cases}$. On a $\begin{cases} x - y + 2x - 2y - a + a = 0 \\ -x + 2y - \frac{a}{2} - b = 1 \\ -3x + 2y + 4x - 4y - 2a - 7 = a \\ -a + 2y + 3x - 3y - \frac{3a}{2} - 2x = b \end{cases}$. On a $\begin{cases} x - y = 0 \\ -x + 2y = 1 + \frac{a}{2} + b \\ x - y = 2a + 7 \\ -x + y = b + \frac{a}{2} \end{cases}$. On a $x = y$. On a $-x + 2x = 1 + \frac{a}{2} + b \Leftrightarrow x = 1 + \frac{a}{2} + b$. On a $y = x = 1 + \frac{a}{2} + b$. On a $z = x - y - \frac{a}{2} = 1 + \frac{a}{2} + b - 1 - \frac{a}{2} - b = 0$. On a $(x, y, z) = \left(1 + \frac{a}{2} + b, 1 + \frac{a}{2} + b, 0 \right)$.

Remerciements

Nous tenons ici à exprimer notre gratitude aux nombreux collègues qui ont accepté de réviser des parties du manuscrit :

Marc Albrecht, Bruno Arsac, Jean-Philippe Berne, Jacques Blanc, Gérard Bourgin, Sophie Cohéléach, Carine Courant, Sylvain Delpech, Hermin Durand, Jean Feyler, Viviane Gaggioli, Marguerite Gauthier, Daniel Genoud, André Laffont, Hadrien Larôme, Ibrahim Rihaoui, René Roy, Philippe Saadé, Marie-Dominique Siéfert, Marie-Pascale Thon, Audrey Verdier.

Table des matières

Pour bien utiliser cet ouvrage	iv	15 Algèbre des polynômes	214
Remerciements	vii	16 Arithmétique des polynômes	227
1 Raisonnement, vocabulaire ensembliste	1	17 Espaces vectoriels	241
2 Calculs algébriques	18	18 Espaces vectoriels de dimension finie	250
3 Nombres complexes et trigonométrie	33	19 Applications linéaires	259
4 Fonctions d'une variable réelle	48	20 Calcul matriciel	272
5 Calcul différentiel élémentaire	60	21 Matrices et applications linéaires	287
6 Fonctions usuelles	75	22 Déterminants	302
7 Calculs de primitives	90	23 Espaces préhilbertiens réels	317
8 Équations différentielles linéaires	108	24 Intégration	335
9 Nombres réels, suites numériques	126	25 Séries	352
10 Limites, continuité	147	26 Dénombrements	370
11 Dérivabilité	159	27 Probabilités sur un univers fini	385
12 Analyse asymptotique	172	28 Variables aléatoires	402
13 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$	190	29 Couples de variables aléatoires	416
14 Structures algébriques usuelles	201	30 Informatique	440
		Index	473

Raisonnement, vocabulaire ensembliste

Chapitre 1

Plan

Les méthodes à retenir	2
Les énoncés des exercices	7
Du mal à démarrer ?	11
Les corrigés des exercices	12

Thèmes abordés dans les exercices

- Mise en oeuvre, sur des exemples simples, des différents types de raisonnement
- Égalités et inclusions d'ensembles obtenus par opérations sur des parties d'un ensemble
- Injectivité, surjectivité, bijectivité
- Image directe, image réciproque d'une partie par une application.

Points essentiels du cours pour la résolution des exercices

- Définition et propriétés des opérations entre ensembles, $\cap$, $\cup$, $\complement_E$, $\setminus$
- Définition de la fonction indicatrice d'une partie d'un ensemble
- Définition du produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles
- Définition et propriétés de l'injectivité, de la surjectivité, de la bijectivité pour les applications
- Définition de l'image directe, de l'image réciproque d'une partie par une application
- Relations d'équivalence, relations d'ordre.

Les méthodes à retenir

Méthode

Pour travailler de manière générale sur des ensembles

Essayer de passer par les éléments des ensembles, ou de calculer globalement sur les ensembles. La deuxième voie est en général plus courte et plus claire (si elle est praticable).

→ Exercices 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.16 à 1.18

Exemple

Soient E un ensemble, $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$.
Montrer : $(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = A \setminus (B \cup C)$.

On a :

$$\begin{aligned} (A \setminus C) \setminus (B \setminus C) &= (A \cap \overline{C}) \setminus (B \cap \overline{C}) \\ &= (A \cap \overline{C}) \cap \overline{B \cap \overline{C}} \\ &= (A \cap \overline{C}) \cap (\overline{B} \cup C) \\ &= (A \cap \overline{C} \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C} \cap C) \\ &= A \cap \overline{B} \cap \overline{C} \\ &= A \cap (\overline{B \cup C}) \\ &= A \setminus (B \cup C). \end{aligned}$$

Méthode

Pour établir une égalité d'ensembles

Essayer de :

- soit montrer directement l'égalité
- soit montrer deux inclusions : $A \subset B$ et $B \subset A$
- soit utiliser les fonctions indicatrices des parties d'un ensemble

→ Exercices 1.2, 1.7, 1.8, 1.12, 1.18

Dans chacune des deux premières options, on essaie de passer par les éléments ou de calculer globalement sur les ensembles.

Exemple

Soient E un ensemble, $A, B \in \mathcal{P}(E)$.
Montrer :
 $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = A \setminus (B \cap C)$.

On a :

$$\begin{aligned} (A \setminus B) \cup (A \setminus C) &= (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C}) \\ &= A \cap (\overline{B} \cup \overline{C}) \\ &= A \cap \overline{B \cap C} \\ &= A \setminus (B \cap C). \end{aligned}$$

Exemple

Montrer :

$$\{y \in \mathbb{R}; \exists x \in [-1; 2], y = x^2\} = [0; 4].$$

• Soit $y \in \mathbb{R}$ tel qu'il existe $x \in [-1; 2]$ tel que $y = x^2$.

Si $x \in [-1; 0]$, alors $y \in [0; 1]$.

Si $x \in [0; 2]$, alors $y \in [0; 4]$.

On déduit $y \in [0; 4]$.

Ceci montre que le premier ensemble est inclus dans le second.

• Réciproquement, soit $y \in [0; 4]$.

En notant $x = \sqrt{y}$, on a $x \in [0; 2] \subset [-1; 2]$ et $y = x^2$.

Ceci montre que le second ensemble est inclus dans le premier.

On conclut à l'égalité demandée.

Méthode

Montrer que :

Pour montrer, par récurrence (faible), qu'une propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier n tel que $n \geq n_0$

- $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie (*initialisation*)
- pour tout entier n fixé tel que $n \geq n_0$, si $\mathcal{P}(n)$ est vraie, alors $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie (*hérédité*).

→ Exercice 1.5

Exemple

On considère la suite de Fibonacci $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\phi_0 = 0$, $\phi_1 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \phi_{n+2} = \phi_{n+1} + \phi_n.$$

Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \phi_{n+1}^2 - \phi_{n+2}\phi_n = (-1)^n.$$

Initialisation :

Pour $n = 0$, on a : $\phi_1^2 - \phi_2\phi_0 = 1^2 - 1 \cdot 0 = 1 = (-1)^0$,

donc la formule est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : Supposons que la formule soit vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé.

On a alors :

$$\begin{aligned} \phi_{n+2}^2 - \phi_{n+3}\phi_{n+1} &= \phi_{n+2}^2 - (\phi_{n+2} + \phi_{n+1})\phi_{n+1} \\ &= (\phi_{n+2}^2 - \phi_{n+2}\phi_{n+1}) - \phi_{n+1}^2 \\ &= \phi_{n+2}(\phi_{n+2} - \phi_{n+1}) - \phi_{n+1}^2 \\ &= \phi_{n+2}\phi_n - \phi_{n+1}^2 \\ &= -(\phi_{n+1}^2 - \phi_{n+2}\phi_n) \\ &= -(-1)^n = (-1)^{n+1}, \end{aligned}$$

donc la formule est vraie pour $n+1$.

Ceci montre, par récurrence, que la formule est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Méthode

Montrer que :

Pour montrer, par récurrence à deux pas, qu'une propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier n tel que $n \geq n_0$

- $\mathcal{P}(n_0)$ et $\mathcal{P}(n_0+1)$ sont vraies (*initialisation*)
- pour tout entier n fixé tel que $n \geq n_0$, si $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ sont vraies, alors $\mathcal{P}(n+2)$ est vraie (*hérédité*).

→ Exercice 1.10

Exemple

On considère la suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 0, u_1 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \frac{u_{n+1} + u_n}{2}.$$

Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n > 0.$$

Initialisation : Pour $n = 1$, on a $u_1 = 1 > 0$, et, pour $n = 2$, on a $u_2 = \frac{u_1 + u_0}{2} = \frac{1}{2} > 0$ donc la propriété est vraie pour $n = 1$ et pour $n = 2$.

Hérédité : Supposons que la propriété soit vraie pour n et $n + 1$, où $n \in \mathbb{N}^*$ est fixé. On a donc $u_n > 0$ et $u_{n+1} > 0$, d'où $\frac{u_{n+1} + u_n}{2} > 0$, donc la propriété est vraie pour $n + 2$.

Ceci montre, par récurrence à deux pas, que la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Méthode

Montrer que :

Pour montrer, par récurrence forte, qu'une propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier n tel que $n \geq n_0$

- $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie (*initialisation*)
- pour tout entier n fixé tel que $n \geq n_0$, si $\mathcal{P}(n_0), \dots, \mathcal{P}(n)$ sont vraies, alors $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie (*hérédité*).

→ Exercice 1.11

Exemple

On considère la suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $u_1 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \frac{u_1 + u_2^2 + \dots + u_n^n}{n^n}.$$

Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 < u_n \leq 1$.

Initialisation : Pour $n = 1$, on a bien $0 < u_1 \leq 1$ car $u_1 = 1$.

Hérédité : Supposons, pour un $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, que l'on ait :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, 0 < u_k \leq 1.$$

On a alors : $u_{n+1} = \frac{u_1 + u_2^2 + \dots + u_n^n}{n^n} > \frac{0 + \dots + 0}{n^n} = 0$

et $u_{n+1} = \frac{u_1 + u_2^2 + \dots + u_n^n}{n^n} \leq \frac{1 + \dots + 1}{n^n} = \frac{n}{n^n} = \frac{1}{n^{n-1}} \leq 1$.

Ceci montre, par récurrence forte : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 < u_n \leq 1$.

Méthode

Essayer de :

Pour résoudre une question portant sur injectivité, surjectivité, bijectivité, d'applications dans un cadre général

- utiliser les définitions et les propositions du cours sur la composée de deux applications injectives (resp. surjectives)
- utiliser le résultat de l'exercice classique 1.14 (en le redémontrant).

→ Exercices 1.3, 1.14, 1.15

Exemple

Soient E un ensemble, $f : E \rightarrow E$ une application telle que $f \circ f = \text{Id}_E$.
Montrer que f est bijective et que :

$$f^{-1} = f.$$

* • *Injectivité* : Soit $(x_1, x_2) \in E^2$ tel que $f(x_1) = f(x_2)$.

On a alors :

$$x_1 = (f \circ f)(x_1) = f(f(x_1)) = f(f(x_2)) = (f \circ f)(x_2) = x_2.$$

Ceci montre que f est injective.

• *Surjectivité* : Soit $y \in E$.

On a : $y = (f \circ f)(y) = f(f(y))$, donc il existe $x \in E$ (on peut prendre $x = f(y)$) tel que $y = f(x)$. Ceci montre que f est surjective.

On conclut que f est bijective.

* Puisque f est bijective, on peut utiliser f^{-1} et on a :

$$f^{-1} = f^{-1} \circ \text{Id}_E = f^{-1} \circ (f \circ f) = (f^{-1} \circ f) \circ f = \text{Id}_E \circ f = f.$$

Méthode

Pour manipuler, dans un cadre général, des images directes, des images réciproques de parties par des applications

Appliquer les définitions.

Pour $f : E \rightarrow F$, $A \in \mathcal{P}(E)$, $A' \in \mathcal{P}(F)$, on a :

$$f(A) = \{y \in F; \exists a \in A, y = f(a)\},$$

$$f^{-1}(A') = \{x \in E; f(x) \in A'\}.$$

Autrement dit :

$$\text{pour tout } y \in F : y \in f(A) \iff (\exists a \in A, y = f(a))$$

$$\text{et, pour tout } x \in E : x \in f^{-1}(A') \iff f(x) \in A'.$$

→ Exercices 1.16, 1.17

Exemple

Soient E, F deux ensembles, une application $f : E \rightarrow F$ et $A' \in \mathcal{P}(F)$.

Montrer :

$$f^{-1}(\mathbb{C}_F(A')) = \mathbb{C}_E(f^{-1}(A')).$$

On a, pour tout $x \in E$:

$$x \in f^{-1}(\mathbb{C}_F(A')) \iff f(x) \in \mathbb{C}_F(A')$$

$$\iff f(x) \notin A'$$

$$\iff \text{Non } (f(x) \in A')$$

$$\iff \text{Non } (x \in f^{-1}(A'))$$

$$\iff x \in \mathbb{C}_E(f^{-1}(A')),$$

d'où l'égalité voulue.

Méthode

Pour montrer qu'une relation $\mathcal{R}$, dans un ensemble E , est une relation d'équivalence

Revenir à la définition, c'est-à-dire montrer que :

• $\mathcal{R}$ est réflexive : $\forall x \in E, x \mathcal{R} x$

• $\mathcal{R}$ est symétrique : $\forall (x, y) \in E^2, (x \mathcal{R} y \implies y \mathcal{R} x)$

• $\mathcal{R}$ est transitive : $\forall (x, y, z) \in E^3, \begin{cases} x \mathcal{R} y \\ y \mathcal{R} z \end{cases} \implies x \mathcal{R} z.$

→ Exercice 1.6

Exemple

On note $\mathcal{R}$ la relation définie dans $\mathbb{R}$ par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \mathcal{R} y \iff |x| = |y|).$$

Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence dans $\mathbb{R}$ et déterminer, pour tout $x \in \mathbb{R}$, la classe de x modulo $\mathcal{R}$.

- * • On a, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x| = |x|$, d'où $x \mathcal{R} x$, donc $\mathcal{R}$ est réflexive.
- On a, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$x \mathcal{R} y \iff |x| = |y| \iff |y| = |x| \iff y \mathcal{R} x,$$

donc $\mathcal{R}$ est symétrique.

- On a, pour tous $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x \mathcal{R} y \\ y \mathcal{R} z \end{cases} \iff \begin{cases} |x| = |y| \\ |y| = |z| \end{cases} \implies |x| = |z| \iff x \mathcal{R} z,$$

donc $\mathcal{R}$ est transitive.

On conclut que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence dans $\mathbb{R}$.

- * Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la classe de x modulo $\mathcal{R}$ est :

$$\hat{x} = \{y \in \mathbb{R}; x \mathcal{R} y\} = \{y \in \mathbb{R}; |x| = |y|\} = \begin{cases} \{x, -x\} & \text{si } x \neq 0 \\ \{0\} & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Méthode

Pour montrer qu'une relation $\mathcal{R}$, dans un ensemble E , est une relation d'ordre

Revenir à la définition, c'est-à-dire montrer que :

- $\mathcal{R}$ est réflexive : $\forall x \in E, x \mathcal{R} x$
- $\mathcal{R}$ est antisymétrique : $\forall (x, y) \in E^2, \begin{cases} x \mathcal{R} y \\ y \mathcal{R} x \end{cases} \implies x = y$
- $\mathcal{R}$ est transitive : $\forall (x, y, z) \in E^3, \begin{cases} x \mathcal{R} y \\ y \mathcal{R} z \end{cases} \implies x \mathcal{R} z$.

→ Exercices 1.9, 1.13

Exemple

On note $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $\leq$ la relation définie dans E par, pour toutes $f, g \in E$:

$$f \leq g \iff (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x)).$$

Montrer que $\leq$ est une relation d'ordre dans E . Cet ordre est-il total ?

- * • On a, pour toute $f \in E$: $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq f(x)$, d'où $f \leq f$, donc $\leq$ est réflexive.

- On a, pour toutes $f, g \in E$:

$$\begin{cases} f \leq g \\ g \leq f \end{cases} \iff \begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x) \\ \forall x \in \mathbb{R}, g(x) \leq f(x) \end{cases} \iff (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x)) \iff f = g,$$

donc $\leq$ est antisymétrique.

- On a, pour toutes $f, g, h \in E$:

$$\begin{cases} f \leq g \\ g \leq h \end{cases} \iff \begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x) \\ \forall x \in \mathbb{R}, g(x) \leq h(x) \end{cases} \implies (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq h(x)) \iff f \leq h,$$

donc $\leq$ est transitive.

Ceci montre que $\leq$ est une relation d'ordre dans E .

- * Considérons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 0$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x$.

On a $f(1) = 0 < 1 = g(1)$, donc on n'a pas $g \leq f$.

On a $f(1) = 0 > -1 = g(-1)$, donc on n'a pas $f \leq g$.

On conclut que l'ordre $\leq$ sur E n'est pas total.

Énoncés des exercices

1.1 Exemple de calcul ensembliste : inclusion

Soient E un ensemble, $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$.

a) Montrer : $(A \cup B) \cap C \subset A \cup (B \cap C)$.

b) Établir qu'il y a égalité dans l'inclusion précédente si et seulement si : $A \subset C$.

1.2 Exemple de calcul ensembliste : équivalence entre deux égalités

Soient E un ensemble, $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$. Montrer :

$$A \cap B = A \cap C \iff A \cap \complement_E(B) = A \cap \complement_E(C).$$

1.3 Exemple d'une restriction bijective

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ donnée par : $f(x) = \frac{3x-1}{x-2}$.

a) Montrer qu'il existe un réel et un seul, noté a , n'ayant pas d'image par f .

b) Montrer qu'il existe un réel et un seul, noté b , n'ayant pas d'antécédent par f .

c) Montrer que la restriction g de f à $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ au départ et à $\mathbb{R} \setminus \{b\}$ à l'arrivée est bijective, et préciser l'application réciproque g^{-1} de g .

1.4 Exemple de calcul de composée de deux applications

On note $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ les applications définies, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par :

$$f(x) = 1 + x, \quad g(x) = x^2.$$

Préciser $f \circ g$ et $g \circ f$. A-t-on $f \circ g = g \circ f$?

1.5 Exemple de raisonnement par récurrence (faible)

On considère la suite de Lucas $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $L_0 = 2$, $L_1 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad L_{n+2} = L_{n+1} + L_n.$$

Montrer, par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

a) $L_{n+1}^2 - L_n L_{n+2} = 5(-1)^{n+1}$

b) $\sum_{k=0}^n L_k^2 = L_n L_{n+1} + 2$

c) $L_{2n} = L_n^2 - 2(-1)^n$ et $L_{2n+1} = L_n L_{n+1} - (-1)^n$.

1.6 Exemple de relation d'équivalence dans $\mathbb{R}$

On note $\mathcal{R}$ la relation définie dans $\mathbb{R}$ par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \mathcal{R} y \iff x^2 - 2x = y^2 - 2y).$$

- Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence dans $\mathbb{R}$.
- Déterminer, pour tout $x \in \mathbb{R}$, la classe d'équivalence de x modulo $\mathcal{R}$.

1.7 Réunion ou intersection de produits cartésiens

Soient E, F deux ensembles, A_1, A_2 des parties de E , B_1, B_2 des parties de F .

- Montrer : $(A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) = (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2)$.
- 1) Montrer : $(A_1 \times B_1) \cup (A_2 \times B_1) = (A_1 \cup A_2) \times B_1$.
- 2) A-t-on nécessairement : $(A_1 \times B_1) \cup (A_2 \times B_2) = (A_1 \cup A_2) \times (B_1 \cup B_2)$?

1.8 Études de $\mathcal{P}(E \cap F)$ et de $\mathcal{P}(E \cup F)$

- Montrer : $E \subset F \iff \mathcal{P}(E) \subset \mathcal{P}(F)$.
- Établir : $\mathcal{P}(E \cap F) = \mathcal{P}(E) \cap \mathcal{P}(F)$.
- A-t-on : $\mathcal{P}(E \cup F) = \mathcal{P}(E) \cup \mathcal{P}(F)$?

1.9 Exemple de relation d'ordre sur les entiers

On considère la relation $\mathcal{R}$ définie dans $\mathbb{N}^*$ par : $x \mathcal{R} y \iff (\exists n \in \mathbb{N}^*, y = x^n)$.

- Montrer que $\mathcal{R}$ est un ordre sur $\mathbb{N}^*$.
- Est-ce que $\mathcal{R}$ est total ?

1.10 Exemple de raisonnement par récurrence à deux pas

On considère la suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 0, u_1 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \frac{u_{n+1} + u_n}{2} + 1.$$

Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.

1.11 Exemple de raisonnement par récurrence forte

On considère la suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^n \frac{u_k}{k!(n-k)!}.$$

Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{Q}_+^*$.