

串雅內編卷一

錢塘趙學敏恕軒纂輯

錢塘吳庚生平格補註

截藥

總治門

黃鶴丹 朱衣翁在黃鶴樓所授故名

香附

一斤

黃連

斤洗晒為末

水糊丸如梧子大如外感蔥薑湯下內傷

米湯下氣病木香湯下

或沈香或木香隨時酌用

血病酒下痰病薑湯下火病白

滾湯下餘可類推

青囊丸

邵應節真人母病方士所授

香附

畧炒

烏藥

畧泡五兩三錢

為末水醋煮麴糊為丸隨証用引如頭痛茶

下痰氣薑湯下血病酒下之類

飛霞子韓悉昔游方外治百病男用黃鶴丹女用青囊丸此二藥乃遊方之祖方也

庚生按編中所載各方用之得宜奏效自捷然須詳審病人體質之虛實症之寒熱慎勿妄投致誤

鯉鯪丸 治一切無名腫毒治瘰癧尤效

歸尾

錢五

大黃

荆芥

桔梗

乳香

錢五

沒藥

錢二

黃芩

連翹

錢三

防風

錢五

羌活

錢二

金蠟

錢一

蟬退

錢二

僵蠶

錢二

牛皮膠

錢一

土炒雄

錢一

黃分

錢七

金頭蜈蚣

錢四

錢去

分作四樣法製一條用薑汁搽焙乾一條用

香油搽焙乾一條用醋搽焙乾一條用酥搽灸再用穿山甲四兩亦

作四製一兩用紅花五錢煎湯煮焙乾一兩用牙皂伍錢煎湯煮焙

乾一兩用紫草節五錢煎湯煮焙乾一兩用蘇木五錢煎湯煮焙乾

右藥共為細末用真米醋打糊為丸每丸重一錢二分硃砂一錢五

分共為衣磁瓶收貯內用麝香五分以養之每服一丸滾酒送下未

成內消已成出膿神效異常

蜜犀丸 治半身不遂口眼喎斜語言不利小兒驚風抽搐等症

槐花炒四兩 當歸 川烏 元參炒各二兩 麻黃 茯苓乳拌 防風 薄荷

甘草各一兩 豬牙皂角去皮弦子炒五錢 冰片五分另研

先以前十味研細末後入冰片和勻蜜丸櫻桃大每服一丸小兒減半細嚼清茶送下

庚生按小兒驚風有急慢之別二者判若天淵古今方書每混合不分殊不知急驚屬火屬痰屬實者多慢驚屬風脾虛生風屬寒屬虛者多

此方內有川烏牙皂麻黃冰片諸品辛燥升散開竅祛風投之急驚恐小兒稚陰稚陽難禁耗散惟內有實火實痰者尚可無害倘誤施之慢驚脾虛生風之症恐下咽立斃矣慎之慎之

普濟丹 治一切瘟疫時氣惡寒發熱昏迷頭痛等症

製大黃

一兩五錢

生大黃

一兩五錢

僵蠶

三兩

生薑汁

搗糊為丸

重九分

七分五

分凡三等

遇瘟疫時症

取無根井花水服之

即平旦井中取視病人起第一汲之水

起第一汲之水

視病人

之老幼強弱為多寡之準

之老幼強弱為多寡之準

蓬萊丸

治男婦老幼一切感冒瘟疫時症

蒼朮

八兩米泔浸透陳壁土炒

半夏

薑汁製

柴胡

黃芩

厚朴

薑汁炒

廣皮

枳實

炒羌活

蘇葉

木通

各四兩

山查

炒萊菔子

炒各六兩

右藥共為末

鮮荷葉煎湯和藥晒乾加神麴六兩打糊為丸重三錢

硃砂五錢雄黃一兩研末為衣頭痛寒熱蔥薑湯下咳嗽痰喘薑汁

湯下中暑香薷扁五湯下瘧疾薑汁冲服紅白痢木香檳榔湯下霍

亂吐瀉藿香砂仁湯下腹痛水瀉赤芍車前子湯下飽悶陳皮木香

湯下不服水土廣藿香湯下山嵐瘴氣蠱毒蟲積檳榔湯下不識病

原諸症白滾水下大人一丸小兒孕婦及吐血虛損人半丸服藥後

忌食生冷麵食

發汗散 此路途救急神方專治一切感冒風寒行旅之人如能備帶隨時施濟功德莫大

綠豆粉

麻黃去根節

甘草

各等分為極細末用無根水半茶杯調

服一錢即時汗出自愈

庚生按此古方諸葛解甲散也加入甘草一味更為妥善惟服時須量強弱加減壯者錢半次者一錢十歲以下用五六分不用蓋被其汗立出然不及椒杏丸方尤為平和方列後 杏仁三十粒白胡椒三十粒共搗為末生薑汁為丸握手心中一時自然汗出傷寒用此於虛損人尤宜

松梅丸 健陽補中強筋潤肌大能益人

用松脂以長流水桑柴火煮拔三次再以桑灰淋汁煮七次扯拔七

次再以好酒煮二次仍用長流水煮二次以色白味不苦為度每一斤入熟地黃末十兩烏梅末六兩蜜丸如梧子大每服二三錢空心鹽米湯下

仙桃丸 治手足麻痺或癱瘓痰痛腰膝痺痛或打撲傷損悶胸痛不可忍

生川烏

皮不去

五靈脂

各四兩

威靈仙

五兩

洗晒為末

酒糊丸

如梧子大

每

服七丸至十丸鹽湯下忌飲茶此藥常服其效如神

庚生按此即古方烏龍丹以威靈仙易麝香耳風痺諸症虛實參半不可不慎如治跌撲傷閃及有風邪有瘀血者為宜然亦不可多服久服

餘糧丸 治腫脹并脫力勞傷

皂礬

八兩用紅醋二茶杯煨至紅色放地上出火毒

餘糧石

四兩

砂仁

四錢薑汁炒

白豆蔻

四錢

炒厚朴

四錢炒

廣皮

三錢乾漆

一兩炒以烟盡為度

白芷

二錢鐵梗茵陳

五錢海金沙

一錢

川貝

二錢益母草

一錢廣木香

二錢地骨皮

二錢各為細末

以黑棗搗爛為丸

如緩症

日服七分

夜服八分

重症每服二三錢

以好酒下之

此方并治男婦翻胃噎膈腹痛小兒喜吃泥土生米等物及積年黃疸諸症極重者服至六兩必能全愈孕婦忌服此藥服後終身忌食河豚蕎麥虛損之人忌用

八仙丹

治小兒百病

此方以已霜為君體質熱者勿服

已霜

一錢硃砂

五錢鬱金

五錢乳香

二錢

沒藥

三錢沉香

五錢木香

四錢雄黃

六錢

右藥為末滴水為丸如粟米大每服二三丸驚癇抽搐赤金湯下潮熱變蒸燈心湯下傷風傷寒薑湯下痰涎壅塞薑汁竹瀝湯下食積肚痛山查麥芽湯下痢疾泄瀉薑汁沖開水下

花蕊石散

治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損狗咬至死者急以後藥摻

傷處其血化為黃水再摻便活更不疼痛如內損血入臟腑煎童便入酒少許熱調後藥一錢服之立效牲畜抵傷腸出不損者急納入用桑皮線縫之摻藥血止立活婦人產後敗血不盡血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死但心頭溫暖者急以童便調服一錢取下惡物如猪肝終身不患血風血氣若膈上有血化為黃水即時吐出或隨小便出甚效

硫黃

兩四
兩一

並為末拌勻用瓦罐盛之泥封口焙乾安西方磚上

磚上書八卦五行字用炭十六兩簇匣從巳午時自下生火煨至炭

消冷定取出為細末磁瓶收用

紫陽真君塞鼻丹

沉香乳沒四味香牙皂華撥大良薑官桂細辛各等分巴豆川烏好麝香又加雄黃硃砂等血竭硃砂共裏勦丸作一粒指頭大呼吸鼻

氣病離床心疼肚痛塞鼻孔臃脹痧氣不須忙水瀉痢疾時間住牙
痛見了笑一場赤白痢下俱痊可渾身疼痛即安康紫陽真君無虛
語妙藥傳世普八方若將一粒隨身帶途中有病亦無妨

神仙太乙膏

治一切癰疽瘡毒已未成潰者如治發背先以溫水洗淨

軟絹拭乾將膏用紅布攤貼如治瘰癧用鹽湯洗淨攤貼風赤眼搜
作小餅貼太陽穴腰膝疼痛貼患處婦人經脈不通腹痛貼臍口一
切疥瘡用麻油煎滾和膏塗之虎犬蛇蝎傷刀斧傷亦貼患處

元參

白芷

當歸

赤芍

肉桂

大黃

生地

各一兩

麻油二斤

入銅鍋內煎至黑濾去渣入黃丹十二兩再煎成滴水手捻軟硬得
中即成膏矣腫毒跌撲疼痛加乳香沒藥煎油時應加槐桃桑柳嫩
枝各一兩

附製丹法黃丹先炒紫色傾入缸內用滾水一桶泡之再汲涼水滿

缸用棒常攪浸一宿去水再炒如前二次研令極細用甘草二兩薄荷防風紅花各五錢同煎收乾尤妙

人龍丸

人龍二十條熟地

五錢

川連

六分

炒

萊菔子

一錢

大紅棗

三十枚

藕粉

一兩五錢

右藥先將人龍用真童便洗淨勿破用陰陽瓦焙乾研末紅棗於飯鍋上蒸熟去皮核將人龍川連萊菔子藕粉共研細末以熟地紅棗同搗爛糊丸如梧子大初服七丸開水吞下逐日加二丸加至念一丸止不得再加一料服畢諸病自愈

按此方見毛達可濟世養生集屢用獲效誠妙方也

截藥

內治門

治傷寒結胸

瓜萆一枚槌碎入甘草一錢同煎服之

食結在胸非大黃芒硝枳殼檳榔厚朴之類所能祛逐必得瓜萆始得陷之入於脾中尤恐其過於泄也少加甘草以留之且得甘草之和不至十分推蕩此變症而用變法勝於用正也

擊瘧

黃丹

五錢生用

白明礬

三錢生用

胡椒

一錢分爲末

麝香

半分

右藥各爲末臨發時對太陽坐定將好米醋調藥男左女右傳於手掌心外加絹帕繫紮待藥力熱方可行走以出汗爲度如陰天以火鑪烘脚此藥一料能治三人年老身弱畏服藥者以此治之

宣木散 專散肝木中之火肝火既達則諸經之火盡散

白芍

三錢

柴胡

二錢

丹皮

二錢

元參

三錢

麥冬

三錢

荊芥

三錢

生地

三錢

梔子

三錢炒

防

風

一錢

天花粉

二錢

水煎服

辟瘟丹

蒼朮為君須加倍用其餘羌活獨活白芷香附大黃甘松山柰赤箭雄黃各等分為細末麵糊丸如彈子火黃丹為衣晒乾焚之可辟時氣

截頭風 治偏正頭風百藥不效一服便愈此天下第一方也

香白芷

二兩五錢炒

川芎炒甘草炒川烏頭

半生半熟以上各一兩

右藥為末每服一錢細茶薄荷湯調下

薄荷不得過分

治頭痛 兼治腦疼

川芎

一沙參兩蔓荊子

二錢細辛

五分

水二碗煎八分加黃酒半碗調勻

早晨服之一劑之後永不復發

鶴頂丹

治痰氣結胸不問陰陽虛實較勝陷胸瀉心等藥

銀硃

五錢明礬兩

一同研以熨斗盛火以瓦盛藥鎔化急刮下搓丸每服

一錢細茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胸自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰銀硃破積故也

痰火神方

牛黃

硃砂各一

冰片

麝香

三將

蝦蟆

取膽

和前

四味為末碾細

將病人舌尖刺破用藥點上其痰即時下行

時行痰嗽致面目浮腫終夕不寐

蚌粉少加青黛用淡蘆水滴麻油數點調服三錢

庚生按此即古方蛤利散之類然用不得法每易作嘔致藥難下咽不如用蛤利散為便方用蛤利殼三四兩洗淨炭火煨焙不可過性以燒出氣味炸響為度取出放地上出火毒研細收存如遇痰火喘嗽之症取一兩分為三服少吃晚飯先用稀麵和調捏成丸如黃豆大用開水將丸兩三口吞下旋丸旋吞不可放乾藥纔下咽痰即下

行此神方也

保靈丹 治蟲蠱諸毒并解一切藥毒

大山豆根

錢五

雄黃

一兩

硃砂

一兩

黃藥子

黃丹

麝香

斑蝥

去頭足各

二分糯米

半升

炒黃川

巴豆

肥者

取肉不去

續隨子

生并研末

赤蜈蚣

二錢五分

二錢五分

赤蜈蚣

二錢五分

赤蜈蚣

一錢

右藥入乳鉢研細末和勻端午重陽臘日修合宜避婦人及雞犬用

糯米湯和丸如龍眼核大陰乾磁瓶收貯每一丸細茶吞服不得嚼

破須臾毒物即下藥丸凝血並下以水洗淨仍可用每丸可抹三人

交感丹 治一切名利失意抑鬱煩惱七情所傷不思飲食面黃形羸胸

膈諸症極有神效

香附

二斤用瓦器炒令

黃色取淨末一斤

茯神

去皮

四兩

右為細末蜜丸如彈子大每服一丸空心細嚼白滾湯或降氣湯下

附降氣湯方香附五錢如前法製加茯神二兩炙甘草一兩五錢為末點沸湯服前藥

庚生按此方醫書彙參中有之香附用一斤以長流水浸三日擦去毛以薑汁童便陳酒米醋四物各炒一次焙乾加茯神四兩研細末和勻蜜丸如彈子大香附不可近鐵器以上兩藥分量既配製法亦佳較勝於前方也

治尸厥 凡見鬼者兼治之

蒼朮

三兩切片

水六碗煎成三碗灌之吐後即愈

獨步散

治心脾氣痛凡人胸膛軟處痛者由於氣與寒結或致終身子

母相傳俗名心氣痛其實非也乃胃脘有滯以此治之立愈

香附

未醋浸畧炒為末

高良薑

酒洗七次畧炒

俱各封收因寒者薑二錢附一錢因

氣者附二錢薑一錢因氣與寒者各等分和勻熟米湯入薑汁一匙

鹽一捻調服立止不過七八次可除根矣

膈氣暫開關方

荔枝

一個去核

將蜨蚰

一條

放在荔枝肉內

加冰片

三四釐

搽在蜨蚰上

即

將荔枝肉裏好仍放在殼內

紫緊令病人含在口內

有冷涎水搽出

可徐徐嚥下俟一時許蜨蚰已化無水搽出令病人連殼吐出只服

一次可以立進飲食但不可令病人知之恐其嫌穢不肯下咽也

庚生按膈症乃情志之病治療綦難予嘗以啟膈散治愈數人因錄

方於左

北沙參

南沙參

各三錢

川貝母

二錢

茯苓

一錢五分

砂仁殼

廣鬱金

各五分

荷葉蒂

二枚

杵頭糠

一錢

水煎頻服

甚效或加丹參

一錢五分

亦可

又方用陳年竹蒸架劈為末加金針菜十條煎服治酒膈尤驗

又方初生小兒新瓦上焙乾為末陳酒冲服立效

起廢神丹 治痿症久不效服之

麥冬半斤熟地斤元參兩七五味子兩水二十碗煎成六碗早晨服三碗

下午服二碗夜半服一碗一連二日必能起坐後改用熟地兩八元參

三五味子錢三山茱萸錢四牛膝兩水十碗煎二碗早晨服一碗晚服一

碗十日即能行步一月之後平復如舊矣

坎離丸 此藥取天一生水地二生火之意藥雖輕而功用極大久服必

可取效最能生精益血升水降火治虛損尤驗

全當歸用好酒浸洗三日曬乾剉碎川芎揀極大者用水洗淨剉碎白芍溫水洗淨剉碎用好

以上各熟地黃八兩淮慶者佳四兩用砂仁四兩用白茯苓厚黃柏去

八兩二兩鹽水浸二兩酒浸二兩知母去毛四兩製

人乳浸二兩蜜浸俱曬乾炒赤與黃柏同

右六味和勻平鋪三四分厚夜露日晒三日夜以收天地日月之精

華研細末用真冬蜜一斤八兩加水半碗共煉至滴水成珠再加水