

# 临床医学多选题选集

内 科 学 多 选 题

外 科 学 多 选 题

妇 产 科 学 多 选 题

● 儿 科 学 多 选 题

传 染 病 学 多 选 题

**临床医学多选题选集  
儿科学多选题**

主编 连乃文 童环祥  
责任编辑：谢军

\*

湖南科学技术出版社出版  
(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

\*

1983年9月第1版第1次印刷  
开本：850×1168毫米 1/32 印张：6 插页：2 字数：153,000  
印数：1—53,300  
统一书号：14204·96 定价：1.05元

## 编 写 说 明

一. 临床医学多选题选集包括内科学、外科学、妇产科学、儿科学与传染病学五集。本集为儿科学部分。

二. 儿科学多选题共分十六章，每章均自立题号，包括A、B、C、K四种类型，其后备有答案及部分试题注解。注解的目的是帮助读者正确理解答案，并为分析思考其他试题时提供参考。

三. 本书编写的目的为了帮助医学院校学生及临床医师尽快地适应我国当前采用的多选题考试，更好地掌握和运用所学的医学知识。

四. 本除按全国高等医药院校教材及教学大纲总结本院及其他兄弟院校的优秀试题外，并吸收了300余道国外的较好试题，其中第十六章病例分析及第十五章药物全部为国外选题。前者题型属A型，由一个病例引出几道试题，并根据国内情况作了适当修改。因而，其广度及深度不仅适用于高等医学院校学生复习和掌握基本医学知识，也适合于临床医师作为晋升的复习指导，还可为年资较高的医师和教师提供参考。

五. 由于多选题考试是我国当前正在进行探索和研究的新课题，限于水平，书中错误之处，请读者批评指正。

编者 1983年6月  
于湖南医学院第一附属医院

## 多选题考试简介

考试历来是评定学生学习成绩、衡量教学效果和开展教学研究的重要手段。考试形式和考题类型较多，有问答题、填充题、是非题、选择题及改错题等。国外医学院校近30多年来逐渐采用多选题 (Multiple Choice Question, M. C. Q) 考试方法。它不仅应用于医学院校学生的基础和临床各学科的考试，亦应用于临床医师进行知识自我评价、领取执照或进行注册的考试。自1946年美国最先在内科使用多选题考试以来，目前世界各国已将其广泛应用于医师的国家考试。

我国卫生部在1982年11月对全国部属高等医学院校应届毕业生采用了多选题统考。随着教育改革的逐步深入，多选题考试已在全国逐步推广，并引起了医学界的广泛重视。目前全国已统一采用的多选题题型包括A型题、B型题、C型题及K型题四种类型。采用多选题考试的优点在于：①单位时间内考题数量多，从而保证了试题的广泛性，扩大了考试的知识面的范围；②题意简明，结合图片可以考核对知识的记忆、理解、运用以及对问题的分析能力；③答案标准，便于公正地评阅试卷，考核结果可信度高；④便于进行大数量考生试卷的评分和应用电子计算机统分；⑤便于分析试卷，有利开展医学教育研究工作。

现按卫生部统考中所采用的多选题试题类型，分别介绍于下：

**A型题** 为最佳回答题。常以叙述形式提出问题，然后列出A、B、C、D、E五种答案供选择，是使用最广的多选题。五个备选答案中只有一个是最佳、最适宜或最正确的(亦可能试题要求指出错误的一个)，称为正确答案或正确选择，其余四个称为干扰答案、迷惑

答案或不正确的选择。干扰答案可以完全不正确，也可以部分正确，但不是最佳选择。应试者应仔细思考比较，从中选出最佳答案，并将答卷上相应的字母涂掉（如正确答案为B，则将A、B、C、D、E五个字母中的B字涂掉），以便阅卷和评分。

例一 法洛氏四联症的主要畸形是：

- A. 主动脉骑跨
- B. 右心室肥厚
- C. 室间隔缺损
- D. 肺动脉狭窄
- E. 动脉导管未闭

本题正确答案应为D。

**B型题** 又称配伍题。本型试题首先列出五个备选答案，随后有几道考题。应试者应在五个备选答案中，给每道试题选择一个能与之配伍的答案。B型不同于A型题之处是数道考题共用一组答案，每一个答案可被重复选择，也可不被选择。B型题主要考核知识的密切相关性，如药物的作用、副作用、疾病的某些特殊表现等。

例二 问题1~3

- A. 高张含钠溶液
- B. 等张含钠溶液
- C. 2/3张含钠溶液
- D. 1/2张含钠溶液
- E. 1/3张含钠溶液

1. 等渗性脱水第一天补（正确答案应为D）
2. 低渗性脱水第一天补（正确答案应为C）
3. 高渗性脱水第一天补（正确答案应为E）

**C型题** 本型考题与B型相似，但备选答案只有四个。后随几道试题。要求应试者从备选答案中为每道试题选配一个正确答案。C型与B型的不同之处是C型题要应试者对两种现象或考察对象，如药物、症状、体征、化验结果等加以比较，因此只存在四种可能性，故C型题答案只有四个，而B型题则为5个。

### 例三 问题1~2

- A. 动脉导管未闭
  - B. 室间隔缺损
  - C. 两者均有
  - D. 两者均无
1. 产生肺动脉高压 (正确答案应为C)
  2. 可见毛细血管搏动 (正确答案应为A)

**K型题** 又称复合是非题。由一个考题和四个叙述式的备选答案组合而成。组合的方法固定不变，应选择其中一组作为正确答案。

我国现行的组合方式为：

答案A指备选答案中①、②、③是正确的；

答案B指备选答案中①、③是正确的；

答案C指备选答案中②、④是正确的；

答案D指备选答案中④是正确的；

答案E指备选答案中①、②、③、④是正确的；

### 例四 急性肾炎的血液生化改变是：

- ① ASO升高
- ② 血浆蛋白下降
- ③ 血清补体下降
- ④ 胆固醇升高

正确答案应为B，即备选答案①、③是正确的。

## 目 录

第一 章 儿科基础 .....	1
第二 章 新生儿与新生儿疾病 .....	17
第三 章 营养缺乏性疾病 .....	36
第四 章 消化系统疾病 .....	46
第五 章 呼吸系统疾病 .....	56
第六 章 循环系统疾病 .....	63
第七 章 泌尿系统疾病 .....	76
第八 章 血液系统疾病 .....	87
第九 章 神经系统疾病 .....	93
第十 章 结缔组织疾病 .....	103
第十一章 遗传、代谢、内分泌疾病 .....	106
第十二章 急性传染病 .....	114
第十三章 小儿结核病 .....	128
第十四章 急症 .....	137
第十五章 药物 .....	140
第十六章 病例分析 .....	144

# 第一章 儿科基础

## 【A型题】

1. 小儿体重的正常范围是：
  - A. 体重(公斤) = 年龄 × 2 + 8
  - B. 同年龄正常体重 ± 10% 范围内
  - C. 同年龄正常体重 ± 15% 范围内
  - D. 同年龄正常体重 ± 20% 范围内
  - E. 体重(公斤) = 年龄 × 2 + 7
2. 平均体重(公斤) = 年龄 × 2 + 8，此公式适用于：
  - A. 14岁以下
  - B. 12岁以下
  - C. 2~10岁
  - D. 1~12岁
  - E. 2~12岁
3. 当小儿身高低于哪项数字时即可称为异常？
  - A. 低于年龄 × 5 + 75 (厘米)
4. 生后第一个月，头围约增长：
  - A. 0
  - B. 1.25厘米
  - C. 2.5厘米
  - D. 5厘米
  - E. 4厘米
5. 小儿第一年身长的增长主要是：
  - A. 头的增长
  - B. 颈的增长
  - C. 躯干的增长
  - D. 腿的增长
  - E. 各部的增长速度一致
6. 小儿上部量与下部量的比例：
  - A. 初生约为2，青春期约为1.5
  - B. 初生约为1.7，青春期约

- 为1.0
- C. 初生约为1.2,青春期约为0.8
- D. 初生约为1.5,青春期约为1.2
- E. 初生约为1.5,以后不变
7. 婴儿出生后前半年的身长平均每月增长:
- A. 0.5厘米
- B. 1.5厘米
- C. 2.5厘米
- D. 3.5厘米
- E. 5.0厘米
8. 骨骼的发育是从结缔组织发展至软骨,再发展至骨。初生儿的前囟是:
- A. 结缔组织
- B. 软骨
- C. 骨
- D. 软骨和骨
- E. 以上都不是
9. 新生儿出生时的胎儿血红蛋白占血红蛋白中的比例:
- A. 基本上是100%
- B. 是70%
- C. 是50%
- D. 是25%
- E. 基本上是0
10. 4周龄婴儿的脑脊液蛋白浓度,正常可高达:
- A. 20毫克/分升
- B. 45毫克/分升
- C. 125毫克/分升
- D. 300毫克/分升
- E. 500毫克/分升
11. 足月儿的肺泡数目:
- A. 与成人相同
- B. 比成人多
- C. 比成人少
- D. 变化太大,难与成人比较
- E. 因人而异,差别很大
12. 足月儿的肾小球数目:
- A. 与成人相同
- B. 比成人多
- C. 比成人少
- D. 变化太大,难与成人比较
- E. 因人而异,差别很大
13. 关于脑重量的生长,下列哪项正确?
- A. 6个月时脑的生长约完成90%
- B. 1岁时脑的生长约完成90%
- C. 2岁时脑的生长约完成90%
- D. 3岁时脑的生长约完成90%
- E. 以上都不是

14. 小儿以下各期中死亡率最高的是：  
A. 婴儿期      B. 幼儿期      C. 学龄前期      D. 学龄期      E. 围产期
15. 胎儿期发生死胎、流产、先天性畸形的主要胎龄是：  
A. 前3个月      B. 4~5个月      C. 5~6个月      D. 6~7个月      E. 7~8个月
16. 小儿生长发育最快的时期是：  
A. 婴儿期      B. 幼儿期      C. 学龄前期      D. 学龄期      E. 青春期
17. 下部量代表：  
A. 骨盆的发育      B. 脊柱的发育      C. 长骨的发育      D. 下肢长骨的发育      E. 以上都不是
18. 头围与胸围大致相等的年龄是：  
A. 8个月
- B. 10个月      C. 1岁      D. 2岁      E. 3岁
19. 上部量等于下部量的年龄是：  
A. 9岁      B. 10岁      C. 11岁      D. 12岁      E. 13岁
20. 身长与指距相等的年龄是：  
A. 8岁      B. 9岁      C. 10岁      D. 11岁      E. 12岁
21. 11岁小儿腕部骨化中心应有：  
A. 8个      B. 9个      C. 10个      D. 11个      E. 12个
22. 开始能伸手取物的年龄是：  
A. 3个月      B. 5个月      C. 6个月      D. 7个月      E. 8个月

23. 开始能摹仿成人动作的年龄是：  
A. 6个月  
B. 7个月  
C. 8个月  
D. 10个月  
E. 12个月
24. 开始能讲自己名字的年龄是：  
A. 9~10个月  
B. 11~12个月  
C. 15~16个月  
D.  $1\frac{1}{2}$ 岁~2岁  
E. 2岁以后
25. 开始能指出自己的手、眼的部位的年龄是：  
A. 5~6个月  
B. 7~8个月  
C. 11~12个月  
D.  $1\frac{1}{2}$ 岁~2岁  
E. 2岁以后
26. 何者是小儿的第一个条件反射？  
A. 拥抱反射  
B. 吸吮反射  
C. 吞咽反射  
D. 觅食反射  
E. 以上都不是
27. 何年龄起能形成兴奋性与抑制性条件反射？  
A. 1个月  
B. 3~4个月  
C. 6~8个月  
D. 8~10个月  
E. 12个月
28. 何时起出现第一个条件反射？  
A. 出生一周内  
B. 出生1~2周  
C. 出生3~4周  
D. 出生4~8周  
E. 出生8~12周
29. 拥抱反射何时起消失？  
A. 新生儿期结束时  
B. 1~2个月  
C. 3~4个月  
D. 6~8个月  
E. 8~10个月
30. 4周龄婴儿发育应：  
A. 对周围事物无反应  
B. 只知道声音和不适  
C. 开始能注视人的脸  
D. 能分辨母亲和别人  
E. 以上都不是
31. 3个月的正常婴儿发育应：  
A. 除哭外不能发音  
B. 俯卧时不能挺胸  
C. 见人不会微笑

- D. 见陌生人不会啼哭      36. 1个月的正常婴儿常：  
E. 头不能随声音的方向转动
32. 14个月的小儿发育应：  
A. 不能说出熟悉的单词  
B. 能说出几个熟悉的单词  
C. 能说简单句  
D. 能说复杂句  
E. 能说短歌谣
33. 正常小儿最早能和其他小儿共同轮流玩游戏的年龄是：  
A. 1岁  
B. 2岁  
C. 3岁  
D. 4岁  
E. 5岁
34. 多数婴儿开始学咀嚼的年龄是：  
A. 3~6个月  
B. 6~12个月  
C. 1~2岁  
D. 2~3岁  
E. 3岁以上
35. 1个月的婴儿引出2~3次踝痉挛时，属下列哪项：  
A. 正常  
B. 提示大脑瘫痪  
C. 提示神经系统疾病  
D. 提示颅内出血  
E. 以上都不是
- A. 能引出深腱反射，但不能引出浅反射  
B. 能引出浅反射，但不能引出深腱反射  
C. 不能引出浅反射和深腱反射  
D. 都能引出浅反射和深腱反射  
E. 不能肯定两种反射能否引出
37. 1个月的婴儿巴彬斯基征阳性可能是：  
A. 大脑瘫痪  
B. 智力落后  
C. 不正常，但无意义不能肯定  
D. 正常  
E. 颅内出血
38. 婴儿饮食中三大营养素所供热量的百分比，以下哪项正确？  
(蛋白质) (脂肪) (碳水化合物)  
A. 15      35      50  
B. 15      50      35  
C. 25      40      35  
D. 25      35      40  
E. 25      25      50
39. 关于人奶，以下哪项是错误的？

- A. 人奶中蛋白以乳白蛋白为主
- B. 人奶中钙、磷比例适当
- C. 人奶的蛋白质含量比牛奶奶高
- D. 人奶中必需的不饱和脂肪酸比牛奶多
- E. 人奶有预防感染的作用
40. 人乳中钙与磷的比例通常  
是：
- |          |     |
|----------|-----|
| (钙)      | (磷) |
| A. 1 : 1 |     |
| B. 2 : 1 |     |
| C. 3 : 1 |     |
| D. 1 : 2 |     |
| E. 1 : 3 |     |
41. 正常小儿的喂养，开始加辅食与完全断母奶的适宜年龄分别为：
- A. 1~2个月与  
10个月~ $1\frac{1}{2}$ 岁
- B. 1~2个月与  
 $1\frac{1}{2}$ 岁~2岁
- C. 3~4个月与  
2岁~ $2\frac{1}{2}$ 岁
- D. 5~6个月与  
 $1\frac{1}{2}$ 岁~2岁
- E. 5~6个月与  
 $2岁\sim 2\frac{1}{2}岁$
42. 8个月婴儿，人工喂养宜选何者为主食？
- A. 米粉
- B. 鲜牛奶
- C. 炼乳
- D. 豆浆或豆粉
- E. 鲜牛奶与米粉各半
43. 全脂奶粉1容量需加水多少容量即等于全乳？
- A. 加1容量水
- B. 加2容量水
- C. 加3容量水
- D. 加4容量水
- E. 加5容量水
44. 下列哪项是错误的？
- A. 初乳是指分娩后头几天分泌的乳汁
- B. 初乳比成熟乳含较多的蛋白质
- C. 初乳含有多种抗体
- D. 初乳几乎不含钠
- E. 初乳呈淡黄色
45. 人奶中的蛋白质含量大约为：
- A. 0.5克/分升
- B. 1.2克/分升
- C. 2.0克/分升

- D. 3.0克/分升  
E. 5.0克/分升
46. 幼婴单纯母乳喂养：  
A. 必须补充全部维生素  
B. 必须补充维生素A  
C. 必须补充维生素C  
D. 必须补充维生素D  
E. 无需补充任何维生素
47. 下列哪项最正确？  
A. 人奶和牛奶均含脂肪 1  
~2%  
B. 人奶和牛奶均含脂肪 3  
~4%  
C. 人奶含脂肪约1%，牛奶  
约3%  
D. 人奶含脂肪约3%，牛奶  
约1%  
E. 人奶和牛奶均含脂肪  
5%左右
48. 将牛奶进行稀释的主要目的是：  
A. 减少热量  
B. 降低脂肪的浓度  
C. 降低酪蛋白与电解质的  
浓度，使酪蛋白凝块变  
小  
D. 减少热量与降低脂肪的  
浓度  
E. 以上都不是
49. 16个月小儿，完全用牛奶喂  
养，很可能引起：  
A. 血尿素氮增高  
B. 血清蛋白下降  
C. 高血压  
D. 缺铁性贫血  
E. 体重增长缓慢
50. 奶中钠的含量：  
A. 牛奶中较多  
B. 人奶中较多  
C. 羊奶中较多  
D. 三种奶中含量相同  
E. 变化大，无可比性
51. 下列哪项最正确？  
A. 牛奶的维生素K含量比  
人奶多数倍  
B. 牛奶的维生素K含量比  
人奶少数倍  
C. 羊奶的维生素K含量比  
人奶少数倍  
D. 三种奶的维生素K含量  
基本相同  
E. 三种奶的维生素K含量  
均极少
52. 新生儿期应给予接种或口服：  
A. 百白破三联疫苗  
B. 脊髓灰质炎疫苗  
C. 流脑疫苗  
D. 乙脑疫苗  
E. 以上都不是

53. 标准免疫血清丙种球蛋白对：  
A. 预防甲型或乙型肝炎均有效  
B. 预防甲型肝炎很有效，但对预防乙型肝炎效果不可靠  
C. 预防甲型肝炎效果不可靠，而对预防乙型肝炎很有效  
D. 甲型或乙型肝炎均可减轻症状  
E. 甲型或乙型肝炎的预防效果均不可靠
54. 测量小儿血压的袖带宽度如小于上臂长的1/2时，可能：  
A. 引起疼痛和不适  
B. 使测得血压偏低  
C. 使测得血压偏高  
D. 引起奇脉  
E. 测出准确的血压
55. 下列哪项化验正常值在整个儿童期均高于成人？  
A. 血清碱性磷酸酶  
B. 血红蛋白  
C. 血清碳酸氢盐  
D. 血清胆固醇  
E. 血清钙
56. 根据体表面积计算，小儿每日正常需水量大约是：
- A. 800~1,000毫升/平方米  
B. 1,200~1,400毫升/平方米  
C. 1,500~1,600毫升/平方米  
D. 1,800~2,000毫升/平方米  
E. 2,500毫升/平方米
57. 关于人体总液量与体重的比例，下列哪项正确？  
A. 婴儿大于年长儿  
B. 婴儿小于年长儿  
C. 婴儿与年长儿相同  
D. 个体差异很大，年龄有无影响，尚不清楚  
E. 与年龄完全无关
58. 一般来说，小儿不显性失水大约是：  
A. 10毫升/100卡  
B. 20毫升/100卡  
C. 42毫升/100卡  
D. 55毫升/100卡  
E. 75毫升/100卡
59. 正常血清渗透压是：  
A. 250~260毫渗透分子/升  
B. 265~275毫渗透分子/升  
C. 285~295毫渗透分子/升  
D. 310~320毫渗透分子/升  
E. 325~350毫渗透分子/升

60. 小儿肾脏排泄代谢废物的合理需水量应是：
- A. 25毫升/100卡
  - B. 50~75毫升/100卡
  - C. 100~120毫升/100卡
  - D. 130~150毫升/100卡
  - E. 200毫升/100卡
61. 高渗性脱水的正确治疗是：
- A. 快速补给无钠溶液
  - B. 快速补给高张葡萄糖溶液
  - C. 缓慢补给低张含钠溶液
  - D. 快速补给低张含钠溶液
  - E. 缓慢补给 2/3 张含钠溶液
62. 小儿抽搐可能发生在迅速纠正：
- A. 高钠血症时
  - B. 低钠血症时
  - C. 高钾血症时
  - D. 低钾血症时
  - E. 低血容量时
63. 小儿低钾性碱中毒常发生于下列哪种情况？
- A. 先天性肾上腺皮质增生症
  - B. 慢性肾功能衰竭
  - C. 先天性肥厚性幽门狭窄
  - D. 高渗性脱水
  - E. 腹泻
64. 一健康儿，前囟门约  $0.5 \times 0.5$  厘米，出牙8个，体重10公斤，开始能独走，刚学会叫灯的名称。其年龄大约是：
- A. 10个月
  - B. 12个月
  - C. 16个月
  - D. 18个月
  - E. 20个月
65. 一健康女孩，身长65厘米，体重7公斤，开始出牙，前囟门约  $2 \times 2$  厘米，能伸手取玩具，可辨认熟人和陌生人，可独坐片刻，发出单调音节。其年龄大约是：
- A. 3~4个月
  - B. 6个月
  - C. 8~9个月
  - D. 12个月
  - E. 以上都不是
66. 一正常小儿的身长是90厘米，乳牙20个，腕部骨化中心4个。其年龄大约是：
- A. 1岁
  - B. 2岁
  - C. 3岁
  - D. 4岁
  - E. 5岁
67. 一健康儿能大笑，会发“爸爸”、“妈妈”之复音，脊柱

出现了第二个弯曲，对“再见”还不懂。其年龄大约是：

- A. 4个月
- B. 5个月
- C. 7个月
- D. 9个月
- E. 10个月

**【B型题】**

**问题 68~71**

- A. 脐下
- B. 脐上
- C. 脐与耻骨联合之间
- D. 耻骨联合下
- E. 耻骨联合上

68. 新生儿身长的中点在

69. 1岁小儿身长的中点在

70. 6岁小儿身长的中点在

71. 12岁小儿身长的中点在

**问题 72~74**

- A. 2个月
- B. 4个月
- C. 7个月
- D. 9个月
- E. 12个月

72. 开始能大声笑的年龄是

73. 开始会叫物名的年龄是

74. 开始能发出“爸爸”、“妈妈”等复音的年龄是

**问题 75~77**

- A. 3个月
- B. 4个月
- C. 5个月
- D. 6个月
- E. 7个月

75. 开始能听懂自己名字的年龄是

76. 开始能伸手取物的年龄是

77. 开始能随所视物品或声音转动头部的年龄是

**问题 78~80**

- A. 2~3个月
- B. 4~5个月
- C. 6~7个月
- D. 10~11个月
- E. 12~14个月

78. 开始能抬头的年龄是

79. 开始能独坐的年龄是

80. 开始能独走的年龄是

**问题 81~83**

- A. 5个月
- B. 6个月
- C. 8个月
- D. 9个月
- E. 10个月

81. 开始能模仿成人动作的年龄是

82. 开始能伸手要抱的年龄是

83. 开始能认人的年龄是