

傷寒論條文表解

李筱圃
李凤熙
編著

云南科技出版社

252.2
XP
3228

伤寒论条文表解

李筱圃

编著

李凤熙

云南科技出版社

11489/02

期 限 表

请于下列日期前将书还回

[illegible]

北京卡片商店1001

伤寒论条文表解

李筱圃 李凤熙 编著

云南科技出版社出版发行 (昆明市书林街100号)

云南新华印刷厂印装 云南省新华书店经销

开本: 787×1092 1/16 印张: 7.75 字数: 160,000

1987年9月第一版 1987年9月第一次印刷

印数：1—5,000

ISBN 7—5416—0012—1 / R·5

统一书号: 14466·17 定价: 1.30 元

自序

《伤寒论》一书，是东汉末年张仲景的著作，为我国医籍中经典论著之一，他总结了汉代以前的医学积累及个人的丰富经验，提出了六经为病的纲领，理法方药，无不具备，指导着历代医家的临床实践，承先启后的作用，非常宏大。全书计三百九十七法，一百一十三方，不仅是对多种外感疾病之辨证论治，卓有奇效，即推广运用于内、妇、儿科之各种杂证，化裁施治，无不应如桴鼓。惟是文词古奥，言简意赅，有的句法倒装，治方易误，使初学者，不易理解。谨照宋本（即明赵开美校刊本）之条文顺序，将各条病证的病理病机，传转变化，治则方义等，用简明概括的方法，列表解释。这样的条文表解，对学习《伤寒论》来说，是会起到一定的帮助作用的。

本书在修改过程中，承蒙许子建、诸葛连祥两位副教授通本阅审，龙德昭、蔡明德、阎临乐三位老师大力帮助，谨在此致以衷心的感谢。

云南中医学院 李筱圃

一九八三年九月于昆明

目 录

辨太阳病脉证并治上（第一条至三十条）	（ 1 ）
辨太阳病脉证并治中（三十一条至一二七条）	（ 12 ）
辨太阳病脉证并治下（一二八条至一七八条）	（ 45 ）
辨阳明病脉证并治（一七九条至二六二条）	（ 61 ）
辨少阳病脉证并治（二六三条至二七二条）	（ 82 ）
辨太阴病脉证并治（二七三条至二八〇条）	（ 85 ）
辨少阴病脉证并治（二八一条至三二五条）	（ 87 ）
辨厥阴病脉证并治（三二六条至三八一条）	（ 98 ）
辨霍乱病脉证并治（三八二条至三九一条）	（ 111 ）
辨阴阳易差后劳复病脉证并治（三九二条至三九八条）	（ 114 ）

辨太阳病脉证并治上

一、太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。

太阳病 { 病因——风寒外邪，侵袭体表。
脉象：浮——正气抗邪外出，气血充盈于体表。
证状 { 头项强痛——头为诸阳之会，项为太阳经通路，经气郁遏不舒，故头痛项强。
恶寒——风寒外束，表气被遏，体不胜寒，此为太阳病主证，亦即病情。

二、太阳病，发热、汗出、恶风、脉缓者，名为中风。

太阳病中风证 { 脉象：缓（浮缓）——肌腠被伤，经气外泄，营阴不足。
病因——风寒侵袭肌表。
证状 { 发热——正起抗邪，气血外达，正邪相争。
汗出——表气较虚，卫外不固，营不内守。
恶风——汗出肌疏，不胜风寒，遇风即恶。

（本条是太阳中风的主要脉证）。

三、太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者，名为伤寒。

太阳病伤寒证 { 脉象：阴阳俱紧——寒邪袭表，肌肤收缩，寸尺两部，脉来绷急，必是浮紧。
病因——寒邪侵袭肌表。
证状 { 发热 { 或已发热——体质较强，则恶寒发热并见。
或未发热——体质较弱，则先恶寒，后发热。
必恶寒——不论发热与否，必定先见恶寒。
体痛——寒邪外束，经脉受阻，运行不利。
呕逆——毛窍壅滞，卫气不通，胃气不降而上逆。


（本条是太阳伤寒的主要脉证）。

四、伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也。

伤寒(中风) { 患病初期——太阳受邪。
传变与否 { 不传 { 脉——静、浮脉始终不变动。
证——头痛、项强、恶寒。
传 { 阳明 { 脉——数大。
证——心烦、躁扰。
少阳 { 脉——弦急。
证——颇欲吐。


（本条辨伤寒病传经与否的脉证。）

五、伤寒二三日，阳明少阳证不见者，为不传也。




(本条辨伤寒太阳病不传变。)

六、太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。若发汗已，身灼热者，名风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出、身重、多眠睡、鼻息必鼾、语言难出。若被下者，小便不利、直视失溲；若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘈瘲；若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。




(本条是初期温病证状及误治变证)

七、病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳，七日愈；发于阴，六日愈，以阳数七，阴数六故也。



按：本条辨病发于阳，病发于阴两证，至于愈期，应根据患者体质的强弱，受邪的浅深，病情的轻重，治疗的当否而定。七日愈与六日愈，在临床中，尚不能作为一定的病愈期限。阳数七阴数六，系水火生成数的论述，见附图。

附：水火生成数的示意图



八、太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽故也。若欲作再经者，针足阳明，使经不传则愈。

太阳病 { 头痛——头为诸阳之会，阳气被阻，经脉不通。此为举一证而略其它之写法。
至七日以上自愈者——七日为经气来复期，正复邪却，是病将愈之机。
以行其经尽故也——因行尽本经，七日正复病愈。
欲作再经者——若至七日不愈，有传阳明之势。
针足阳明，使经不传则愈——针足阳明，截其传路，使邪不传阳明，而太阳之余邪亦解。


(本条是太阳病有经尽自愈证与防止再传的针法。)

九、太阳病，欲解时，从巳至未上。

太阳病 { 欲解时——病证欲愈的时候。
从巳至未上——从巳时到未时，就是上午九点到下午三点钟，太阳经气旺盛，故其病欲解。

(本条是太阳病欲愈时的推测。)

附：六经病欲解时示意表



按：从上列示意图来看六经病欲解时，三阳经从寅到戌，占十八小时，三阴经从亥到卯，占十小时。此即所谓阳道常饶，阴道常乏；阳常有余，阴常不足之理。故其病欲解之际，阳经所占的时间，比阴经为多。

一〇、风家，表解而不了了者，十二日愈。

太阳病 { 风家——卫阳素虚，常患中风（伤寒）之病者。
表解——中风服桂枝汤（伤寒服麻黄汤），表邪已解。
不了了者——精神未完全恢复，或尚有余邪未尽。
十二日愈——七日本经行尽而解，再过一候，加上五日，即可全愈。

按：本条是风家表解后，精神恢复而自愈。但在临床中每有表解后，正气未复，或余邪未尽的患者，可适当加以调治，使正复邪去而愈，不必等到十二天，令其自愈。

一一、病人身大热，反欲得近衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。

病人 { 真寒假热 { 身大热——寒邪内盛，逼阳于外，体表热高。
反欲得近衣——阳衰于里。
热在皮肤，寒在骨髓——表热里寒。
真热假寒 { 身大寒——热邪内盛，阳郁不达，体表寒冷。
反不欲近衣——阳盛于里。
寒在皮肤，热在骨髓——表寒里热。

按：本条辨里真寒外假热和里真热外假寒的证情。凡疾病发展到极度阶段时，每有转化为阴极似阳，阳极似阴的寒热真假证候出现，临床时必须注意，仔细诊察。

一二、太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发；阴弱者，汗自出。啬啬恶寒、淅淅恶风。翕翕发热、鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。

太阳中风 { 病因：中风——包括第一、二两条的脉证在内。
脉象 { 阳浮——轻按见浮象 } 即浮弱之脉。
{ 阴弱——重按见弱象 }
病理 { 阳浮热自发——卫强，鼓邪于外而自然发热。
阴弱汗自出——营虚，不能内守而自然汗出。
症状 { 啬啬恶寒——汗出窍开，遇寒则收缩而恶寒。
淅淅恶风——自汗营弱，遇风则洒淅而恶风。
翕翕发热——正气抗邪，身热不高，但不舒适。
鼻鸣——邪侵皮毛，肺气不利，鼻塞息鸣。
干呕——气不外达，上逆于胃，呕而无物。
治疗：桂枝汤主之——调合营卫，解肌发汗。
方药：桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣。
方义 { 桂枝——辛温、温经通阳、解肌发表。
芍药——苦酸微寒、通调血脉、敛阴止汗。
炙甘草——甘温、补脾益气，调和诸药。
生姜——辛温，温中降逆，驱邪解表。
大枣——甘温，益气生津，补脾和胃。

按：本条系太阳中风的脉证治疗。阳浮阴弱，阴阳两字，有的注家，指关前为阳，关后为阴而解释的。浮弱，有浮缓之义。

一三、太阳病，头痛、发热、汗出、恶风、桂枝汤主之。

太阳病 { 因——风寒外邪，侵袭肌表。
证 { 头痛——太阳经脉，阻滞不通。
发热——正邪相争，阳气外浮。
汗出——表虚营弱，玄府不固。
恶风——自汗卫虚，肌腠疏松。
治：桂枝汤主之——调和营卫。

按：本条接上条提出桂枝汤的主治证。凡太阳病见头痛、发热、汗出、恶风等证，即可用桂枝汤治疗，不局限于中风证。

一四、太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。

太阳病 { 病因——风邪侵入太阳经输。
证状 { 项背强几几——风邪侵及经输，津液不能敷布，经脉失养，项背酸强，拘急不舒，俯仰不便。
反汗出——邪犯经输，经气被阻，一般无汗，此证有汗，故曰反。
恶风——风邪入于经输，其性疏泄，腠理开，毛窍松。
治疗：桂枝加葛根汤——调和营卫、解肌生津。
方药：葛根、桂枝、芍药、炙草、生姜、大枣。
方义 { 桂枝汤——调和营卫。
葛根——辛、甘、平，解肌表、升津液。

按：本条是风邪入于太阳经输，致经气不利，阻滞津液，不能敷布，经脉失养，故有项背拘急，俯仰不得自如的症状产生。

一五、太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，方用前法；若不上冲者，不得与之。

太阳病 { 下之后——表证应汗，下之为逆，每有表邪内陷的机转。
其气上冲者——若邪不内陷，自觉有气上冲之感，表证仍在，正气有鼓邪外出之机。
可与桂枝汤，方用前法——可与桂枝汤，解肌发表，服药后将息禁忌，如桂枝汤法。
若不上冲者，不得与之——若气不上冲，为表邪内陷，非桂枝汤所宜，应随证施治。

（本条是太阳病误下后，邪未陷，气上冲的治法。）

一六、太阳病三日，已发汗，若吐、若下，若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之。桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也，常须识此，勿令误也。

太阳病 { 病程：三日——为三阳传经之期。 } 仍不解者，此为坏病。

辨证 { 已发汗——如法发汗，表邪当解，若表不解，必生病变。
若吐——或邪入胸膈而痰滞，经用吐法，痰亦应去。
若下——或邪陷肠胃，成燥实，经用下法，燥结当除。
若温针——或邪阻经络而不通，经用温针，邪亦应解。 } 仍不解者，此为坏病。

论治 { 治禁——既成坏病，非桂枝证，桂枝不中与之。
治则——观其脉证，知犯何逆，随证治之。 } 仍不解者，此为坏病。

桂枝汤 { 适应证 { 脉——浮缓——表虚 } 解肌
证——发热汗自出 } 常须识此，勿令误也。
禁忌证 { 脉——浮紧——表实 } 不可与
证——发热汗不出 } 常须识此，勿令误也。

按：本条是太阳病治疗不当，变为坏病，不可与桂枝汤，应当随证施治。并提出伤寒禁用桂枝汤治疗。

一七、若酒客病，不可与桂枝汤，得之则呕，以酒客不喜甘故也。

酒客患太阳中风 { 酒客——经常饮酒，湿热留中。
不可与桂枝汤——甘能壅中，辛温助热。
得之则呕——胸脘满闷，气逆作呕。
以酒客不喜甘故也——甘使中满。
治宜辛凉（补）——葛根黄芩黄连汤——疗肌解酒，清热和中。 } 常须识此，勿令误也。

按：本条酒客，多有湿热留滞胸脘，患太阳中风，不可与桂枝汤，服之每引起呕吐。

一八、喘家，作桂枝汤，加厚朴，杏子佳。

喘家患太阳中风 { 喘家——素有喘疾，肺气滞逆。
作桂枝汤——疗肌解表，以治新感。
加厚朴杏子——降逆平喘，以治宿疾。 } 常须识此，勿令误也。

（本条为喘家又感风邪，标本兼顾的治法。）

一九、凡服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也。

太阳中风 { 症状：服桂枝汤吐者——阳热内盛，辛温之药入，不能相容而吐。
预后：其后必吐脓血也——肺胃热盛，日久伤及阳络而吐脓血。 } 常须识此，勿令误也。

按：本条提示，凡内热盛者，必须禁用辛温药。服后吐脓血的，在临床中不一定如此，但流鼻血的，比较多见。若吐脓血，则成肺痿之证，按法治之。

二〇、太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。

太阳病 { 原因：发汗——汗不如法，使如水流漓，致阴阳两伤。
遂漏不止——卫阳不固，营阴渗洩。
症状 { 恶风——卫阳已伤，表邪未解。
小便难——汗多于外，阴亏于内。
四肢微急，难以屈伸——阳气不能温煦四肢，阴液不能濡养筋脉。
治方：桂枝加附子汤——扶阳固表，摄阴止汗。
方义 { 桂枝汤——调和营卫，解肌发表。
附子——大辛大热，温经回阳。 } 常须识此，勿令误也。

按：本条太阳病大发其汗，汗出不止，表尚未解，卫阳已虚而营阴亦损，服汤后，阳回阴复，表解汗止。

二一、太阳病，下之后，脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之。

太阳病 { 原因：下之后——不当下而下，是为误下。
脉象：脉促——心阳被伤，正仍抗邪，阳遏不伸，影响血行。
症状：胸满——胸阳被伤，阴邪上逆，阳不外达。
治方：桂枝去芍药汤——宣阳解表和中。
方义：桂枝、生姜——宣阳解表。甘草、大枣——和中。

按：本条太阳病误下后，见脉促胸满，乃邪陷于胸，正仍抗邪外出，故方中去芍药阴柔之品，以免恋邪难解。

二二、若微恶寒者，桂枝去芍药加附子汤主之。

太阳病 { 原因——接上条表证误下后而来。
微寒——卫阳大虚，表邪已陷，故微恶寒。
治方：桂枝去芍药加附子汤——扶阳、温经、举陷。
方义 { 桂枝去芍药汤——宣阳、解表、和中。
附子——温经、扶阳。

按：本条承接上条的表证误下后，出现微恶寒症状，部分表邪内陷而表未解，故用温经扶阳，升陷宣表之法。

二三、太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发。脉微缓者，为欲愈也；脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下、更吐也；面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。

太阳病 { 病程：得之八九日——病历日久，每多生变。
欲愈 { 证 { 如疟状——寒热发作，日二三次。
发热恶寒——正邪交争。
热多寒少——正复邪却，阳进阴退之机。
其人不呕——邪未入少阳，无喜呕症状。
清便欲自可——邪未入阳明，无便结之证。
日二三度发——邪有外出之势。
脉：微缓——微为病邪衰退，缓为正气恢复。
恶化 { 脉：微——为少阴里虚
证：恶寒——为太阳表虚 } 阴阳两虚，禁汗吐下。
表未解 { 证 { 面反有热色——八九日邪应解，面不应红。
不能得小汗出，身必痒——邪郁于表不得出。
治：桂麻各半汤——和营疏卫，小发其汗。
方义 { 桂枝汤——调和营卫
麻黄汤——解表发汗 } 各取三分之一，为发汗轻剂。

按：本条太阳病，得之八九日后，有几种的转变情况。正复邪退、为欲愈；阴阳两虚，转为恶化；面红身痒，邪留于表，宜用小发汗法，表邪得解而正气不伤。

二四、太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。

太阳病 { 初服桂枝汤一只服了第一次，尚有二、三服在。
反烦不解——病不愈而反烦，非药不对证，乃病重药轻。
先刺风池风府——邪阻经络，先刺而洩之。
却与桂枝汤则愈——经邪既挫，再以桂枝汤疗肌解表，其病即愈。

按：本条太阳病表虚证，服桂枝汤不解，反见心中烦热之证，乃药力轻而病邪盛。初服未得微汗出，毛窍不开，邪无出路，势必内热作而生心烦。先刺风池、风府，以泻在经之风热，再与桂枝汤取微汗，使之外出则愈。

二五、服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤，如前法；若形似疟，一日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

服桂枝汤 { 病未解 { 大汗出 { 汗不如法，虽出 }
脉洪大 { 大汗而表邪未解 } 邪仍在表，与桂枝汤，如前
{ 阳盛于外，非热 } 法服用将息。
{ 在里，无烦渴症 }
病已变 { 若形似疟——恶寒、发热无汗。
一日再发 { 病邪虽轻，毛窍被阻， }
汗出必解 { 欲出不得出。 } 宜桂枝二麻黄一汤，
{ 表实无汗，当以汗解， } 使微汗而风寒解。
{ 但较一日二三次发为 }
轻。

按：本条服桂枝汤后，有两种不同的证情出现，服药后大汗出、脉洪大、无烦渴者，病仍在表，与桂枝汤即愈。若恶寒、发热、无汗，病状似疟，一日两次发作，风寒之邪较轻，宜用桂二麻一汤，微发其汗。凡用桂枝汤治太阳中风病时，医生应照原方后的煎服护理法，对病家嘱咐清楚，以免使患者出大汗，如水流漓，病必不出，或转生它病。


二六、服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，白虎加人参汤主之。

服桂枝汤 { 证状 { 大汗出——表证虽解，津液耗伤。
大烦渴——里热灼阴，心烦口渴。
脉象：脉洪大——热邪内盛，脉道充盈。
治疗：白虎加人参汤——清热养阴，生津益气。
方药：知母、石膏、甘草、粳米、人参。
方义 { 石膏——辛甘大寒、清热泻火、除烦止渴。
知母——苦寒、清肺滋肾。
人参——甘、微苦微温、益气生津。
炙草——甘温、调中和胃。
粳米——甘平、养胃益气。

按：本条是气热伤津证。因用桂枝汤不如法，大汗出后，表邪虽解而津液被劫，里


热炽盛，病已转属阳明。使用本方，必须有大汗、大渴、大热、脉洪大等证，属气阴两伤之候，方为恰当。

二七、太阳病，发热恶寒、热多寒少、脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤。




按：本条是表未解，里有热的太阳病，用桂枝二越婢一汤治疗。即桂枝汤加麻黄、石膏，方中桂枝汤调和营卫，麻黄解表寒，石膏清里热，是针对发热恶寒、热多寒少之证而设。致于脉微弱，无阳热的表证，恐太阳表邪已陷少阴，应根据病情论治，绝不可用汗法，以免亡阳之危证产生。

二八、服桂枝汤，或下之，仍头项强痛、翕翕发热、无汗、心下满微痛、小便不利者，桂枝去桂加茯苓白术汤主之。



按：本条病情，汗下之后，表证未解，水气内停，在临床中曾遇到两种不同的转归。
一、患者素有停饮，复感风寒，治以桂枝汤，仅治其表，未顾其里，而病不解。二、表病误下，损伤中阳，水停不化，脘胀胃疼，小便不畅、甚则停水饮水，有表未解者，有表内陷者，均可用桂枝汤原方加茯苓、白术，治之有卓效。前者多见，后者较少。表解而无自汗者，亦可以去芍药。

二九、伤寒脉浮，自汗出、小便数、心烦、微恶寒、脚挛急，反与桂枝欲攻其表，此误也。得之便厥，咽中干、烦躁吐逆者，作甘草干姜汤与之，以复其阳；若厥愈足温者，更作芍药甘草汤与之，其脚即伸，若胃气不和谵语者，少与调胃承气汤；若重发汗，复加烧针者，四逆汤主之。



按：本条患者阴阳两虚，感受风寒外邪，误服桂枝汤后，引起一系列变证，根据病情，随证施治。对临床工作，起着很大的指导意义，学者宜深思之。

三〇、问曰：证象阳旦，按法治之而增剧，厥逆、咽中干、两胫拘急而谵语。师曰：言夜半手足当温，两脚当伸，后如师言。何以知此？答曰：寸口脉浮而大，浮为风、大为虚，风则生微热，虚则两胫挛，病形象桂枝，因加附子参其间，增桂令汗出，附子温经，亡阳故也。厥逆、咽中干、烦躁、阳明内结，谵语烦乱，更饮甘草干姜汤。夜半阳气还，两足当热，胫尚微拘急，重与芍药甘草汤，尔乃胫伸。以承气汤微瀉，则止其谵语，故知

病可愈。

问 { 证象阳旦，按法治之而增剧 { 厥逆——阳虚
咽中干、两胫拘急——阴虚
谵语——阳明燥结
师言：“夜半手足当温，两脚当伸”。后果如师言，何以知此？
寸脉浮大 { 浮为风——风则生微热 } 病形象桂枝证。
大为虚——虚则两胫挛
治疗：桂枝汤 { 加附子——温经扶阳，但未加。
增桂枝——不加附而增桂，反使大汗出，致亡阳伤阴。
答 { 误汗变证 { 厥逆——阳气更虚。
咽干烦躁——阴液重伤。
谵语烦乱——阳明内结。
救治 { 阳虚——甘草干姜汤，使阳气还而两足温。
阴虚——芍药甘草汤，使阴气复而两胫伸。
阳明燥结——少与调胃承气汤调和胃气，则谵语烦乱之证自愈。

（本条是解释上条内容之文，用问答式来说明。）

辨 太 阳 病 脉 证 并 治 中

三一、太阳病，项背强几几，无汗恶风，葛根汤主之。

太阳病 { 证 { 项背强几几——风寒侵入经输，经气不利，项背拘急，俯仰不便。
无汗——为太阳表实，寒邪外束，毛窍不开。
恶风——风寒袭表，亦必恶寒。
治疗：葛根汤——解肌发汗，升液舒经。
方药：葛根 麻黄 桂枝 芍药 炙草 生姜 大枣
方义 { 桂枝汤——调和营卫。
葛根——解肌表，升津液。
麻黄——辛温微苦，解表发汗。

按：本条系外邪客于太阳经输，经气不利，津液不升，不能敷布于经脉，故有项背拘急之证。

三二、太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。

太阳合病 { 证 { 同时证见 { 太阳——恶寒、发热、头痛、项强、无汗。
阳明——自下利、或渴饮。
必自下利——表热无汗，不得外解，内迫阳明，下趋大肠。
治：葛根汤——解肌发汗，温散表寒，兼清里热。

按：本条为太阳阳明合病，表热内迫大肠，自然下利的治疗。

三三、太阳与阳明合病，不下利，但呕者，葛根加半夏汤主之。

二阳合病 { 合病 { 太阳——恶寒、发热 { 同时并见。
阳明——呕吐、下利
症状 { 不下利——表热内迫，不下趋肠道。
但呕者——内迫之邪，上逆胃中。
机转——表病及里，内犯肠胃，升降失调。
治疗：葛根加半夏汤——解表降逆。

按：本条太阳阳明合病，不下利，仅呕吐，用葛根汤温散表寒而清里热，加半夏降逆止呕。

三四、太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也；喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。