

中医骨伤科

应试模拟习题集

主 编 李义凯

副主编 余克强 赵长青

编 委 李义凯 余克强 赵长青

李军朋 张 勇 王 莉

谢秋屏 李世杰 刘建英

军事医学科学出版社

·北 京·

内 容 提 要

本书共提供 20 套模拟题,所覆盖的内容包括中医骨伤科的专业知识、专业技能、相关专业基础知识(主要是解剖学和影像学等学科)等,题型包括有多选题、名词解释、简答题和病案分析等。其中多选题是使用最新形式的客观多选题,共 3 类,7 种题型,包括有 A_{1-2} 、 B_{1-2} 、 X 、 A_3 和 A_4 等形式。每套模拟题有选择题 60 题、名词解释 5 题、简答题 5 题和病案分析 2 题。这些各型多选题是近年来国家人事部和卫生部在职称晋升考试中普遍采用的考试题型。

序

中医骨伤科学是中医学中的璀璨瑰宝,它在几千年的发展中为我国人民的疾病治疗做出了巨大的贡献,中医骨伤科学内容丰富,其治疗手段和方法,如正骨、推拿、中药外用等至今仍在临床大量应用,更为重要的是,随着现代骨科学的发展,中医骨伤科学中强调的“动静结合,筋骨并重,内外兼治,医患结合”等理论成为骨科医师治疗骨科疾病的首要准则。

继承中医骨伤科的理论精华,了解中医骨伤学的发展史,是成为一名合格骨伤科医师必备的,掌握坚实的理论基础,灵活地应用于临床是我们的目的,本书系统地对中医骨伤学理论进行测试,内容十分丰富,题型多样,可以使读者从多个层面对中医骨伤科的理论进行分析认识,从而更好地指导临床。

本书的主编是中医骨伤科界的第一名博士后,从事医、教、研多年,对中医骨伤科理论方面有着广博的研究,了解骨伤科理论的难点、重点,本书必将对各位专业人员应试有一定的帮助。谨借此向著者祝贺。

袁 浩

2002年1月于广州

前 言

近年来我多次应邀参加不同级别和层次的中医骨伤科考试的试题编写工作,出题时多是以岑泽波教授主编的、上海科学技术出版社 1985 年版的《中医伤科学》为主。本书对提高中医骨伤科的教学质量起到了很好的作用。但随着科学和技术的发展、相关学科、临床应用和基础研究的深入,新知识、新概念和新技术也不断涌现。参加应试人员的知识层面也需要“与时俱进”,而目前本领域的应试参考书目还为数不多。因此,我以《中医伤科学》为蓝本,结合自己多年来的教学和医疗经验,参考相关学科的发展,根据中医骨伤科学考试大纲和中医骨伤科学考试指南参考资料的要求,组织相关人员编写了本书。

本书共提供 20 套模拟题,内容包括中医骨伤科的专业知识、专业技能、相关专业基础知识等,有多选题、名词解释、简答题和病历分析等四种不同的题型。其中多选题题型是最新形式的客观多选题,共三类,七种题型,包括有 A_1 (单句型最佳选择题)、 A_2 (病例摘要型最佳选择题)、 B_1 (标准配伍型)、 B_2 (扩展配伍型)、 X (多选题)、 A_3 (病例组型最佳选择题)和 A_4 (病例串型最佳选择题)等形式。这些各型多选题是近年来国家人事部和卫生部在职称晋升考试中所采用的

考试题型。

本书编写的指导思想是“以练带学、练习从难、重点突出”，故本书试题中有些内容的难度系数较高，以真正起到强化训练的目的。本书可作为《中医伤科学》的辅导材料，对帮助学生学习 and 学科结业考试，提高学生分析问题和解决问题的能力具有重要的作用；同时本书还是中医骨伤科职称晋升考试以及硕士研究生入学考试的重要参考资料，也可作为教师教学参考书。

由于编者水平有限，经验不足，书中肯定存在不少缺点和错误，敬请广大读者批评指正。

第一军医大学中医系骨伤科 李义凯

2002 年 1 月 20 日于广州

目 录

多选题简介	(1)
模拟试卷一	(8)
模拟试卷二	(22)
模拟试卷三	(37)
模拟试卷四	(51)
模拟试卷五	(66)
模拟试卷六	(80)
模拟试卷七	(93)
模拟试卷八	(107)
模拟试卷九	(122)
模拟试卷十	(136)
模拟试卷十一	(151)
模拟试卷十二	(165)
模拟试卷十三	(180)
模拟试卷十四	(194)
模拟试卷十五	(207)
模拟试卷十六	(221)
模拟试卷十七	(234)
模拟试卷十八	(248)
模拟试卷十九	(262)
模拟试卷二十	(276)

多选题简介

A 型题

(一) A_1 型题(单句最佳选择题):此题型对基础、临床有较宽的适用性。

1. 标准型:每道试题由 1 个题干和 5 个供选的备选答案组成,备选答案中只有一个是最佳选择,其余为干扰选项。

(1) 胸腰椎压缩骨折的悬吊复位法,最早载于何本著作?

(D)

A.《诸病源候论》

B.《千金方》

C.《理伤续断秘方》

D.《世医得效方》

E.《正体类要》

(2) 搭肩试验常用于检查下列何种疾病? (C)

A. 肩关节周围炎

B. 肱骨干骨折

C. 肩关节脱位

D. 肩关节结核

E. 冈上肌腱炎

(3) 腕管综合征受压的神经是 (C)

A. 桡神经

B. 尺神经

C. 正中神经

D. 桡神经与尺神经

E. 以上都不是

(4) 损伤病机的核心内容是指 (C)

A. 筋与骨的关系

B. 气与血的关系

C. 气血与损伤的关系

D. 肝肾与损伤的关系

E. 肝与肾的关系

2. 以上都不是型:设计一个为“以上都不是”的答案,在A、B、C、D、E中供考试者选择的方式。

(1) 股骨上 1/3 骨折,骨折近端常发生何种移位? (E)

- A. 向后
- B. 内收
- C. 向上
- D. 内旋
- E. 以上都不是

3. 否定型:试题的题干中有一个特别标准的否定词(不、不是、不能、除、除外、错误、无关等,5个备选答案中有哪一个符合题干的要求,要求考生找出来)。

(1) 练功疗法的作用下列哪项是不正确的? (E)

- A. 促进气血运行
- B. 防止肌肉萎缩
- C. 防止关节强直
- D. 加速功能恢复
- E. 能够生津止渴

(二) A_2 型题(病历摘要最佳选择题):多采用考查临床技能和知识,但对基础学科此题型也很适用。题干是一个叙述性主体(如简要的病历),有5个供选择的备选答案组成,也可以像 A_1 一样,设计成标准型和否定型。

1. 男,35岁,建筑工人。在施工时,突起腰部剧痛,疼痛为持续性,休息后缓解,但不消除。咳嗽、大声说话时腰痛加剧,神经系统检查无明显的阳性体征,最可能性的诊断是 (B)

- A. 梨状肌综合征
- B. 急性腰扭伤
- C. 腰肌劳损
- D. 急性腰椎间盘突出症
- E. 第三腰椎横突综合征

2. 患儿,8岁。右胫腓骨骨折3个月,X线片显示胫腓骨中段斜行骨折已愈合,重叠移位1.5 cm,向外成角5°,应如何处理? (A)

- A. 不需治疗
C. 手法折骨石膏固定
E. 切开复位髓内钉固定
- B. 手法折骨持续牵引
D. 切开复位钢板固定

3. 男, 45 岁, 工人。腰部疼痛 1 年, 症状时轻时重, 半个月前腰痛加重, 并出现左下肢放射性疼痛, 大用力时疼痛加重。最可能的诊断是 (A)

- A. 腰椎间盘突出症
C. 脊椎转移性肿瘤
E. 腰部劳损
- B. 马尾肿瘤
D. 第三腰椎横突综合征

4. 男, 55 岁, 左手疼痛, 手指麻木 1 年。1 年前, 因劳动时手腕活动过度, 其后出现左腕部酸胀疼痛, 逐渐加重, 患手桡侧三个半手指麻木, 劳动后和夜间症状加剧, 病情反复发作。检查: 颈肩部无明显异常, 轻叩腕部桡侧腕屈肌与掌长肌腱之间, 桡侧三个半手指有放射性触电样刺痛感, 其感觉迟钝, 大鱼际轻度萎缩。最可能的诊断是 (B)

- A. 左桡骨茎突狭窄性腱鞘炎
B. 左腕管综合征
C. 颈椎病
D. 左屈指肌腱鞘炎
E. 颈椎间盘突出症

(三) A_3 型题(病历组最佳选择答案题): 试题结构是以病历为中心的描述, 然后提出 2~3 个相关的问题, 每个问题均以此病历为背景, 提出测试要点, 每一个测试要点(问题)由 5 个备选答案共同组成, 但备选答案只有一个是正确的。试题也可以采用 A_1 中的否定型。

1. 女, 23 岁, 左手腕背部无明显原因出现一蚕豆大小的

肿块,表面光滑皮色不变,触之有囊性感,肿块基底部固定,有轻压痛。

(1)最可能的诊断 (B)

- A. 腕背部的纤维瘤
- B. 腱鞘囊肿
- C. 腕三角软骨损伤
- D. 腕背部的脂肪瘤
- E. 掌骨的良性骨肿瘤

(2)本病常发生的部位为 (A)

- A. 腕背部
- B. 腕掌部
- C. 足背部
- D. 踝前部
- E. 前臂

(3)古代对本病的称呼除下列哪项外都是正确的? (C)

- A. 腕筋瘤
- B. 腕筋结
- C. 筋肿
- D. 筋聚
- E. 筋结

(四)A₄型(病历串型最佳选择题):此题也同样适用于基础学科考试,试题以叙述一个病历为背景,而后根据病情发展提出4~9个相关问题,每问有5个被选答案组成,但只有一个标准答案,每个问题可以选用A₁型题中讲的标准或否定型。

1-5题:患者,女,25岁,自8米高处坠落2小时后送至医院。诉胸背部疼痛,双下肢不能活动。

1.诊断时应首先考虑有以下哪种可能? (B)

- A. 颅脑损伤
- B. 脊柱损伤
- C. 双下肢骨折
- D. 骨盆骨折

E. 闭合性腹部损伤

2. 此时首先应做以下哪种检查? (D)

A. 心电图

B. 肌电图

C. 体表诱发电位

D. X线平片

E. 脑脊液穿刺检查

3. CT显示 T₁₁ 椎体爆裂骨折, T₁₁ 椎体压缩 1/2, 椎管内有较大骨折块, 同时伴关节突交锁, 最佳的治疗方案应是 (A)

A. 手术减压, 脊柱内固定术

B. 高低两点法过伸复位, 石膏背心固定

C. 手术相应椎板使脊髓得以减压

D. 颅骨牵引并使用激素及脱水药物

E. 手法复位并行推拿治疗

4. 经正确的治疗处理后 5 天, 截瘫恢复不太理想, 此时需要注意的并发症是 (C)

A. 椎管内进行性活动性出血

B. 腹主动脉损伤

C. 褥疮

D. 硬膜外粘连

E. 内固定器材断裂

5. 若该病人手术半月后病情明显改善, 双下肢肌力已恢复至 3 级以上, 此时应采用哪种治疗方法 (C)

A. 再次手术减压并扩大神经根管

B. 积极防治可能出现的并发症

C. 电针、推拿、按摩治疗及功能锻炼

D. 延长脱水药物及激素的使用时间

E. 行选择性神经后根切断术

B 型题

(一) B_1 型(标准配伍型): 可用于临床、基础学科考试, 可有效地测试各相关学科知识。试题首先给出 5 个备选答案, 备选答案后至少有 2 问, 每问在备选答案中选一个正确答案, 每个备选答案可被选用数次, 也可一次也不选。

- A. 拔伸牵引 B. 屈伸回旋
- C. 端提捺正 D. 屈髋拔伸
- E. 足蹬膝顶

1. 髋关节前脱位的复位主要手法是 (D)
2. 髋关节后脱位的复位主要手法是 (D)

(二) B_2 型题(扩展配伍题): 该试题形式及答案选择基本同 B_1 型题, 只是备选答案由 B_1 型 5 个增加到 8 个答案, 因增加了备选答案, 提高了试题的难度和可信度。

- A. 最早采用悬吊复位法治疗脊柱骨折
- B. 我国第一部病理专书《诸病源候论》的作者
- C. 最早记录颞颌关节脱位整复方法
- D. 我国现存最早的外伤科专书的作者
- E. 我国现存最早的伤科专书的作者
- F. 最早提出用手牵足蹬法治疗髋关节脱位
- G. 最早使用麻沸汤进行麻醉手术
- H. 最早阐明和强调伤科疾病局部和整体的辨证关系

1. 葛洪 (C)
2. 华佗 (G)
3. 龚庆宣 (D)

4.危亦林 (A)

X 型题(多选题)

此题由 1 个题干和 5 个备选答案组成,选出的备选正确答案可以是 2~5 个,此题型可广泛应用于基础和临床试题。

1.疲劳骨折常见的发生部位 (B C)

- A.第五跖骨
- B.第二、三跖骨
- C.腓骨干下 1/3
- D.距骨颈
- E.第一跖骨

2.在 X 线摄片以前,诊断骨折的特有体征是 (A B C)

- A.畸形
- B.反常活动
- C.有骨擦音或骨擦感
- D.局部压痛
- E.功能障碍

3.适用于坐位脊柱旋转法治疗的疾病有 (B E)

- A.腰部韧带损伤
- B.椎间小关节错缝
- C.骶椎腰化
- D.腰椎骶化
- E.滑膜嵌顿

4.皮肤牵引多适用于 (A C)

- A.12 岁以下的儿童股骨骨折
- B.老人股骨干骨折
- C.老人股骨转子间骨折
- D.骨盆骨折所致下肢缩短
- E.18 岁以下青少年股骨骨折

模拟试卷一

一、多选题(60 题 × 1 分)

(1 ~ 15 题为 A₁、A₂ 型题, 每题只有一个最佳答案)

1. 桡神经损伤的体征是 ()
A. 拇指不能对掌 B. 四、五指夹纸试验阳性
C. 腕下垂 D. 小指侧感觉障碍
E. 以上都不是
2. 伤筋的主要症状是 ()
A. 疼痛、肿胀、麻木 B. 疼痛、肿胀、异常活动
C. 瘀肿、功能障碍、畸形 D. 瘀肿、疼痛、酸胀
E. 疼痛、瘀肿、功能障碍
3. 慢性劳损的疼痛特点是 ()
A. 刺痛 B. 胀痛
C. 夜间痛甚, 白昼减轻 D. 活动时疼痛加重,
 休息时减轻
E. 活动时疼痛减轻, 休息时加重
4. 下列哪一项不属于伤筋的并发症? ()
A. 血管损伤 B. 神经损伤
C. 损伤性骨化 D. 骨性关节炎
E. 关节内游离体
5. 伤筋三期辨证用药时, 中期是指 ()
A. 伤后 3 ~ 4 天 B. 伤后 5 ~ 7 天
C. 伤后 8 ~ 10 天 D. 伤 11 ~ 14 天
E. 伤后 3 ~ 14 天

6. 肩关节脱位常合并何种骨折？（ ）
- A. 关节盂边缘骨折 B. 肱骨头骨折
C. 肱骨外科颈骨折 D. 肱骨大结节撕脱性骨折
E. 以上都不是
7. 屈曲型胸腰椎单纯性压缩骨折的复位基本原则是使（ ）
- A. 脊柱旋转 B. 脊柱前屈
C. 脊柱后伸 D. 脊柱侧屈
E. 以上都不是
8. 疲劳性骨折多见于（ ）
- A. 第一跖骨 B. 第二跖骨
C. 第三跖骨 D. 第四跖骨
E. 第五跖骨
9. 胫骨骨折可能发生迟缓愈合或不愈合的常见部位在（ ）
- A. 上端 B. 上段
C. 中下段 D. 下端
E. 以上都不是
10. 股骨颈骨折移位采用持续牵引时，应将患肢置于（ ）
- A. 外展外旋位 B. 外展旋中位
C. 内收外旋位 D. 内收旋中位
E. 以上都不是
11. 下列哪一项不是导致骨折延迟愈合或不愈合的因素（ ）
- A. 感染 B. 骨折端有软组织嵌入
C. 骨缺损 D. 反复整复

E. 未能解剖复位

12. 骨与关节结核最多见于 ()

A. 膝关节

B. 肘关节

C. 脊柱

D. 髋关节

E. 肩关节

13. 早期骨结核与类风湿性关节炎可靠的鉴别诊断依据是 ()

A. 单一关节肿胀

B. 血沉增快

C. X 线平片关节间隙有无狭窄

D. 活组织检查

E. 关节穿刺抽液行关节液检查

14. 对骨肿瘤的诊断、鉴别诊断,最有价值的检查是 ()

A. X 线平片

B. 核素骨扫描

C. 查 ALP

D. 组织活检,病理检查

E. MRI

15. 在骨折的急救中,哪项处理不正确? ()

A. 首先抢救生命

B. 可用当时认为最清洁的布类包扎创口

C. 妥善的外固定十分重要

D. 开放外露的骨折断端均应立即复位

E. 病人经妥善固定后,应迅速转送运往医院

(16~30 题为 A₃、A₄ 型题,每题只有一个最佳答案)

女,51 岁,右肩部疼痛 2 个月,近一周疼痛加重。关节功能明显障碍,梳头和穿衣等动作受限,肩关节周围有多处压痛点。

16. 最可能的诊断 ()

- A. 肩周炎
- B. 类风湿性关节炎
- C. 神经根型颈椎病
- D. 冈上肌损伤
- E. 肩部扭挫伤

17. 本病患者肩臂部肌肉萎缩时, 以何肌肉为明显?
()

- A. 冈上肌
- B. 胸大肌
- C. 背阔肌
- D. 三角肌
- E. 肱二头肌

18. 本病的病名很多, 以下哪个不是 ()

- A. 漏肩风
- B. 露肩风
- C. 肩凝风
- D. 肩痹
- E. 肩凝症

男, 45 岁, 体力劳动者。右肘关节外侧部疼痛 1 月余。特别是做扭毛巾、提开水瓶等动作时吃力, 肱骨外上髁部压痛明显。

19. 可能的诊断为 ()

- A. 肘部扭挫伤
- B. 肱骨外上髁炎
- C. 肱骨内上髁炎
- D. 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎
- E. 类风湿性关节炎

20. 关于本病的论述, 下列哪项论述是错误的? ()

- A. 基本病理变化是慢性损伤性炎症
- B. 主要是伸肌总腱的损伤
- C. 病变都发生在网球运动员
- D. 本病又称为肱骨外上髁炎
- E. Mills 征阳性

21. 本病患者作抗阻力检查时, 什么动作可引起患处的疼