

YAOYONG



31.71

药用花卉

药用花卉

王鉴钧 麦英杰编

*

广西科学技术出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行

广西地质印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 印张4.875 字数104,000

1988年8月第1版 1988年8月第1次印刷

印 数：1—15,000册

ISBN 7—80565—014—4/R·6 定价1.70元

前　　言

大家知道，花卉是供人们观赏的。但不少花卉可以用来防治疾病就不一定人人都知道。

我国花卉品种繁多，几乎都可以作为药用。为了普及卫生知识，保护人民身体健康，帮助大家了解各种花卉在药用方面的有关知识，发挥花卉防治疾病的作用，我们选择常见的可供药用的花卉150种。对各种花卉的品名、别名、简要形态（附图）、药用部分、采集加工、性味效用、应用方法以及注意事项等一一作了叙述，其中着重介绍其临床应用。

不少花卉各地命名尚不统一，有同名异物的，也有一物多名的，用于治病时，要参考其品名、别名、形态和图象等，认真加以识别，以防错用。至于各种药用花卉的详细形态及栽培方法，请参阅花卉专著，本书不作介绍。

本书在应用栏中所介绍的药物用量，是以成人用量计算的，儿童用量则按八至十二岁用半量，四至七岁用三分之一量，二至三岁用四分之一量。计算单位用公制，以克和毫升为单位（1斤=10两，1两=50克；1斤=500毫升，1两=50毫升）。凡药名前冠有“鲜”字的，是指新鲜的药物，其它均为晒干的药物。如改用鲜药，一般可加倍使用。各种花卉的配方，多有以一些中草药和它配伍的，这些药一般可

在中药店买到。

本书插图由黄增任、彭治章两同志绘制。

由于我们水平有限，经验不足，书中的缺点和错误在所难免，希望读者提出宝贵意见，以便修正提高。

编 者

一九八八年五月

目 录

苏 铁	1	伽蓝菜	24
银 杏	2	佛甲草	25
马尾松	3	垂盆草	26
侧 柏	4	虎耳草	27
罗汉松	5	石 竹	28
竹 柏	6	剪秋罗	29
夜合花	7	午时花	30
辛夷花	8	竹节蓼	31
白兰花	9	鸡冠花	31
黄兰花	10	千日红	32
含笑花	11	天竺葵	33
紫玉盘	12	旱金莲	34
芍 药	12	凤仙花	35
牡 丹	14	紫 薇	36
莲	15	石 榴	37
八角莲	17	菱	39
南天竹	18	叶子花	40
金粟兰	19	紫茉莉	41
草珊瑚	20	海桐花	41
虞美人	21	西河柳	42
黄花倒水莲	22	粗喙秋海棠	43
落地生根	23	秋海棠	44

裂叶秋海棠	45	榔 榆	71
仙人球	46	细叶榕	72
昙 花	46	卫 矛	73
量天尺	47	扶芳藤	74
仙人掌	48	雀梅藤	75
茶 花	49	爬山虎	75
梧 桐	50	葡 萄	76
蜀 葵	51	佛 手	77
木芙蓉	52	金 橘	78
扶 桑	53	九里香	79
木槿花	54	米仔兰	80
变叶木	56	鸡爪槭	81
铁海棠	56	叶上花	82
一品红	57	常春藤	83
红背桂	58	杜鹃花	84
红雀珊瑚	59	朱砂根	85
绿萼梅	60	紫金牛	86
桃 花	60	连 翘	87
火 棘	62	迎春花	88
月季花	63	素馨花	89
蔷 薇	64	茉莉花	89
玫瑰花	65	女 贞	90
腊梅花	66	小腊树	92
含羞草	67	桂 花	93
槐 花	67	长春花	94
细叶黄杨	69	狗牙花	94
垂 柳	70	夹竹桃	95

鸡蛋花	96	萱 草	123
球 兰	97	白玉簪	124
伏牛花	98	紫玉簪	125
梔子花	99	百 合	126
龙船花	100	山丹花	127
六月雪	101	沿阶草	128
金银花	102	吉祥草	129
蓍 草	104	万年青	130
波斯菊	105	七叶一枝花	131
香 菊	105	石菖蒲	132
菊 花	106	狮子尾	133
万寿菊	108	千年健	134
指天椒	109	文殊兰	135
牵牛花	110	石 蒜	136
凌霄花	111	水仙花	137
炮仗花	112	射 干	138
一见喜	113	鸢 尾	139
五色梅	114	金边龙舌兰	140
蚌 花	115	铁 树	141
吊竹梅	116	虎尾兰	141
美人蕉	117	鱼尾葵	142
芦 荟	118	虾脊兰	143
天门冬	119	兰 花	144
文 竹	120	鹤顶兰	145
银边吊兰	121	紫 竹	146
万寿竹	122	淡 竹	146



苏 铁

苏铁又名凤尾蕉、凤尾棕、梭罗花。常绿树，高1~4米，直立。干粗壮，圆柱形，不分枝。叶丛生于茎顶，羽状叶长0.5~2米。夏季开花。种子倒卵形，以叶、根、花及种子入药。叶，全年可采；花，夏季采；果，秋季果实成熟时采。采后洗净晒干备用。味甘、淡，性平，有小毒。叶，有收敛止血、解毒止痛作用。花，有理气止痛、补肾固精作用。种子，有平肝、降血压作用。根，有祛风活络、补肾作用。


应 用 1. 白带：苏铁花15克，加水250毫升，煎至100毫升，一次服。

2. 支气管炎、胃痛、痛经：苏铁花15克，加水350毫升，煎至150毫升，分两次服。

3. 小儿消化不良：苏铁叶10克，加水250毫升，煎至100毫升，一次或分两次服。

4. 外伤出血：苏铁叶锻炭研粉，撒布于伤处。

注意事項 种子和茎顶部的树心有毒，常服可引起头晕、呕吐。



银 杏

银杏又名白果树、公孙树。落叶大乔木，树皮淡灰色，老时黄褐色，纵裂。叶扇形，有长柄，在短枝上的丛生，在长枝上的如螺旋状散生。5月开花，淡青色。结实如杏桃状，近球形或椭圆形，外种皮肉质，生青，熟呈淡黄色，以叶和果仁入药。秋季采叶，晒干；秋后种子成熟，采下除去肉种皮，洗净晒干，用时打碎取种仁。种仁味甘、苦、涩，性平，有小毒，有敛肺定喘、收涩止带作用。叶，味苦、甘、涩，性平，有小毒，有活血止痛、杀虫作用。

应 用 1. 气喘咳嗽，痰多：银杏五个，麻黄7.5克，炙甘草6克，加水200毫升，煎至100毫升，睡前服。

2. 寒嗽痰喘，症见咳嗽气喘痰多，痰清稀，色白，舌苔薄白：银杏七个，煨熟去壳，再取艾绒捏成七团，每团与银杏等大。然后以白果一个与艾绒一团为一份，分为七份，逐份分别用湿纸包好，再放入红火灰中煨熟至香气大出，去掉艾绒，嚼食白果。

3. 妇女带下，色白清稀，或有腰冷腹重，四肢不温，头晕眼花，证属虚寒者：白果10克，莲子30克，胡椒6克，以雌乌骨鸡一只同炖熟服。

4. 妇女带下，赤白相杂，质稠粘，臭秽气甚，小便色黄，口干，证属湿热者：白果10克，黄柏10克，芡实15克，加水300毫升，煎至150毫升，一次服。

5. 慢性淋浊：白果炒熟去壳，与淮山等份，焙燥，研为细末，每次13克，开水送服，每日三次。


6. 遗尿：白果20克，去壳，放入猪膀胱内炖服。

7. 灭蛆和子孓：鲜银杏叶适量，捣烂投入粪坑、污水中，可杀灭蛆、孑孓。

注意事项 1. 生白果有毒，不可食。

2. 咳嗽痰稠不利者，不宜用本品。

3. 食白果中毒时，用甘草粉15克，分两次用冷开水送服，或用甘草60克，水煎服，或用白果壳30克水煎服，或用白果树皮60克水煎服。可解。



马尾松

马尾松又称松树，常绿大乔木。树皮鳞片状剥裂。叶针状线形，每二针一束，基部有叶鞘。夏初开花。球果卵形，由多数果鳞组成，每果鳞内藏种子二粒。多生于山坡干燥的砂砾地或旷野荒地，公园亦多栽植作盆景。全身各部分都可入药。松叶、树枝、树皮、树梢，全年可采。鲜用或晒干备用。松香，七至八月采，割破树干皮近木质部呈“U”字形，待松脂流出，用竹筒接取，放入蒸馏器中，蒸出松节油，剩下的松脂去掉杂质，冷凝后即成松香。松香有祛风燥湿、杀虫、止痛作用，为外科生肌药和膏药的基础剂。松节油，有舒筋活络、消肿止痛作用。松花粉，四至五月开花时，采集雄花，晒干，搓下花粉，除去杂

质备用。松花粉，味苦、涩、微甘，性温，有祛风止血作用。松叶（松毛），有祛风燥湿作用。松枝，有涩精作用。松树皮，有生肌止血作用。

应 用 1. 风湿关节痛：鲜松叶9克，加水200毫升，煎至100毫升，一次服。

2. 冻疮：鲜松叶适量，水煎浸洗患处。

3. 阴囊湿疹：鲜松叶适量，水煎外洗。

4. 胃寒痛：松花粉3克，研细，冲酒服。

5. 外伤出血：松花粉撒于伤处，或用松树皮研粉撒伤处。

6. 痛疮溃烂、烧烫伤溃烂，久不收口、外伤出血：松树皮研粉撒患处。

7. 小儿头上秃疮：松香15克，猪油30克共熬炼融化，搽患处，每日三至四次。

8. 牙痛：松树脂适量，滚水泡化，含漱。



侧 柏

常绿乔木，高达20米，树冠圆锥形，分枝多，树皮红褐色，呈鳞片状剥落。小枝扁平，呈羽状排列。叶十字对生，细小鳞片状，紧贴于小枝上，亮绿色，端尖，背有凹陷的腺体一个。雌雄同株，雄球花多生于下部的小枝上，呈卵圆形；雌花生于上部的小枝上，球形。球果卵圆形。花期四月。果期七至十用。以嫩枝与叶、种子、树脂

等入药。夏秋采收，剪取小枝，晾干；冬初采收种子，晒干，压碎种皮，簸净，阴干；七至八月采树脂。叶，味苦、涩，性寒，有凉血、止血、祛风湿、散肿毒作用。子，味甘，性平，有养心安神、润肠通便作用。柏脂，味甘，性平，有治疥癣、癞疮、秃疮、黄水疮、丹毒作用。

应 用 1. 烧伤烫伤：鲜侧柏叶适量，捣烂取汁涂于患处。

2. 头痒多白屑：鲜侧柏叶60克，茶枯30克加水3000毫升煎浓，洗头。

3. 外伤出血：鲜侧柏叶适量捣烂敷伤处，或取干叶烧成炭研粉撒伤处，或取柏树树脂研粉撒伤处。

4. 鼻出血：鲜侧柏叶、鲜莲叶各30克，加水300毫升，煎至150毫升，分两次服。本方亦可治疗功能性子宫出血。

5. 老年人大便秘结：柏子仁12克，草决明15克，加水500毫升，煎至200毫升，分两次服。



罗 汉 松


罗汉松又名土杉、罗汉杉。常绿乔木，树皮成薄鳞片剥落；枝叶稠密。叶螺旋状排列，具短柄；叶片条状披针形。5月开花。种子卵圆形。以根皮、叶和球果入药。根，四季可采，秋季采球果。味甘，性微温。果有益气补脾胃作用。根皮有活血止痛、杀虫作用。叶，味淡，性平，

有止血作用。

应 用 1. 跌打损伤：鲜罗汉松根皮适宜，加黄酒捣烂敷于患处，或用鲜罗汉松根皮与苦参根等量，加黄酒捣烂敷患处，每日换药一次。

2. 心胃气痛、血虚面色萎黄：罗汉松实果10克，加水250毫升，煎至100毫升，一次服。

3. 吐血、咳血：罗汉松叶30克，蜜枣两个，加水500毫升，煎至200毫升，分两次服。



竹 柏

常绿乔木。叶交互对生或近对生，排成两列，厚革质，窄卵形、卵状披针形或椭圆状披针形，长5～7厘米（萌生枝的叶长可达11厘米），宽1.5～2.8厘米，无中脉而有多数并列细脉。雄球花穗状，常分枝，单生叶腋，长1.8～2.5厘米，梗较粗短；雌球花单生叶腋，极少成对腋生。种子球形，直径1.2～1.5厘米，熟时套被紫黑色，有白粉。以叶、树皮、根入药。四季可采，鲜用或晒干备用。味淡、涩，性平。叶，有止血、接骨作用。树皮、根，有祛风除湿作用。

应 用 1. 骨折：鲜竹柏叶适量，捣烂，整复后敷患处，绑扎固定，每天换药一次。

2. 外伤出血：竹柏叶研粉，取适量，撒伤口上，外加包扎。

3. 拔弹头：鲜竹柏叶适量，捣烂，将伤处清洁消毒后，敷药，外加包扎。

4. 风湿性关节炎：鲜竹柏树皮或根适量，水煎熏洗患处。



夜合花

夜合花又名夜香木兰。常绿秃净灌木，高2~3米。叶互生，椭圆形至长圆形，长7~18厘米，宽3~6.5厘米，全缘，先端尾状渐尖，基部长楔形，背卷，网脉两面均极明显凸起，革质；叶柄长5~10毫米。花单一，顶生，白色，极香；直径3~4厘米；花梗粗壮，无毛，常下弯，长1.5~2.5厘米；花萼三片，淡绿色，倒卵形，无毛；花瓣六片，二列，倒卵形，外轮的较大，长2~2.5厘米。花期五至六月。以花朵入药。四至五月采摘，晒干。气味极芳香，味淡，有开郁行气、祛瘀、止带作用。


应用 1. 心胃气痛：夜合花9克，丹参15克，加水300毫升，煎至100毫升，分两次服。

2. 赤白带下：夜合花9克，鸡冠花10克，加水300毫升，煎至100毫升，分两次服。

3. 经期腹痛：夜合花9克，白芍药12克，炙甘草6克，加水350毫升，煎至100毫升，分两次服。

4. 助间神经痛：夜合花9克，丝瓜络12克，加水350毫升，煎至100毫升，分两次服。

5. 心烦失眠：夜合花9克，百合15克，加水500毫升，煎至150毫升，分两次服。



辛夷花

辛夷又名紫玉兰、木笔、望春花。落叶大灌木，高3～5米。春季花先于叶开放，或长叶时开放，单生于枝顶，大型，钟状，芳香；花萼三片，花瓣六片，外面紫色，内面稍带白色，雌雄蕊均多数，螺旋状排列。药用其花蕾，冬春两季采摘晒干，去尽枝梗。味辛、性温，有散风寒、通鼻窍作用。

应用 1. 慢性鼻窦炎、副鼻窦炎、过敏性鼻炎：辛夷9克，水煎服。

2. 感冒头痛，鼻塞：辛夷9克，山梔子9克，打碎，菊花9克，加水400毫升，煎至200毫升，每日分两次服，日服一剂。

3. 牙齿痛：辛夷15克，水煎，含口中十分钟再吐去，每日含数次。

4. 鼻渊头痛，鼻塞不通，不闻香臭，常流浊涕：辛夷、苍耳子各10克，甘草5克，加水400毫升，煎至200毫升，每日分两次服，日服一剂。

注意事项 本品因有毛，用于内服的，要用布将辛夷包起来煎煮。



白 兰 花

白兰花又名白玉兰、白缅花。

常绿乔木，高达10~20米。树皮灰色，幼枝和芽被淡黄白色柔毛。叶互生，叶柄长1.5~2厘米，托叶痕达叶柄中部以下；叶片长椭圆形或卵状椭圆形，长10~20厘米，宽4~9.5厘米，先端渐窄或渐尖，基部宽楔形，全缘，无毛或下面沿脉上疏生微柔毛。夏季开白色花，单生于叶腋，极香；花被十片以上，条状，长3~4厘米，宽3~5毫米。以根、叶、花入药。夏秋季可采，鲜用或晒干备用。味苦、辛，性微温，有芳香化湿、利尿、止咳化痰作用。

应 用 1. 痘疮肿痛：鲜白兰花树叶适量，捣烂，敷患处。

2. 支气管炎：白兰花树根20克，加水350毫升，煎至150毫升，分两次服，或用白兰花12克，加水200毫升，煎至100毫升，分两次服。

3. 白带：白兰花12克，加水200毫升，煎至100毫升，分两次服。

4. 泌尿系感染，小便不利：白兰花树根20克，加水500毫升，煎至200毫升，分两次服。



黄 兰 花

黄兰花又名黄玉兰。常绿乔木，高达20米，幼枝、嫩叶和叶柄均被淡黄色平伏柔毛。叶互生，薄革质，披针状卵形或披针状长椭圆形，长10~20厘米，宽4~9厘米，顶端长渐尖或近尾状，基部楔形，全缘；叶柄长2~4厘米，托叶痕达叶柄中部以上。花单生于叶腋，橙黄色，极香；花被十五至二十片，披针形，长3~4厘米；雄蕊的药隔顶端伸出成长尖头；雌蕊群柄长约3毫米。以根、叶、花入药。夏秋季可采鲜用或晒干备用。花，在夏季开花期间采，鲜用，或于清晨太阳未出时采集，隔水蒸一下，汽上即取出（不可久蒸）晒干备用。味苦，性凉。根和花有祛风湿、利咽喉、健胃止痛作用。树皮有解热、兴奋、祛痰、收敛作用。

应 用 1. 风湿关节痛：鲜黄兰花、鲜九里香花各适量，共捣烂敷患处，或用黄兰花根12克，秦艽12克，加水500毫升，煎至100毫升，分两次服，每日服一剂。

2. 头痛：鲜黄兰花揉烂搽患部。

3. 神经性胃痛：黄兰花根12克，佛手10克，加水200毫升，煎至100毫升，分两次服，每日服一剂。

4. 骨卡喉：黄兰花根10克，加水400毫升，煎至150毫升，分十多次，每次口含此药水10多毫升，含片刻后，使药水慢慢通过咽部，然后咽下去。

5. 咳嗽痰多：黄兰花树皮12克，款冬花10克，加水