

〔清〕凌嘉六 著

溫熱類編

中國醫學大成續集

溫熱類編提要

清·浙湖凌嘉六撰。上海秦伯未刪訂。其原纂凡八卷。首日原始篇。采黃帝越人仲景之語。輔以溫病條辨。類傷寒辨。察舌辨證等。次曰溫病編。分春溫、風溫、溫瘧、溫毒、斑疹等。次曰熱病編。分熱證、熱厥、熱風、驚癇等。次曰暑病編。分中暑、霍亂、臭毒等。次曰濕病編。分濕溫、濕熱、濕瀉、痞滿、腳氣、腫脹、黃疸等。次曰瘧病編。次曰時疫編。次曰方論編。除原始編外。各編之首。復條引群經精義。集各家之大成。實溫熱中巨著也。迨潛心展覽。則微嫌有重複者。若既冠原始編。而更出群經精義。是不涉者。若濕瀉、痞滿、腳氣、腫脹等。無干於溫熱。是有可併者。若瘧病之堪附於溫。時疫之堪附於暑是。而方論編缺不可考。

殆已散見各卷。不復滙集歟。用是謀加重訂。析正編附翼爲兩大類。正編復析證治診斷二大篇。證治篇。分溫、熱、病、濕四綱。刪原始編。分列群經精義中。易其名曰通論。於瘟疫病。分春溫、風溫、溫瘧、溫毒、斑痘、四目。熱病分熱症、熱厥、熱風、小兒驚疳、熱病解後、五目。暑病。分中暑、霍亂、臭毒三目。濕病。分濕溫、濕熱、黃疸三目。診斷篇。則分察舌、察目二綱。附翼而以熱病條辨。類傷寒辨。皆諸家原本。歸於一處。意在資參考耳。纂刪增訂。得分六卷。此秦君刪訂之大意也。嘉六先生爲浙西名醫。虛心篤學。博通古今。著作如林。而尤重於溫熱大症。診餘之暇。見有溫熱諸病之特異證狀。得發明針鋒相對之療法。隨見隨錄。隨按。滙編十年。三易其稿。復經趙元益先賢詳加校訂。凡屬春溫。夏熱、秋燥、冬溫。以及風溫、濕溫、溫毒、溫疫。各詳其本病變症類症。縷析條

分。都爲六卷。題曰溫熱類編。爲嘉六先生一生精力之結晶。足爲後學之南針。對於溫熱病中。伏氣與新感。證候之輕重。治法之難易。分際清晰。一覽便知。民國十五年。裘吉生先生校刊印行。即時售罄。現已不可復得。今特重爲校勘。增以圈點。再付鉛槧以廣流傳。

凌嘉六先生遺著

溫熱類編

張浩題



凌嘉六先生遺像與袁公題贊

凌嘉六先生四十五歲小爲贊

一丈之室寄此海濱一尺之

書肘後方陳繫湛冥

之蜀嚴乃避

世而采真不

涸於俗而同

其塵是之謂古者萬

天之民

乙亥冬日

碩秋弟袁祖拜手



印行本書緣起

本社自印行孤本醫書百數種。及刻醫藥叢書四集。紹興醫報叢書八十餘種。國醫百家八種。鮮溪醫述七種。醫報彙編三十種。後又印三三醫書一二三共三集。計搜刊醫書九十九種以來。屢荷醫學界藏書家所贊許。惟書式洋裝。紙用舶來。一般顧主責以未能久藏。不合刊行古書之例。且限單本小部。則大部多卷之秘笈。將永歸湮沒。多數主張改革。爰徇衆意。於第四集起改爲白連史紙磁青面。賽連史紙栗壳面兩種。均以四開大版本國裝訂。選世所未刻之先賢遺稿。及不見流傳之珍藏古籍。繼續印行。更換其名。曰讀有用書樓醫書選刊。每種不限卷數與冊數。並定各種價目。得以分種單購。仍以三十三種爲一集。出版之先。隨時宣布。惟本社力薄任重。時虞竭蹶。希流通醫書同道暨好古博雅君子多方提倡。俾國學重光。國醫永保。微特本社之幸焉。中華民國十五年丙寅之冬。紹興裘慶元謹識。

凌氏溫熱類編之緒論

自吳氏溫病條辨。王氏溫熱經緯二書行世。而醫家始知傷寒自傷寒。溫熱自溫熱。然皆言新感溫暑居多。而於伏氣溫熱之理由。尙未發明盡致。茲將歷代前哲言伏氣溫熱之因症脈治。一一詳述於左。黃帝內經曰。冬傷於寒。春必病溫。尺膚熱甚。脈盛躁。其脈盛而滑者。病且出也。如病溫者。汗出輒復熱。而脈仍躁疾。不爲汗衰。狂言不能食。病名陰陽交。交者死也。故病溫虛甚死。經又曰。冬傷於寒。春生瘧熱。熱病。太陽之脈。色榮頤骨。與厥陰脈爭見者。死期不過三日。少陽之脈。色榮頰前。與少陰脈爭見者。死期不過三日。熱病三日而氣口靜。人迎躁者。取之諸陽。五十九刺。熱病七八日。動喘而弦者。急刺之。熱病七日八日。微脈小。病者溲血。口中乾。一日半而死。脈代者。一日死。熱病已得汗出。而脈尙躁。喘且復熱。勿刺膚。喘甚

者死。熱病七日八日。脈不躁。躁不散數。後三日中有汗。三日不汗。四日死。未曾汗者。勿腠刺之。熱病不知所痛。耳聾不能自收。口乾。陽熱甚。陰頗有寒者。熱在骨髓。死不可治。熱病已得汗而脈尚躁盛。此陰脈之極也。死。其得汗而脈靜者。生。熱病脈尚躁甚而不得汗者。此陽脈之極也。死。脈盛躁得汗而靜者。生。凡熱病不可刺者有九。一曰。汗不出。大額發赤。噦者。死。二曰。泄而腹滿甚者。死。三曰。目不明。熱不已者。死。四曰。老人嬰兒。熱而腹滿者。死。五曰。汗大出。嘔下血者。死。六曰。舌本爛。熱不已者。死。七曰。咳而衄。汗不出。出不至足者。死。八曰。髓熱者。死。九曰。熱而瘕者。死。腰折。癰瘕。齒噤。齟也。此九者。不可刺也。當瀉其熱而出其汗。實其陰以補其不足。（廉按。此二句實治溫熱之總訣）此軒岐之論溫熱也。

秦越人難經曰。濕溫。溫病。熱病。其所苦各不同。濕溫之脈。陽浮而弱。陰小

而急。溫病之脈。行在諸經。不知何經之動。各隨其經所在而取之。熱病之脈。陰陽俱浮。浮之而滑。沉之散濇。又曰。熱病在內者。取其會之氣穴也。（廉按。府會太倉。藏會季脇。筋會陽陵泉。髓會枕骨。血會膈俞。骨會大杼。脈會太淵。氣會三焦。外一筋直兩乳內。此謂八會。爲當時治熱病者取穴用針之法。）此扁鵲之論溫熱也。

張長沙傷寒論曰。（張石頑云。仲景溫熱病諸例。向來混入傷寒六經例中。致使後世有以黃芩白虎湯誤治傷寒者。有以黃芩白虎證誤呼傷寒者。良由混次不分。以致蒙昧千古。今將溫熱諸條另析此篇。俾學者知傷寒論自有溫熱症治也。）太陽病。發熱而渴。不惡寒者。爲溫病。若發汗已。身灼熱者。名曰風溫。風溫爲病。脈陰陽俱浮。自汗出。身重。多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。劇則如

驚癇。時癰瘰。若火薰之一逆。尙引日。再逆促命期。太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯主之。陽明病。脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒反惡熱。身重。若發汗則躁。心憤憤反譫語。若加燒針必怵惕。煩躁不得眠。若下之則胃中空虛。客氣動膈。心中懊懣。舌上胎者。梔子豉湯主之。〔廉按。陸氏云。心中懊懣三句語意當在汗下溫針之上。〕若脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯主之。陽明病。汗出多而渴者。不可與猪苓湯。以汗多胃中燥。猪苓湯復利其小便故也。三陽合病。脈浮大關上弦。但欲眠睡。目合則汗。三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁而面垢。譫語遺尿。發汗則譫語。下之則額上生汗。手足逆冷。白虎湯主之。〔廉按。陸氏云。白虎湯主之語意在汗下之上。〕傷寒脈浮滑。此表有寒。裏有熱。白虎湯主之。傷寒脈滑而厥者。裏有熱也。白虎湯主之。

傷寒脈浮。發熱無汗。其表不解者。不可與白虎湯。渴欲飲水。無表症者。白虎加人參湯主之。傷寒無大熱。口燥渴。心煩。背微惡寒者。白虎加人參湯主之。傷寒病。若吐。若汗。若下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脈洪大者。白虎加人參湯主之。（以上三陽發溫熱例）師曰。伏氣之病。以意候之。今月之內。欲有伏氣。假令舊有伏氣。當須脈之。若脈微弱者。當喉中痛似傷。非喉痹也。病人云。實咽中痛。雖爾今復下利。少陰病二三日。咽痛者。可與甘草湯。不差者。與桔梗湯。少陰病下利。咽痛。胸滿。心煩者。豬膚湯主之。少陰病得之二三日以上。心中煩。不得臥。黃連阿膠湯主之。少陰病下利六七日。咳而嘔渴。心煩不得眠者。豬苓湯主之。少陰病得之二三日。口燥咽乾者。急下之。宜大承氣湯。（以上少陰發溫熱

例。廉按。張石頑曰。溫熱自裏達表。故三陽合病最多。發於三陽者易治。發於三陰者難治。然發於三陰者。必有所因。或因冷酒傷脾。或因鬱怒傷肝。或因色慾傷腎。皆正氣先傷。伏邪乘虛而發。設用甘溫調補。豈不助邪轉熾。若行苦寒峻攻。真元立致消亡。雖長沙復起。恐難爲力矣。濕家其人。但頭汗出。背強。欲得被覆向火。若下之早。則熱胸滿。小便不利。舌上如胎者。以丹田有熱。胸中有寒。渴欲得水而不能飲。則口燥煩也。廉按。丹田有熱。是伏邪胸中有寒。是新感寒濕。此濕痺之偏於熱者。卽是濕遏熱伏之一證。但頭汗出。亦是濕熱上蒸。惟背強。欲得被覆向火。確係新感寒濕。然必兼一身盡痛。關節煩疼。若純是寒濕。誤下必下利不止而死矣。實因濕未化燥。熱未成實。醫者下之太早。故噤而胸滿。小便不利矣。張氏石頑主用黃連湯。和解其上下之寒熱。却是濕溫救誤之良法。故余做其例。引

爲長沙論濕溫之症。此仲景之論溫熱也。

王氏傷寒例曰。冬令嚴寒。中而卽病者。名曰傷寒。不卽病而伏藏於肌腠。至春變爲溫病。至夏變爲熱病。熱病者。熱極重於溫也。是以辛苦之人。春夏多溫熱病。皆由冬時觸寒所致。非時行之氣也。若更感異氣。變爲他病者。（廉按。異氣者。謂伏邪將發未發之際。又感別異之時氣。引發伏邪而出也。）當依兩感症病而治之。如脈陰陽俱盛。重感於寒者。變爲溫瘧。陽脈浮滑。陰脈濡弱。更遇於風。變爲風溫。陽脈洪數。陰脈實大。更遇溫熱。變爲溫毒。溫毒爲病最重也。陽脈濡弱。陰脈弦緊。更遇瘟氣。變爲溫疫。此叔和之論溫熱也。

巢氏病源候論曰。辛苦之人。春夏必有溫熱病者。皆由其冬時觸冒之所致。有冬月觸冒寒毒。伏至春暖始發病者。有冬月天時溫煖。人感其氣未

卽發病。至春又被積寒所折。毒氣不得發泄。至夏遇熱。溫毒始發者。皆由表裏受邪。經絡損傷。臟腑俱病也。其候多端。姑言其要。(一)溫病發斑候。或已發汗吐下。而表證未罷。毒氣不散。故發斑。若溫毒發出於肌膚。斑爛隱軫如錦文也。(二)溫病煩候。此由陰氣少。陽氣多。故身熱而煩。其毒氣在於心經而煩者。則令人悶而欲嘔。若其胃內有燥糞而煩者。則謬語而繞臍痛也。(三)溫病狂言候。邪盛則四肢實。實則能登高而歌。熱盛於身。故棄衣而走。陽盛故妄言罵詈。不避親戚。大熱遍身。狂言而妄聞視也。(四)溫病嗽候。邪熱客於胸府。上焦有熱。其人必飲水。水停心下。則上乘於肺。故令嗽。(五)溫病嘔候。胃中有熱。穀氣入胃。與熱相并。氣熱則嘔。或吐下後飲水多。胃虛冷亦爲嘔也。(六)溫病噦候。伏熱在胃。令人胸滿。胸滿則氣逆。氣逆則噦。若大下後胃氣虛冷。亦令致噦。(七)溫病渴候。熱氣

入於腎藏。腎藏惡燥。腎燥則渴引飲。(八)溫病變成黃候。發汗不解。溫毒氣瘀結在胃。小便不利。故變成黃。身如金色。(九)溫病喉痛候。熱毒在胸上攻咽喉。故痛或生瘡。(十)溫病毒攻眼候。肝開竅於目。肝氣虛。熱毒乘虛上衝於目。故赤痛。重者生瘡翳也。(十一)溫病衄候。肺主氣而開竅於鼻。邪熱傷肺。故衄。衄者。血從鼻出也。(十二)溫病吐血候。熱毒入深。結於五藏。內有瘀血。故吐血。(十三)溫病下利候。風熱入於腸胃。故令洞泄。若挾毒。則下黃赤汁及膿血。(十四)溫病膿血利候。熱毒傷於腸胃。故下膿血如魚腦。或如爛肉汁。此由溫毒氣盛故也。(十五)溫病大便秘不通候。脾胃有積熱。發汗太過。則津液少。使胃乾。結熱在內。故大便秘不通。(十六)溫病小便不通候。過發汗。津液少。膀胱有結熱。故小便不通。(十七)溫病下部瘡候。熱攻腸胃。毒氣既盛。穀氣漸衰。故三蟲動作。食人五藏。則下部生