

串雅內編卷三

錢塘趙學敏恕軒纂輯

錢塘吳庚生平格補注

截藥

雜治門

取牙鯽魚霜

大鯽魚一個去腸以砒霜納入魚腹露乾放陰地待有霜即刮下用瓶收貯以針搜淨牙根點少許咳嗽自落或以少許藥置膏藥上貼蛙牙上即落

庚生按砒宜用白者每魚一兩約入白砒一錢不可過多

又方

活鯽魚一尾約四五兩白砒六錢將砒末納入魚腹中待魚爛之後

將魚骨洗淨曬乾為末每用少許點所患牙根上自落

去面上刺青

馬肉不拘多少令蒼蠅叢食生蛆取蛆曬乾為末以針撥動青處搽之其青自去

去身臂離青

胆礬礪砂龍骨各五分人蛆不拘多少麝香一匙臨用時加香油一盞煎熟將前藥研碎入油內用黃丹熬成膏油單紙貼之其黑跡自然隱入肉內

取箭鏃方

用天水牛一個獨角小者以小瓶盛之礪砂一錢研細末用水滴在內浸之自然化水以藥水點傷處箭頭自出

黑髮仙丹

熟地斤萬年青三片小桑椹斤黑芝麻八兩山藥斤南燭皮四兩花椒兩

白果兩

巨勝子

三兩

連壳蜜丸

早晚以酒送下

各五錢

忌食蘿蔔

又方

熟地

斤

苡仁

山茱

桑葉

白朮

生何首烏

巨勝子

白果

兩

黑芝麻

兩

五味

兩

山藥

斤

花椒

白果

兩

黑芝麻

兩

五味

兩

山藥

斤

花椒

取輕粉毒

出山黑鉛

五斤

打盛燒酒

十五

土茯苓

斤

乳香

錢

封固重湯煮一日

夜埋土中

出火毒

每日早晚

任性飲數杯

後用瓦盆接小便

以有粉

出為驗

服至筋骨不痛乃止

庚生按

世醫每以輕粉

治楊梅瘡

毒刻期奏效

固利害人日久必至

筋骨疼痛

顛低音嘶

病者醫者咸以為楊梅瘡之愈而復作

不知起

初薰藥丸藥之毒蘊久而發也此方平安而有奇功楊梅瘡用之亦有神效

受打不痛

用血管鵝毛七根地龍七条煨過用乳香同白蠟為末好酒送下誤吞鐵石

王不留行黃柏等分為末水浸蒸餅久彈子大青黛為衣用線穿挂受風處用時以一丸冷水化服

腳城

葱根葶藶搗汁一碗以松香四兩並麻油煎至滴水成珠方入前汁攤膏貼患處即愈

足趾難眼

作痛作瘡地骨皮同紅花研細敷之次日即愈

截毛蟲傷

春夏月樹下牆塹間雜色毛蟲極毒觸著則放毛入人手足上自皮至肉自肉至骨皮肉微癢漸痛經數日瘡在外而痛在內用手抓搔或癢或痛必致骨肉皆爛每有性命之憂此名中射工毒諸藥不效用好豆豉一碗青油半盞拌豉搗爛厚敷患處經一時之久鼓氣透骨則引出蟲毛紛紛可見取下豆豉埋土中再煎香白芷湯洗痛癢處如肉已爛用烏賊骨為末敷之立愈

又方

鍋底黃土為末以醋捏成團于痛癢處搓轉其毛皆落在土上痛癢立止神效無比

紅玉膏 治女人面脂

輕粉 滑石 杏仁去皮等分為末蒸透入腦麝少許以雞子清調勻

洗面畢敷之旬日後色如紅玉

竹木刺

鮮蝦並黃雀糞共搗罨上即出

治中河鮑毒

大紅降香為細末以索粉水調服錢許吐出毒物即愈

庚生按用索粉水者取菜豆之解毒也然近時市肆往往雜以蠶豆黃豆不若用菜豆一升杵碎泡湯調服為要

虎傷

被虎咬傷血必大出傷口立時潰爛疼不可當急用猪肉貼之隨化隨易再用後藥敷之

地榆一斤末加三七末

三兩

苦參末

四兩

和勻搽之隨濕隨搽血止痛亦止

矣

吹耳方 治小兒耳內濕爛

上梅冰片分煨蘆甘石錢一枯礬分三煨龍骨錢一海螵蛸錢一橘皮炭錢三赤

石脂錢一粉口兒茶分三蠶繭殼枚二煨石首魚腦骨研二枚

右藥為細末加胭脂邊二錢用紙包固以水浸濕用火煨炭存性和

勻再研吹之極效

頂藥 主上吐藥也

巴霜頂丹漢丸治纏喉風閉先脫膈氣緊驚然咽喉腫痛手足厥冷氣不

能速頃刻不治

雄黃錢一鬱金分五巴豆七粒去皮殼冰麝各少許為皮醋糊為丸如麻子大

清茶下五分如喉嚨塞用竹管納藥入喉中須臾吐痰立解未吐再

服

庚生按巴豆宜去油取霜方可用

四寶頂

狗寶丸

丁丹崖祖師治噎膈翻胃

硫黃

水銀

各一錢同炒成金色

狗寶

三雞卵一枚去

白留黃

和藥攪勻紙封泥固燒

火煨半日取出研細每以燒酒調服五分不過三服立驗

庚生按此方頗驗然宜驗症之虛實謹慎用之

牛即頂

牛即丸

治氣築奔衝不可忍兼追蟲取積亦消水腫黑牽牛

五錢

檳

榔

二分錢

為末每服一錢紫蘇湯下蟲積及水腫用酒下

青綠頂

治頑痰不化

石膏

兩一石

綠

五錢

水飛為末麴糊丸菜豆大溫水下十丸吐出痰二三

盃不損人

風痰瘁中方用生石綠

兩二

乳細水化去石慢火熬乾取辰日辰時辰

位修合再研入麝香

一分

糯米粉糊丸彈子大陰乾瘁中每丸作二服

薄荷酒下餘風硃砂酒下吐出青涎瀉下惡物立效小兒用銅綠研

粉醋麵糊丸芡實大每服薄荷酒下一丸須臾吐痰如膠神效

庚生按生石綠細繹方意疑即生銅綠蓋銅綠酸平主治風痰卒中
也此方本名碧林丹見樂譜明療銅綠條下治小兒名綠雲丹亦載
此書內

硫黃頂 治腰疼如神

黑牽牛半生半炒取頭末水丸梧子大硫黃末為衣空心用鹽湯
並酒下五十丸

庚生按此方用意極妙惟須體實而年久濕重者為宜亦不可驟投
至五十丸之多當量症加減為要

玉環來笑丹 治疝氣癰腫並諸氣痛

荔枝核四十個陳皮連白九錢硫黃四錢

右為末鹽水打麵糊丸菜豆大痛時空心酒服九丸良久再服不過

三服立效

庚生按此方與前疝氣神方相同惟荔枝核此方用四十九粒前方等分且須炒黃陳皮前方亦用等分硫黃此方未言製法前方須火中鎔化投水去毒且以飯為丸桐子大每服十四丸酒下為不同耳鄙見以為分量宜照此方製法宜照前方凡之大小及服丸之數亦宜照此方為是

輕粉頂 治小兒涎喘

無雄雞子一個用雞子清入輕粉一分拌勻銀器盛置湯瓶上蒸熟三歲兒食盡當吐痰或泄而愈壯實者乃可用

黑鹽頂

鹽一升納粗磁瓶中將泥頭築實先以糠火圍燒漸加炭火候燒透赤色鹽如水汁即去火待凝將瓶敲破取出用豆豉一升熬煎桃仁

一兩和麩炒熟已豆二兩去心膜及殼隔紙炒令油出須生熟料中
焦則少力生又損人將四物搗勻入蜜凡桐子大每服三丸須平旦
時服最好患時氣用豉汁及茶送下患心痛酒送下入口便止患血
痢米飲下初變水痢後即止患瘧茶飲下患骨蒸蜜湯下凡服藥後
吐利勿以為怪吐利若多服黃連汁止之或遇耐藥人服藥不動者
更服一二丸服藥後須忌口二三日其藥臘月合之用磁瓶封固勿
令洩氣一劑可救百人或在道途村落無藥可求但用此藥可敵大
黃朴硝數兩屢試有效小兒女子忌服

羊莢頂 治骨蒸傳尸

羊肉如拳大一塊煮熟皂莢一個炙以無灰酒一升銅鐺內煮三五
沸去渣入黑錫一兩煎至一合令病人先啜肉汁後服一合之藥如
吐蟲如馬尾即愈矣

截瘡頂 治三日大瘡

活大烏龜一個連殼左右肩各鑽一孔近尾處亦鑽一孔以明雄黃九錢研細每孔摻入三錢外以黃泥包固勿令洩氣炭火上煨存性研細每服准一錢空心陳酒下二三服即止

又方 預擇陳香椽一個去頂皮大者每隻加明雄黃三錢中者二錢小者一錢研細摻入香椽內火中煨存性再研極細每服七分用麝衣作六七包乾咽下不可吃湯水任其嘔吐頑痰即愈治三陰瘡尤驗
庚生按瘡症不一驗方亦多往往此用則效彼用則否者症非一致也此方治年久不愈之瘡每有奇驗而輕淺者用之非徒無益甚且損胃作嘔不可不知後附試驗單方數則以備隨症採用

截瘡丹 五月五日取獨蒜不拘多少春爛入黃丹等分再杵凡如圓眼大晒乾收存凡疾發二三次後取一丸杵碎雞鳴時面東井花

水下

又方 薑搗三錢雄精三錢研細和勻用膏藥二張取藥三分用生薑汁和作兩餅一貼頸後天柱骨下第一節一貼臍上均以膏藥蓋之須先一時貼不可經婦女手

三奇頂 治小兒天哮神效

經霜天燭子

臘梅花

各三錢

水蛭

一條俱預收

水煎服一劑即愈

金線頂 凡一切宜吐痰涎之症用代瓜蒂最妙

金線重樓

俗名金線吊蝦蟆搽得去外黑皮

用石打碎勿犯鉄器晒乾為末磁瓶收

貯備用風痰結胸用藥一錢陰陽水和服吐痰即愈傷食成虛臨發

時空心用藥一錢開水和服噤口痢用藥一錢溫涼水和服即愈

庚生按金線重樓蔓生田野山石間葉似三角風光潤帶青黃色芒種時開花如穀精花性力甚大多食令人吐瀉不止

砒霜頂 治哮喘三年後可用

精猪肉

三十兩切作散子塊

白信

一兩研細末拌在肉上令勻用紙筋黃泥包之今乾

白炭火於無人處

煨俟青烟出盡研細以湯浸蒸和丸如菜豆大食前茶湯送下大人

二十粒小兒四五粒量虛實服之

勦喘痰積方 凡天雨便發坐卧不得飲食不進乃肺竅久積冷痰遇陰氣觸動則發也用後方一服即愈服至七八次即吐惡痰數升藥性亦隨而出即斷根矣

江西淡豆豉

一兩蒸搗如泥

入砒霜末

錢一枯礬錢三

丸菜豆大每用冷茶冷水

送下七丸甚者九丸小兒五丸即高枕仰卧忌食熱物等

以上二方體虛者千

萬忌用

皂礬頂

稀涎散

凡人猝中風昏昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流涎

斯須不治便成大病此證風涎潮於上致胸痺氣不通用此吐之

皂莢末

兩一

生礬末

五錢

臙粉

五錢

水調一二錢過咽即吐用礬者隔下涎也

碧霞丹 凡中風痰厥癰癩驚風痰涎上壅牙關緊閉上視搖搦並宜治之

烏頭尖

附子尖

蝎梢

各七個

石綠

研幾度飛過十兩

為末麵糊丸芡實大

每用一丸薄荷汁半盞化下更服溫酒半合須臾吐出痰涎為妙小

兒驚風加白僵蠶等分

庚生按此方惟實症中痰中風及夫人食閉小兒痰閉可用

石綠即銅綠

吐蠱

人頭面上有光他人手近之如火熾者此中蠱毒也

蒜汁

五錢

和酒服之當吐出如蛇形

倒頑痰法

治痰結胸中不能吐出狂言如見鬼狀時發時止氣塞胸膈

牛肉五斤水三斗煎湯飲之至不可食而止以鵝翎探吐必吐至黃色頑

痰而止若不吐出再飲之必以吐盡為度前病頓失後以陳皮茯苓甘草白朮湯徐徐飲之平復如故

庚生按此即倒倉法極妙極妥惟吐後須調攝得宜

陰陽湯 凡治上焦欲吐而不能吐者

滾水涼水各一碗加炒鹽一撮打百餘下起泡飲之立吐而愈

串樂主下瀉藥也

牛車串遇仙丹治邪熱上攻痰涎壅滯翻胃吐食十膈五噎酒積蟲積血積

氣積諸般痞積瘡熱腫痛或大小便不利婦人女子面色痿黃鬼胎癥瘕誤吞銅鐵銀物皆治之五更冷茶送下三錢天明可看所下之物此藥有疾去疾有蟲去蟲不傷元氣臟腑小兒減半孕婦忌服

白牽牛頭末四兩五錢炒半生白欖榔一箇陳五錢蓬朮五錢醋煮三稜五錢醋炙牙皂

五錢去皮炙

右藥為末醋糊為丸如菰豆大依前數服行後隨以溫粥補之忌食他物

柳霜串

必勝散

治遠年近患大麻風癩瘡三服即愈

大黃

錢五

積柳

錢五

白牽牛

錢五

粉霜

分五

各為細末分作三服用生薑四兩

絞汁入砂糖半酒盞水調勻於晚間臨睡腹中稍空卧床上服之至三更過身手足俱麻木如針刺頭目齒縫俱痛此藥尋病之功二便或青或白或黑或黃或紅蟲之類此乃病根也三十日內服藥三次漸痊眉毛鬚髮俱生肌膚如舊或齒縫出血漱齒藥列後

漱齒藥

貫仲

錢五

黃連

錢五

為末用水一鍾煎四五沸入冰片少許攪

勻漱口每日壹服煎漱忌食動風油膩之物一月即愈

黃甲串

偷力散

治橫痃便毒未成者內消已成者膿從大便下

大黃

錢二

白芷

錢二

穿山甲

錢二

煨存性為末每服三錢空心酒送下