

〔金〕 鑑洪 編

# 傷寒心要

中國醫學大成續集

## 傷寒心要提要

舊題都梁錙洪編。始末未詳。大旨敷衍劉完素之說。所列之方。凡十有八。又有病後四方。與常德傷寒心鏡。皆爲後人裒輯。附入河間六書之末者。茲撮拾殘篇。備供參考。

附河間傷寒心要

都梁 錫 洪 編

新安 吳勉學 校

傷寒心要論

夫傷寒者。前三日在表。法當汗。可用雙解散。連進數服。必愈。若不解者。病已傳變。後三日在裡。法當下。殊不知下之太早。則表乘虛入裡。遂成結胸。虛痞。懊憹。斑疹。發黃之証。輕者必危。危者必死。但當以平和之藥。宣散其表。和解其裡。病勢或有汗而未愈。或無汗而愈。當用二小柴胡。涼膈。天水三藥合

而服之。

病若半在表半在裡。法亦當和解。三小柴胡涼膈主之。

若裏熱微者。則當微下。四大柴胡合解毒湯主之。熱勢未退。又以大柴胡合三一承氣下之。兩除表裏之熱。病至七八日。裏證已甚。表熱漸微。脉雖浮數。則以三一承氣合解毒下之。

其病胸膈滿悶。或喘或嘔。陽脉緊甚者。七可用瓜蒌散涌之。

汗吐下三法之後。別無異証者。涼膈散調之。

病熱已去。微熱者。以益元散服之。無令再病。此傷寒治法之大要也。

或傷風自汗。脉浮緩者。雙解去麻黃以汗之。

其病半表半裏。十一白虎湯和解之。

病在裏。脉沉細者。無問風寒暑濕。或表裏証俱不見。或內外諸邪所傷。有汗無汗。心腹痛滿。譫語煩躁。畜熱內盛。但是脉沉者。並用十二承氣合解毒下之。

或中暑自汗。

解以白虎湯。

直格云。夏至前爲濕。夏

用白虎。宜乎局方云。立秋後不用白虎。子和云。若有白虎証。亦不用乎。却用。詳審之耳。

白虎解後。

以五苓合天水調之。多進數服。無妨。

或腹脹滿。脉沉者。

亦當承氣令解毒微下之。

或發汗之後。熱不解。脉尚浮者。

十六

白虎加蒼朮再

解之。

或裏熱內盛。陽厥極深。皆因失下而成此証。以致身冷。脉微。昏愒將死。切不得以寒藥下之。誤下即死。又一輩庸醫。妄言是陰厥。便欲易換。用玄武四逆溫熱之劑投之。下咽立死。殊不知此証。乃陰耗陽竭。陰氣極弱。謂之耗。陽厥極深。謂之竭。畜熱怫鬱將欲絕者。當此之証。寒劑熱劑俱不可投。但進涼膈解毒。十七以養陰退陽。宣散畜熱。脉氣漸生。得大汗而愈。有無

汗氣和而愈者。

未愈却解毒合承氣十八下之。次以解毒涼膈天水合而爲一。十九調和陰陽。洗滌臟腑。則其他別証自不生矣。

有大下之後。熱不退。再三下之。熱愈盛。若下之不愈。脈微。氣虛。力弱。不加以法。則無可生之理。若輟而不下。則邪熱極盛。陰氣極衰。脈自斷絕。必不可救。似此之証。是下之亦死。不下亦死。醫者到此。活人殺人。一彈指間。其不至手足失措者。幾希矣。直格云。傷寒汗後。汗出不解。或反不汗。脈尚浮。白虎加蒼朮湯再解之。又按餘論云。傷寒下後。自汗。虛熱不已。白虎加蒼朮。人參。一服如

神汗止身涼。此通仙之法也。如此則汗下之後熱不退。不問有汗無汗。宜白虎加蒼朮解之。又加入參。妙。仍服涼膈解毒調之。

經云。三下而熱不退者。即死。後人有四五次下。以十數行。而生者。此乃誤中耳。活者未一二死。者千百。後學切不可爲法。但當依前用解毒合涼膈調之。使陽熱徐退。陰脉漸生。庶不失人命。

若傷飲不散。成結胸之証。臨時擇用。大小陷胸湯丸累下之。脉浮者不可下。是表証未出。小柴胡合小陷胸湯。二十一。投之。脉雖浮而熱大極者。二十二。承氣徐徐疎利之。

或有留飲過度。濕熱內生。自利不止。其熱未退。二十三

解毒湯治之。

陽毒生斑。二十四涼膈加當歸。

佛鬱熱盛。在表燥而無汗。濕熱在裡。不能發於外。相

搏遂成發黃。二十五茵陳湯調五苓散。甚者二十六茵陳

合承氣下之。

煩心不得臥。二十七梔子湯。

誤下太早。遂成結胸。虛痞。二十八涼膈加枳殼桔梗。剛

柔二症。譫語發狂。踰垣赴井。皆陽熱極盛者。二十九承

氣合解毒下之。

汗下之後。煩渴飲水。則三十涼膈減桂五苓甘露益元。選而用之。小便不通。五苓泄之。大便閉結。承氣下之。更有外證。加減通聖散。方內隨證用藥。

婦人證治皆然。惟孕婦三四月并七八月不用硝。其餘月分用之無妨。

小兒減劑服之。

此中有古人治傷寒不傳之妙。後之學者。其慎寶之。

第一雙解散

防風通聖散

防風

去蘆

川芎

當歸

焙

赤芍藥

大黃

麻黃

連翹

芒硝

半兩

石膏

黃芩

去腐

桔梗

一兩

甘草

二兩

滑石

三兩

荊芥

白朮

梔子

二錢半

右爲散。每服三錢。水一盞。薑三片。煎六分。溫服。大黃芒硝麻黃三味對証。旋入自利。去大黃芒硝。自汗去麻黃。

天水散

益元

六一

滑石

六兩

甘草

一兩

右爲末。每服三錢。溫蜜水調。暑月冷水亦可和解。

傷寒傷風發汗。葱白五寸。豆豉五十粒。煎一盞。調四五錢。并三服。解利爲度。加薄荷尤妙。通聖合益元。

右七兩和勻。每服三錢。水一盞半。葱白五寸。豆豉五十粒。姜三片。煎一盞。溫服。

**第二**小柴胡涼膈天水合服。

小柴胡湯

北茈胡

三兩黃芩

人參

半夏

生薑

甘草

大棗

一兩

右爲散。每服五錢。

涼膈散

連翹 二兩 梔子

大黃

薄荷

黃芩 一兩 甘草

芒硝

右爲散。每服三錢。水一盞。煎七分。入蜜少許。竹葉五片。

第三 涼膈。合小茈胡。

第四 大柴胡。合黃連解毒湯。

大柴胡湯

柴胡 去苗

大黃 半兩

黃芩

白芍藥 一分

半夏 泡七次 二錢

枳實 生三錢

右爲散。分三服。水一盞半。生姜二片。大棗一枚。煎半。服。

黃連解毒湯

黃連

黃蘗

黃芩

梔子

等分

右爲散。每服一兩。水一盞。煎五分。溫服。

**第五** 大柴胡合三一承氣湯。

三一承氣湯

大黃

芒硝

厚朴

枳實

各半兩

甘草一兩

右剉。每服二錢半。水一大盞。姜三片。煎六分。入硝。

再煎一二沸。

第六承氣合解毒湯。

第七瓜蒂散。

瓜蒂

赤小豆

等分

右爲末。豆豉湯調下一錢。未吐再服。

第八涼膈散。

第九益元散。

風

第十雙解散。

第十一白虎湯。

知母

兩半

甘草

一兩

粳米

一合

石膏

四兩

右剉

每服

五錢

水一觔

煎六分

溫服

第十二

承氣合解毒湯

暑

第十三

白虎湯

第十四

五苓散合天水散

五苓散

猪苓

伏苓

三錢

官桂

一分

澤瀉

一兩

白朮

一錢

治人書

三分

宣明論

半錢

右細末

第十五 承氣合解毒湯。

第十六 白虎湯加蒼朮。

第十七 涼膈合解毒湯。

第十八 解毒合承氣湯。

第十九 解毒涼膈天水合。

結胸

第二十 大小陷胸湯丸。

大陷胸湯

大黃

芒硝 三錢 甘遂 三字七

右剉四錢水一觔煎大黃六分內消再煎一二沸。