

临床医学 多选题精选

南京医学院 编

江苏科学技术出版社

临床医学多选题精选

南京医学院 编

江苏科学技术出版社

临床医学多选题精选

南京医学院 编

出版: 江苏科学技术出版社

发行: 江苏省新华书店

印刷: 南京人民印刷厂

开本787×1092毫米 1/16 印张34 插页8 字数781,000

1985年12月第1版 1985年12月第1次印刷

印数1—9,720册

书号: 14196·211 定价: 6.00元

责任编辑 顾志伟

责任校对 左玉梅 张瑞云

前言

多选题(MCQ)考试方法是近四十年来逐渐发展起来的,与传统的考试方法相比,它具有考查知识覆盖面广、评分客观、简便等优点。我国卫生部自1982年起每年对部分高等医学院校毕业生试行统考也是采用这种方法。预计多选题考试方法将在医学领域中迅速推广。为了满足广大高等医学院校学生和教师的迫切需要,我院组织编写了《临床医学多选题精选》这本书。

本书由我院医学系28名有丰富临床和教学经验的人员对三年来的卫生部统考题和各高等医学院校自考题、自编题进行精心筛选而成。书中列有多选题6026道,为配合题意,内附X线片、心电图、同位素扫描和骨髓血液片共118幅。本书内容以各学科、专业和疾病分类顺序编排。多选题以1986年全国统编教材、教学大纲和卫生部颁发的统考命题范围

为依据,其中有一定比例的应用题,有△号者为超命题范围试题。本书不仅适于医学院校应届毕业生及临床医生中晋高复习,而且适于医学院校、教师教学参考。

参加本书编写人员的名单如下(以姓名笔划为序): 王明秀 王笑云 邓崇德 乐戎戎 冯善章 毕玉澄 李慧钧 李麟荪 吴幼章 吴晔良 吴翔 张文钦 陈家伟 林致华 周善仁 侯熙德 敖忠芳 袁耿清 徐建星 陶松年 黄元铸 黄汉斌 黄声达 黄跃文 黄锦成 常国钧 蔡耿秋 颜景芳

由于水平所限,无论内容或题型分布,难免有挂漏谬误之处,欢迎广大读者批评指正。

编者

1985年元月于南京医学院

多选题简介

多选题类型较多,常用的有四种类型:

一、A型多选题 又称最佳回答题。由一段简短的文字叙述和随后的五个备选答案组成。答案中只有一个是适当的,其余为干扰答案。例如:

12小时尿沉渣计数,红细胞的正常范围为:

- A. 0~10万个
- B. 0~20万个
- C. 0~25万个
- D. 0~50万个
- E. 0~100万个

二、B型多选题 又称配伍题。开头先列出五个用字母标明的备选答案,接着是几道用数字标明的试题。要求从答案中给每题一个最合适的答案。例如:

- A. 血氨升高
- B. 血清胃泌素升高
- C. 血清碱性磷酸酶活力明显升高
- D. 真性胃酸缺乏症
- E. 血清脂肪酶升高

- 1. 急性胰腺炎
- 2. 肝性昏迷

三、C型多选题 又称比较多选题。开头

先列出用四个字母标明的答案,随后是几个问题。要求为每题选配一个正确答案。例如:

- A. 降低前负荷
- B. 降低后负荷
- C. 同两者都有关
- D. 同两者都无关

- 1. 充血性心力衰竭用低盐饮食的依据是
- 2. 充血性心力衰竭用硝普钠的依据是

四、K型多选题 又称复合是否题。由一个主体和随后的四段叙述组成。不仅要求判定四种叙述中哪些与主体有关,而且要求判定哪些与主体无关,然后从五组选择中选出一组作为答案。答案用字母表示,其组合方式通常是:A—只有①、②、③是对的;B—只有①、③是对的;C—只有②、④是对的;D—只有④是对的;E—①、②、③、④都是对的。例如:

早期发现胃癌的有效方法是:

- ① 胃液细胞学检查
- ② 纤维胃镜检查
- ③ X线钡餐检查
- ④ 增量组胺胃液分析

答案A

目 录

第一章 内科学 1

- 第一节 消化系统..... 1
- 第二节 心血管系统.....50
- 第三节 呼吸系统.....94
- 第四节 泌尿系统..... 122
- 第五节 内分泌系统..... 141
- 第六节 造血系统..... 156
- 第七节 物理化学因素疾病..... 175

第二章 外科学 181

- 第一节 外科总论..... 181
- 第二节 普通外科..... 229
- 第三节 胸部外科..... 279
- 第四节 矫形外科..... 293
- 第五节 泌尿外科..... 315
- 第六节 神经外科..... 329

第三章 妇产科学 335

- 第一节 基础知识..... 335
- 第二节 生理产科..... 339
- 第三节 病理产科..... 347
- 第四节 妇科..... 373

第五节 计划生育..... 393

第四章 儿科学 396

- 第一节 儿科基础..... 396
- 第二节 新生儿..... 402
- 第三节 营养缺乏性疾病..... 411
- 第四节 消化系统..... 416
- 第五节 呼吸系统..... 423
- 第六节 泌尿系统..... 429
- 第七节 循环系统..... 434
- 第八节 血液系统..... 442
- 第九节 神经系统..... 447
- 第十节 传染病..... 450
- 第十一节 小儿结核病..... 454
- 第十二节 其他..... 461

第五章 传染病学 468

- 第一节 总论..... 468
- 第二节 各论..... 471

第六章 神经精神病学 503

- 第一节 神经病学..... 503
- 第二节 精神病学..... 515

第一章 内 科 学

第一节 消化系统

总论

【A型题】

1. 消化系统解剖生理概述中, 下列哪项有错误?
 - A. 食管下段有括约肌样生理功能
 - B. 胃底和胃体粘膜含大量腺体
 - C. 屈氏韧带是上、下胃肠道的分界点
 - D. 肝脏血流供应多数来自门静脉
 - E. 胰腺是只具有内分泌的腺体
2. 消化系统疾病下列概述, 哪项有错误?
 - A. 慢性胃炎分型中肥厚性胃炎较少见, 症状比较接近消化性溃疡
 - B. 原发性胆管细胞癌比肝细胞癌少见
 - C. 肝硬化失代偿期保肝治疗, 可用左旋多巴等
 - D. 原发性胆汁性肝硬化以女性多见
 - E. 肝性昏迷前驱症状主要是出现性格行为的改变
3. 消化系统疾病治疗中, 下列哪项错误?
 - A. 广谱抗生素可引起伪膜性肠炎
 - B. 幽门梗阻可因抗胆碱能药物减轻
 - C. 阿司匹林可加重消化性溃疡
 - D. 急性胰腺炎可用抑肽酶治疗
 - E. 苯巴比妥能起到利胆剂的作用
4. 有关消化系统疾病的论述中, 以下哪一项不对?
 - A. 慢性胃炎分为浅表性、萎缩性、肥大型, 而以肥大型少见
 - B. 与自身免疫反应有关的病如原发性胆汁性肝硬化、溃疡性结肠炎、萎缩性胃炎等
 - C. 消化性溃疡以十二指肠球部溃疡最多见, 最易引起上消化道出血
 - D. 在我国门脉肝硬化, 目前最多见的病因是病毒性肝炎
 - E. 原发性肝癌在我国以结节型、肝细胞型多见
5. 下列哪一疾病的上腹痛可采取左侧卧位缓解?
 - A. 消化性溃疡
 - B. 钩虫病
 - C. 慢性肥厚性胃炎
 - D. 胃粘膜脱垂症
 - E. 十二指肠炎
6. 下列哪一疾病, 餐后不适, 甚至呕吐, 可采取右侧卧位得到缓解?
 - A. 十二指肠球后溃疡
 - B. 肠系膜上动脉综合征
 - C. 胃粘膜脱垂症
 - D. 十二指肠炎
 - E. 幽门管溃疡
7. 中上腹持续性疼痛向背部放射, 平卧加剧是哪种病的特点?
 - A. 幽门梗阻
 - B. 食管裂孔疝
 - C. 胃穿孔
 - D. 肠梗阻
 - E. 胰体尾部癌
8. 上消化道出血最常见的病因是:
 - A. 胃溃疡
 - B. 十二指肠球部溃疡

C.胃癌

D.门脉高压食道胃底静脉曲张破裂

E.出血性胃炎

9.上消化道出血早期诊断最有效的方法是:

A.上消化道X线钡餐透视

B.内窥镜检查

C.棉线试验

D.胃液分析

E.大便潜血试验

10.上消化道出血如要判断出血部位,最好的检查方法是:

A.内窥镜检查

B.X线上消化道钡餐检查

C.胃液分析

D.棉线试验

E.腹腔血管造影

11.有关上消化道出血,下列说法哪项错误?

A.胃粘膜糜烂出血可以用冰盐水灌注

B.食管下端贲门粘膜撕裂出血首先止吐

C.门脉高压食道胃底静脉曲张破裂出血,可用脑垂体后叶素100单位加于10%葡萄糖250毫升中滴注

D.空肠近端淋巴瘤出血,不属于上消化道出血

E.门脉高压食管胃底静脉曲张破裂,应立即插三腔管压迫止血

12.有关上消化道出血,下述哪项有错误?

A.上消化道出血应包括胆道出血

B.青年人无症状上消化道出血,首先考虑沉默性溃疡

C.临床上上消化道出血呕血比黑便多见

D.水杨酸盐可引起急性胃粘膜糜烂出血

E.出血一般在60毫升以上可有柏油样便

13.上消化道大出血发生休克,首先采取,

A.头低脚高位,吸氧

B.立即急诊内窥镜以明确诊断

C.立即补充血容量

D.急诊手术治疗

E.冰盐水洗胃止血

14.有关黄疸概述,下列哪项说法有错误?

A.正常人血清胆红素浓度为0.5~1毫克%

B.服用过多的木瓜、南瓜可使胡萝卜素增高和皮肤发黄

C.服用大量阿的平也可使皮肤发黄

D.血清中胆红素超过3毫克%,黄疸指数在30单位以上,皮肤及巩膜即可出现黄疸

E.溶血性黄疸尿胆红素阴性尿胆原增加

15.有关黄疸的概述,下列哪项说法有错误?

A.应用大剂量阿托品可引起假性黄疸

B.蚕豆黄、恶性疟疾引起的黄疸是溶血性黄疸

C.溶血性黄疸往往网织细胞增多,红细胞脆性试验阳性

D.阻塞性黄疸大便中粪胆原粪胆素降低

E.十二指肠纤维镜胰胆管逆行造影对肝内、肝外阻塞性黄疸的鉴别有帮助

16.肝内、肝外阻塞性黄疸的鉴别哪项是错误的?

A.肝内阻塞性黄疸常肝脏明显肿大

B.肝外阻塞性黄疸常可触及肿大之胆囊

C.肝内阻塞性黄疸应用强的松试验治疗,黄疸消退明显

D.肝内阻塞性黄疸可以由严重感染引起

E.服用特殊药物引起的肝内郁胆可用苯巴比妥治疗

17.肝内与肝外阻塞性黄疸的鉴别哪项是对的?

- A. 肝外梗阻用皮质激素有显著疗效
 - B. 肝内郁胆常可触及胆囊
 - C. 肝内郁胆不会出现皮肤瘙痒
 - D. AKP、 γ -GTP 升高肯定可为肝外梗阻
 - E. 肝外梗阻凝血酶原时间延长, 注射维生素K可以纠正
18. 鉴别肝外阻塞性黄疸和肝细胞性黄疸, 下列哪项检查比较最有意义?
- A. 直接和间接胆红素定量
 - B. BSP排泄试验
 - C. 纸上蛋白电泳
 - D. 尿胆原测定
 - E. 总胆固醇与胆固醇酯测定
19. 阻塞性黄疸, 下列哪一项特征有错误?
- A. 以直接胆红素增高为主
 - B. 早期肝功能检查絮状试验即明显阳性
 - C. 血清胆固醇升高
 - D. 可以有出血倾向
 - E. 血浆免疫球蛋白可出现一种异常低密度脂蛋白
20. 阻塞性黄疸中, 下列哪种酶一般不增高?
- A. 胆碱脂酶
 - B. 谷酰转氨酶
 - C. 乳酸脱氢酶
 - D. 碱性磷酸酶
 - E. 亮氨酸氨基肽酶
21. 血清转氨酶的临床意义, 下列哪项最正确?
- A. 血清转氨酶升高表明有肝病存在
 - B. 血清转氨酶明显升高表明有急性病毒性肝炎存在
 - C. 为肝功损害的敏感指标
 - D. 欲了解肝功情况, GOT 比 GPT 好
 - E. 以上均不确切
22. 下消化道出血下列哪一种疾病最多见?
- A. 溃疡型肠结核
 - B. 溃疡性结肠炎

- C. 局限性回肠炎(Crohn病)
- D. 结肠憩室炎
- E. 结肠癌

【K型题】

23. 有关上消化道出血, 下列哪些说法对?

- ①应包括近端空肠部位出血
- ②急性出血时应用内窥镜检查是禁忌的
- ③出血量在 100 毫升以上方可有黑大便
- ④出血后尿素氮可以升高

24. 上消化道出血的估计, 以下哪一项正确?

- ①呕血为主多半在幽门前区病变为多
- ②出血在 5 毫升以上, 大便潜血可阳性
- ③出血大于 400 毫升/次, 可有急性失血表现
- ④柏油样大便提示出血量已在 50~60 毫升以上

25. 下列哪些药物易引起上消化道出血?

- ①消炎痛
- ②利血平
- ③强的松
- ④去氢胆酸

26. 以下哪种物质可使食管下端括约肌张力增高?

- ①盐酸
- ②胃蛋白酶
- ③碱性粘液
- ④胃泌素

27. APUD细胞

- ①包括产生消化道激素的细胞
- ②有摄取胺的特性
- ③也存在于支气管
- ④起源于神经嵴

28. 肝实质性黄疸和阻塞性黄疸, 两者的共同点是:

- ①血清AKP轻微升高
- ②胆红素尿
- ③应用皮质激素治疗均有显著疗效
- ④胆碱脂酶正常或低于正常

29. 肝实质性黄疸与溶血性黄疸, 两者的共

同点是:

- ①深褐色黄疸
- ②转氨酶升高
- ③血清内结合胆红素增高
- ④血清铁增高

³⁰.下列哪些疾病,作胃液分析时可发现病理性的胃酸分泌增多?

- ①胃泌素瘤(Zollinger-Ellison综合征)
- ②十二指肠球部溃疡
- ③空肠消化性溃疡
- ④恶性贫血

³¹.溶血性黄疸的实验室检查特征是:

- ①血清总胆红素增加
- ②凡登白试验是间接反应
- ③尿胆原、粪胆原均增加
- ④尿中胆红素增加

³².肝细胞性黄疸可有:

- ①5'-核苷酸酶活力明显增高
- ②血清铁/铜比值 >1.0
- ③乳酸脱氢酶(LDH)明显增高
- ④GPT明显升高

³³.梗阻性黄疸的实验室检查特征是:

- ①血清结合胆红素增加
- ②凡登白试验呈直接迅速反应
- ③尿胆原减少或消失
- ④粪胆原减少或消失

³⁴.以下的论述哪些是不对的?

- ①胃泌素能刺激壁细胞分泌盐酸,也能刺激主细胞分泌胃蛋白酶原
- ②肝有双重血流供应,1/4来自肝动脉,3/4来自门静脉
- ③除了胰腺外腮腺也能分泌淀粉酶
- ④鹅去氧胆酸可以治疗非胆固醇结石

胃炎、消化性溃疡

【A型题】

³⁵.急性单纯性胃炎的主要诊断依据是:

- A.病史及临床表现

B.X线钡餐检查

C.纤维胃镜检查

D.胃液分析

E.甲氰咪胍治疗有效

³⁶.下列降压药物中,哪种最易引起急性单纯性胃炎?

- A.胍苯哒嗪
- B.优降灵
- C.利血平
- D.胍乙啶
- E.可乐宁

³⁷.下列哪一种治疗对于急性单纯性胃炎说来是不必要的?

- A.短时间禁食
- B.应用抗生素静脉滴注
- C.有呕吐可适当补液
- D.应用解痉止痛药物
- E.应用制酸药物

³⁸.急性单纯性胃炎常见临床表现是:

- A.上腹剧痛、呕吐与腹泻
- B.恶心呕吐与上消化道出血
- C.上腹不适、呕吐、发热与失水
- D.食欲减退、上腹痛、白细胞增加
- E.上腹不适、疼痛、恶心呕吐与腹泻

³⁹.判断胃酸缺乏最可靠的指标是:

- A.平素从不反酸,喜欢吃酸醋
- B.空腹胃液中无游离盐酸
- C.空腹胃液 $\text{pH} \leq 7.0$
- D. $\text{BAO} = 0$
- E. $\text{MAO} = 0$

⁴⁰.以下哪种方法对慢性胃炎分型意义不大?

- A.X线钡餐上消化道检查
- B.纤维胃镜加活检
- C.血清胃泌素测定
- D.胃酸分泌功能试验
- E.壁细胞抗体检查

⁴¹.诊断慢性胃炎最可靠的依据是:

- A.大便潜血试验

- B.五肽胃泌素胃液分析
C.X线钡餐上消化道检查
D.胃脱落细胞检查
E.纤维胃镜加活组织检查
- 42.鉴别十二指肠炎与十二指肠溃疡主要依靠哪项检查?
A.大便隐血
B.血沉
C.胃液分析
D.X线钡餐上消化道检查
E.以上都不是
- 43.萎缩性胃炎有以下特点:
A.随年龄增长,发病率逐渐增加
B.一般难以完全复原
C.早期隐匿,疼痛不规则
D.病理改变粘膜层变薄,可有肠上皮化生
E.以上都对
- 44.慢性胃炎有以下特点:
A.临床上肥厚性胃炎治疗效果最佳
B.胃息肉多数是肥厚性胃炎发展而来
C.肥厚性胃炎最易发生恶性变
D.我国萎缩性胃炎以胃体胃炎多见
E.以上都不对
- 45.慢性萎缩性胃炎,以下哪项是不对的?
A.血清胃泌素可正常
B.不会引起恶性贫血
C.比胃体胃炎易发生癌变
D.多并发其他自身免疫性疾病
E.胃体炎症仅是灶性萎缩
- 46.慢性萎缩性胃炎手术指征首先考虑的是:
A.萎缩性胃体胃炎有肠上皮化生
B.萎缩性胃炎有两次上消化道出血
C.萎缩性胃炎加浅表性胃炎
D.萎缩性胃炎有肠上皮化生
E.萎缩性胃炎,活检有二级间变
- 47.慢性浅表性胃炎病理改变不包括哪项?
A.胃粘膜充血水肿
B.粘液增多
C.灶性或弥漫性出血、糜烂
D.腺体萎缩
E.白细胞浸润
- 48.仅见于萎缩性胃炎的粘膜变化为:
A.肠型化生
B.假幽门型化生
C.中性白细胞浸润
D.淋巴细胞浸润
E.以上均不是
- 49.有关慢性胃炎,下述概念哪一项不对?
A.萎缩性胃炎血清胃泌素增高,胃酸明显减低
B.胃粘膜病理改变出现肠上皮化生不能都诊断为萎缩性胃炎
C.浅表性胃炎可发展或合并萎缩性胃炎
D.肥厚性胃炎不易痊愈
E.萎缩性胃体胃炎可引起恶性贫血
- 50.慢性萎缩性胃炎,胃镜检查不包括哪项?
A.胃腺体萎缩,粘膜层变薄
B.粘膜色泽潮红,粘液多
C.粘膜下血管透见
D.肠上皮化生
E.假幽门腺化生
- 51.对慢性萎缩性胃炎的认识哪种观念不对?
A.胃窦胃炎较易发生胃癌
B.胃窦胃炎比胃体胃炎多见
C.胃窦胃炎胃泌素分泌增高,使胃酸分泌增高
D.胃窦胃炎较多有胃肠道症状,有时酷似消化性溃疡
E.胃体胃炎消化道症状少,较多出现缺铁性贫血
- 52.慢性萎缩性胃体胃炎,以下有关项目哪一个不对?
A.胃酸常无或显著减少

- B.血清胃泌素显著增高
C.维生素B₁₂吸收试验常有障碍
D.抗壁细胞抗体常为阳性
E.发病主要与胆汁反流有关
- 53.治疗胆汁反流胃炎有效的药物是:
A.普鲁本辛
B.654-2
C.胃复安
E.硫糖铝
D.丙谷胺
- 54.男性,52岁,上腹部嘈杂饱胀,食欲减退,偶有隐痛已二年余。RBC 340万/立方毫米,大便潜血(+),X线钡餐检查阴性,你认为下列哪一种病最可能?
A.胃癌
B.胃溃疡
C.胃粘膜脱垂症
D.慢性萎缩性胃炎
E.慢性胰腺炎
- 55.男性,55岁,三年来经常上腹不适,嘈杂嗝气,食欲差,比前消瘦。胃液分析:BAO为0,MAO为5毫克当量/小时,壁细胞数2亿,下列哪一种疾病可能性最大?
A.慢性肥厚性胃炎
B.慢性浅表性胃炎
C.慢性萎缩性胃炎
D.十二指肠炎
E.慢性胰腺炎
- 56.胃病者,有上腹痛,无规律性,食欲减退,伴舌炎舌萎缩和巨幼红细胞贫血,应考虑哪种疾病?
A.胃溃疡
B.胃癌
C.萎缩性胃炎
D.肥厚性胃炎
E.急性胃粘膜病变
- 57.女性60岁,近三年来上腹部嘈杂,食欲不振。近日作纤维胃镜,肉眼见胃粘膜普遍色泽淡,苍白,胃窦粘膜红白相间,以白相为主,粘膜菲薄,局部有结节样增生,你认为哪一种胃炎可能性大?
A.慢性肥大性胃炎
B.慢性萎缩性胃炎
C.慢性浅表性胃炎
D.慢性浅表性胃炎伴多发性息肉
E.以上都不是
- 58.48岁病人,近年来上腹部饱胀食少,X线钡餐检查阴性,胃镜检查,胃体粘膜苍白,粘液分泌少,有血管透见,选用下列哪项治疗较好?
A.甲氰咪胍
B.生胃酮
C.胃蛋白酶合剂加胃复安
D.胃复安加复方颠茄片
E.硫糖铝加普鲁本辛
- 59.男性,50岁,上腹不适嘈杂有时轻微不规则隐痛已有近10年,在5年前作过一次X线钡餐上消化道检查未见异常,最近又发作,为了明确诊断应作以下哪项检查最有价值?
A.胃液分析
B.血沉、大便潜血
C.X线全消化道检查
D.纤维胃镜检查
E.肝功能加B超查肝胆胰
- 60.男性,49岁,上腹隐痛已有三四年,饭后腹胀,嗝气,食欲差。患者一般情况尚可,测定BAO为0,用五肽胃泌素后MAO为10毫克当量/小时,胃肠造影见胃皱襞少以外,未见其他特异改变,首先应考虑的是:
A.胃癌
B.慢性浅表性胃炎
C.慢性肥厚性胃炎
D.慢性萎缩性胃炎
E.十二指肠球后溃疡
- 61.女性病人,近年来经常上腹部不适隐痛,

- 暖气反酸，近日作纤维胃镜见胃粘膜充血水肿潮红，粘液多，幽门口痉挛，作活检病理报告为：粘膜浅层有大量淋巴细胞及浆细胞浸润，诊断为何种病？
- 慢性浅表性胃炎
 - 慢性肥厚性胃炎
 - 慢性萎缩性胃炎
 - 急性胃粘膜糜烂
 - 十二指肠球部溃疡伴幽门梗阻
62. 女性36岁，昨晚曾暴饮暴食，今日上午起上腹部不适，隐痛，恶心，呕吐二次，大便三次呈水样便，不发热，肠鸣音亢进，在门诊查血淀粉酶200单位（索氏法），你考虑什么诊断？
- 急性胰腺炎
 - 消化性溃疡穿孔
 - 幽门梗阻
 - 急性菌痢
 - 急性胃肠炎
63. 44岁女性，近二三年来常觉上腹不适，偶有隐痛，胃镜诊断为萎缩性胃窦部胃炎，下列哪种药物治疗是不对的？
- 乙氧连氮
 - 生胃酮
 - 黄连素
 - 胃复安
 - 肾上腺皮质激素
64. 消化性溃疡的统计资料表明：
- 青壮年中胃溃疡高于十二指肠溃疡
 - 约有1/10的人口患过消化性溃疡
 - 世界各国间的发病率基本一致
 - 男女的发病率无明显差异
 - 以上都不对
65. 有关消化性溃疡论述，下述哪项有错误？
- 溃疡的直径一般小于2.5厘米
 - 夜间痛和背部痛最突出的是球后溃疡
 - 慢性穿孔最常见的部位是幽门管
 - 复合性溃疡一般球部溃疡先出现
 - 副交感神经会刺激胃窦部G细胞增加胃泌素分泌
66. 有关消化性溃疡的论述哪项有错误？
- 十二指肠球后溃疡是上消化道出血中最多见的一种病
 - 幽门管溃疡相对易引起梗阻，临床症状不典型
 - 胃泌素瘤属难治性溃疡
 - 十二指肠球部前壁溃疡最易急性穿孔
 - 胃溃疡发病机制中往往迷走神经功能是减退的
67. 有关消化性溃疡论述哪一项有错误？
- 胃窦部扩张可刺激胃窦部G细胞增加胃泌素分泌
 - 消化性溃疡多半溃疡的边缘不整齐
 - 十二指肠球部溃疡常有空腹痛
 - 十二指肠球部溃疡一般不会癌变
 - 慢性穿孔最常见的部位是十二指肠后壁
68. 消化性溃疡的临床特点以下哪一项不正确？
- 十二指肠球后溃疡症状较典型易愈合
 - 十二指肠球部溃疡最易引起上消化道出血
 - 胃溃疡可以癌变尤其是巨大溃疡
 - 胃溃疡一般发病年龄比球部溃疡要晚
 - 幽门管溃疡不少是穿透性且易引起梗阻
69. 壁细胞总数（PCM）与下述何种疾病的发生有密切关系？
- 胃溃疡
 - 十二指肠球部溃疡
 - 胃癌
 - 肥厚性胃炎
 - 反流性食管炎

70. 血清胃泌素增高伴胃酸增高见于:
- 萎缩性胃体胃炎
 - 萎缩性胃窦胃炎
 - 十二指肠球部溃疡
 - 胃泌素瘤 (Zollinger-Ellison 综合征)
 - 胰岛 β 细胞瘤
71. 哪一种物质不能溶解胃粘膜上皮细胞膜的脂蛋白?
- 酒精
 - 胆盐
 - 胰腺液
 - 水杨酸类药物
 - 硫酸多酯药物
72. 幽门梗阻最主要的临床特征是:
- 食后上腹胀痛
 - 呕吐大量发酵宿食
 - 上腹有蠕动波
 - 上腹有振水音
 - 严重失水征
73. 消化性溃疡最常见的并发症是哪一种?
- 上消化道出血
 - 急性穿孔
 - 幽门梗阻
 - 癌变
 - 慢性穿孔
74. 幽门部分梗阻最常见的病因是:
- 十二指肠球部溃疡
 - 胃窦部肿瘤
 - 幽门管溃疡
 - 胃粘膜脱垂
 - 肠系膜上动脉综合征
75. 复合性溃疡一般认为发生的原理是:
- 先有胃溃疡, 引起幽门括约肌功能不全, 导致十二指肠溃疡
 - 先有十二指肠溃疡, 引起胃窦部滞留, 继而引起胃溃疡
 - 两者同时出现
 - 无一定规律
 - 先有胃炎, 再出现两个部位的溃疡
76. 关于幽门管部溃疡的特点, 不正确的是:
- 易发生幽门梗阻
 - 慢性穿孔
 - 疼痛有明显节律性
 - 制酸药疗效不显
 - 属难治性溃疡
77. 胃泌素瘤下述哪一项化验对诊断最有帮助?
- BAO/MAO
 - 胰泌素
 - 血清胰岛素
 - 血清高血糖素
 - 血清钾
78. 有关幽门梗阻的说法, 下列哪一项不正确?
- 以幽门窦癌肿最常见
 - 临床上主要表现为呕吐大量宿食
 - 呕吐后腹痛可以减轻
 - 可以应用灭吐灵治疗
 - 禁食、补液观察 5~7 天, 无效可考虑外科治疗
79. 消化性溃疡, 慢性穿孔多见于:
- 胃前壁溃疡
 - 胃后壁溃疡
 - 球前壁溃疡
 - 球后壁溃疡
 - 球后溃疡
80. X线钡餐检查发现胃溃疡, 下列哪种情况有恶变可能?
- 合并十二指肠球部炎症
 - 多发性胃溃疡
 - 溃疡龛影直径超过 2.5 厘米
 - 合并出血
 - 溃疡位于胃小弯
81. 胃泌素瘤最好发生在下列哪一种部位?
- 十二指肠球部
 - 胃窦部
 - 空肠

D. 回盲部

E. 胰腺

82. 消化性溃疡患者出现哪种情况需要紧急手术治疗?

- A. 有两次出血史, 近日又出现柏油样便
- B. 年龄较大, 病程长, 近日疼痛明显者
- C. 合并幽门部分梗阻已两天
- D. 胃小弯溃疡, 最近又有胃体胃炎
- E. 大出血停止一天后, 又有大量出血

83. 以下哪种疾病对消化性溃疡的发生关系不大?

- A. 肺气肿
- B. 肠结核
- C. 肝硬化
- D. 甲状旁腺功能亢进
- E. 类风湿性关节炎

84. 消化性溃疡, 夜间痛最突出的是:

- A. 胃溃疡
- B. 球部溃疡
- C. 球后溃疡
- D. 幽门管溃疡
- E. 溃疡癌变

85. 哪一类胃病的壁细胞总数增多最显著?

- A. 幽门管恶性肿瘤
- B. 十二指肠球部溃疡
- C. 十二指肠球后溃疡
- D. 胃泌素瘤
- E. 复合性溃疡

86. 十二指肠溃疡的发病机理中, 最主要的因素是:

- A. 胆汁反流
- B. 阿司匹林、皮质激素等药物的作用
- C. 胃酸及胃蛋白酶
- D. 酒精
- E. 长期食用粗纤维素

87. 应激性溃疡最好的诊断方法是:

- A. 大便潜血试验
- B. 胃液分析
- C. X线钡餐上消化道检查

D. 胃镜检查

E. 腹腔血管造影

88. 应激性溃疡临床特征, 以下哪项不对?

- A. 男性明显多于女性
- B. 各年龄皆可发生
- C. 发病前常缺少胃肠道症状
- D. 死亡率很高
- E. 突然发生呕血、黑便或穿孔

89. 应激性溃疡的论述以下哪一项不对?

- A. 又称为急性胃粘膜病变
- B. 本病系上消化道出血常见病因之一
- C. 本病可以出现粘膜糜烂至坏死的病理变化
- D. 烧伤引起的溃疡称为Curling溃疡
- E. 抗代谢药物在药物中最易引起本病

90. 胃良性溃疡与恶性溃疡的鉴别以下哪项有错误?

- A. 恶性溃疡多见于中年以上
- B. 恶性溃疡病史较短, 周期间歇不明显
- C. 良性溃疡龛影位于胃腔轮廓之内
- D. 恶性溃疡胃液检查缺酸者较多
- E. 恶性溃疡大便潜血可持续阳性

91. 氢离子回渗到胃粘膜后, 不会引起下列哪项改变:

- A. 组织胺释放
- B. 胃蛋白酶分泌增加
- C. 胃泌素分泌增加
- D. 胃粘膜糜烂
- E. 胃粘膜局部瘀血

92. 难治性溃疡是指:

- A. 反复出血的溃疡
- B. 应激性溃疡
- C. 复合性溃疡
- D. 症状明显的溃疡
- E. 经内科认真治疗 6~8 周症状无好转, 溃疡犹存或恶化者

93. 胃溃疡发病有关的因素, 下列哪一项是错的?

- A. 胃粘膜屏障受损

- B.迷走神经功能亢进
C.氢离子回渗
D.十二指肠液反流
E.胃窦部滞留
- 94.疑有胃泌素瘤时,应查下列哪项来确诊?
A.胃液pH值
B.血清胰岛素测定
C.血清升血糖素测定
D.胃肠道X线钡餐检查
E.增大组织胺试验及胃壁细胞总数测定
- 95.胃粘膜屏障最主要的是:
A.胃粘膜上皮细胞
B.胃粘膜上皮细胞的更新
C.胃粘膜上皮细胞的脂蛋白层
D.覆盖于胃壁表面的胃粘液
E.胃粘膜的血液供应
- 96.甲氰咪胍治疗十二指肠溃疡的机制是:
A.使胃粘液分泌增多
B.中和胃酸
C.解痉抑制分泌
D.抑制H₂受体作用
E.抑制胃泌素分泌
- 97.青光眼又有胃小弯溃疡的病人,治疗胃溃疡时不宜选用:
A.普鲁本辛
B.铋制剂
C.胃复安
D.硫糖铝
E.硫酸支链淀粉
- 98.对于十二指肠溃疡的治疗,最重要的是:
A.少食多餐
B.制止胃酸
C.保护粘膜
D.中枢镇静
E.防止胆汁反流
- 99.消化性溃疡长期服用大量氢氧化铝,可以导致:
A.低钾性碱中毒
B.代谢性碱中毒
C.肌无力、骨质吸收和高尿钙
D.高血钙和肾功能衰竭
E.以上均是
- 100.应用抗胆碱能药物的主要适应证是:
A.幽门梗阻
B.反流性食管炎
C.近期溃疡出血
D.十二指肠球部溃疡
E.贲门失弛缓症
- 101.抑制胃蛋白酶,促进胃粘膜细胞更新和粘膜愈合,防止氢离子回渗,促进粘液分泌的药物是:
A.氢氧化铝胶
B.生胃酮
C.胃复安
D.丙谷胺
E.甲氰咪胍
- 102.治疗消化性溃疡药物的作用机制,哪种是错误的?
A.丙谷胺——阻滞胃泌素受体
B.生胃酮——增强胃粘膜屏障
C.普鲁本辛——抗胆碱能神经
D.甲氰咪胍——抗组织胺H₂受体
E.硫糖铝——中和胃酸
- 103.丙谷胺治疗下列什么疾病为好?
A.幽门梗阻
B.消化性溃疡
C.萎缩性胃炎
D.浅表性胃炎
E.应激性溃疡
- 104.胃溃疡伴高血压,不宜用下列哪一种药?
A.生胃酮
B.胃复安
C.硫糖铝
D.复方胃舒平
E.以上四种药都可用
- 105.抗胆碱能药物用于治疗十二指肠溃疡的服用时间应是:

- A.进餐时
B.餐前1~2小时及睡前
C.餐前1/2~1小时及睡前
D.餐后1/2~1小时及睡前
E.餐后1~2小时及睡前
- 106.应用制酸剂治疗消化性溃疡,每次服药时间易在:
A.清晨及每餐后二小时
B.每餐后一小时及睡前
C.每餐前一小时及睡前
D.每餐后即服
E.清晨及餐前半小时
- 107.十二指肠球部溃疡病人,嗝气、反酸明显,大便干结,两三天大便一次,用哪种药好?
A.碳酸氢钠
B.氢氧化铝
C.碳酸钙
D.硫糖铝
E.氧化镁
- 108.男性,38岁,上腹痛病史已有8年,每年秋末冬初发病,多在夜间痛,向背部放射,曾多次排柏油样便。查体:上腹正中偏右有压痛。钡餐:胃和十二指肠球部未见异常,诊断最可能是:
A.慢性浅表性胃炎
B.慢性萎缩性胃炎
C.肾神经官能症
D.十二指肠球后溃疡
E.十二指肠球炎
- 109.女性,46岁,有餐后上腹疼痛史10年,15年前发现胆囊结石,3年来偶发心绞痛,停经两个月,2小时前突然中上腹剧痛。就诊时急性病容,皮肤苍白,四肢厥冷,脉细速,血压9300/6600Pa(70/50毫米汞柱),心率140次/分,全腹有明显肌卫及反跳痛,肝浊音界消失,移动性浊音可疑,应首先考虑的诊断是:
A.急性心肌梗塞
B.出血性胰腺炎
C.化脓性胆囊炎穿孔
D.消化性溃疡穿孔
E.宫外孕破裂出血
- 110.男性,35岁,平素身体健康,近日解柏油样大便两次,除头晕心悸外无特殊症状及体征,首先考虑什么病?
A.急性胃炎
B.应激性溃疡
C.消化性溃疡
D.门脉高压食道胃底静脉曲张破裂
E.胃癌
- 111.男性,67岁,平素血压偏高,今晨上厕所突然倒地,人事不省,右侧肢体瘫痪。来急诊时又呕吐咖啡色血液300毫升,除诊断脑血管意外,尚有:
A.食管贲门粘膜撕裂综合征
B.急性胃内血管瘤破裂
C.胃癌
D.沉默性溃疡
E.应激性溃疡
- 112.男性,40岁,早餐后有便意,上厕所突然晕倒,面色苍白,出冷汗,送急诊室。查体:神志清,心肺无异常,腹软,肝脾未扪及,肠鸣音亢进,BP9300/6600Pa(70/50毫米汞柱),脉搏120次, Hb12克,白细胞正常,最可能是:
A.低血糖反应
B.感染性休克
C.心源性休克
D.一时性晕厥
E.上消化道出血伴休克
- 113.男性,30岁,以往无明确器质性疾病,但有过两次柏油样大便史,一小时前突然上腹剧痛伴恶心,无排便排气,半小时后腹痛转向右下腹,并向右肩放射。查体:全腹压痛,有肌卫及反跳痛,无腹块,WBC18000/立方毫米,最可能诊断的是: