

考研数学常见题型解析及 模 拟 试 题

(第 4 版)

主 编 王寿生
王寿生 李云珠
符丽珍 赵选民 编

西北工业大学出版社

【内容简介】 本书是为报考硕士研究生的考生编写的数学考试复习指导用书。全书分为高等数学、线性代数、概率论与数理统计初步、考研模拟试题等四篇。

本书有三个特点:(1)对研究生入学数学考试大纲作了比较详细而简明的诠释;(2)介绍了各学科专业研究生入学数学考试试题常见题型的众多解题方法与技巧;(3)根据2000年新大纲和近几年考研命题走向编制了10套模拟试题。各章后均附有练习题与答案。书末附有“2001年和2002年全国攻读硕士学位研究生入学考试数学试题与答案”。这些都有助于提高考生的应试能力,有利于读者提高分析综合和灵活运用的能力。

本书供报考理工科、经济类研究生的考生复习应试之用,也可供大专院校的学生及有志于自学高等数学、线性代数、概率论与数理统计的读者和大专院校教师阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

考研数学常见题型解析及模拟试题/王寿生主编. —4版. —西安:西北工业大学出版社, 2002.3

ISBN 7-5612-0958-4

I. 考... II. 王... III. 高等数学—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. 013

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 010596 号

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路127号,邮编710072 电话:(029) 8493844

网 址:<http://www.nwpup.com>

印刷者:陕西省高陵县印刷厂

开 本:787 mm×1092 mm

印 张:32.625

字 数:796千字

版 次:1996年7月 第1版 2002年3月第4版第5次印刷

印 数:26 001~31 000册

定 价:35.00元

第4版前言



本书自1996年首版推出以来,受到了广大读者的好评和欢迎,并于1997年修订推出了第2版,2000年又修订推出了第3版。根据读者需求曾多次重印发行。为了使报考研究生的读者能更好地把握国家教育部最新考试大纲的要求,提高全面复习数学的效率和应考能力,经过2000年和2001年对考生考前的指导经验的分析和研究,我们对本书进行了再一次的修订。这次修订的主要内容有:

1. 根据中华人民共和国教育部制订颁布的《2000年全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲》,重写了各章的考试内容。

2. 根据《2000年全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲》以及教育部“2001年全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲的说明”的精神,对“关于考试大纲的若干简明诠释”进行了改写和充实,使现在的这部分内容又符合新考试大纲的要求,更有利于报考研究生的读者把握新考试大纲的精神实质。

3. 对“若干常见题型的例题分析”作了比较大的调整,增加了新的题型,特别增加了近几年研究生考试的若干试题,这对报考研究生的读者了解研究生入学考试的命题规律,提高解题和应试能力无疑是有帮助的。

本书由王寿生(修订编写第一章至第四章)、李云珠(修订编写第五章至第八章)、符丽珍(修订编写第九章至第十四章)、赵选民(修订编写第十五章至第十八章)分工修订编写,王寿生任主编,编者按篇章顺序署名。

由于水平所限,书中难免疏误,欢迎读者批评指正。

编者

2002年2月于西北工业大学

前 言



为了使报考研究生的考生能在较短时间内高效率地对数学进行全面复习,提高应考能力,我们按照国家教委制订的 1997 年全国工学、经济学硕士和 MBA 研究生入学考试《数学考试大纲》的精神,并结合编者多年来指导复习数学的实验经验,编写了本书。

本书由高等数学、线性代数、概率论与数理统计初步、模拟试题四部分组成。前三部分中,编者对考试大纲所要求的内容作了简明扼要的诠释,并对考研试题中的常见题型进行了例题分析。这样既可以帮助读者对考试大纲规定的内容,特别对重点和难点的内容有一个系统而明晰的了解;也可以帮助读者了解解题的规律,掌握解题的方法与技巧,提高解题能力。第四部分,我们共编排了 8 套试题,其中数学一 8 套,数学三和数学四各 1 套,每套题中各部分所占的比例及题型结构均按照考试大纲的要求编排,题目的内容基本上覆盖了考试大纲的要求,且既有基本题,也有一定数量较难的题。通过演练这些试题,无疑可以提高考生的解题应试能力,也可了解国内研究生入学考试的命题结构和动向。

本书可作为考研应试者的复习用书,也可作为正在学习高等数学、线性代数、概率论与数理统计的辅导读物。此外,还可供讲授有关课程的教师及工程技术人员参考。

本书由王寿生(编写第一章至第四章)、李云珠(编写第五章至第八章)、符丽珍(编写第九章至第十四章)、赵选民(编写第十五章至十八章)分工编写,王寿生任主编,编者按篇章顺序署名。模拟试题是先由各编者分别拟题,然后共同讨论确定。

由于水平所限,书中疏误之处,恳请读者指教。

编 者

1996 年 5 月于西北工业大学

目 录

第一篇 高等数学

第一章 函数、极限、连续	1
第一节 函数	1
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	1
1.2 若干常见题型的例题分析	3
第二节 极限	5
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	5
2.2 若干常见题型的例题分析	7
第三节 连续	14
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	14
3.2 若干常见题型的例题分析	15
练习题与答案	17
第二章 一元函数的微分学	21
第一节 导数与微分	21
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	21
1.2 若干常见题型的例题分析	24
第二节 中值定理	31
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	31
2.2 若干常见题型的例题分析	32
第三节 导数在研究函数性态上的应用	40
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	40
3.2 若干常见题型的例题分析	41
练习题与答案	49
第三章 一元函数的积分学	52
第一节 不定积分	52
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	52
1.2 若干常见题型的例题分析	53
第二节 定积分	63

2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	63
2.2 若干常见题型的例题分析	65
第三节 广义积分	76
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	76
3.2 若干常见题型的例题分析	79
第四节 定积分的应用	82
4.1 关于考试大纲的若干简明诠释	82
4.2 若干常见题型的例题分析	85
练习题与答案	93
第四章 向量代数与空间解析几何	97
第一节 向量代数	97
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	97
1.2 若干常见题型的例题分析	98
第二节 空间解析几何	101
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	101
2.2 若干常见题型的例题分析	104
练习题与答案	109
第五章 多元函数的微分学	112
第一节 多元函数的基本概念	112
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	112
1.2 若干常见题型的例题分析	113
第二节 多元函数微分法	115
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	115
2.2 若干常见题型的例题分析	118
第三节 多元函数微分学在几何上的应用	125
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	125
3.2 若干常见题型的例题分析	126
第四节 多元函数的极值与最值	129
4.1 关于考试大纲的若干简明诠释	129
4.2 若干常见题型的例题分析	130
练习题与答案	136
第六章 多元函数的积分学	139
第一节 重积分	139
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	139
1.2 若干常见题型的例题分析	142
第二节 曲线积分	149

2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	149
2.2 若干常见题型的例题分析	151
第三节 曲面积分	158
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	158
3.2 若干常见题型的例题分析	160
第四节 重积分与线、面积分的应用	167
4.1 关于考试大纲的若干简明诠释	167
4.2 若干常见题型的例题分析	169
练习题与答案	174
第七章 无穷级数	177
第一节 常数项级数	177
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	177
1.2 若干常见题型的例题分析	178
第二节 幂级数	184
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	184
2.2 若干常见题型的例题分析	185
第三节 傅里叶级数	191
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	191
3.2 若干常见题型的例题分析	192
练习题与答案	196
第八章 微分方程	201
第一节 一阶微分方程	201
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	201
1.2 若干常见题型的例题分析	202
第二节 可降阶的高阶微分方程	208
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	208
2.2 若干常见题型的例题分析	208
第三节 高阶线性微分方程	210
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	210
3.2 若干常见题型的例题分析	212
第四节 微分方程的应用	215
4.1 关于考试大纲的若干简明诠释	215
4.2 若干常见题型的例题分析	216
第五节 差分方程初步	222
5.1 关于考试大纲的若干简明诠释	222
5.2 若干常见题型的例题分析	223
练习题与答案	225

第二篇 线性代数

第九章 行列式	229
0.1 关于考试大纲的若干简明诠释	229
0.2 若干常见题型的例题分析	230
练习题与答案	235
第十章 矩阵	238
第一节 矩阵的运算	238
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	238
1.2 若干常见题型的例题分析	239
第二节 矩阵的逆	241
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	241
2.2 若干常见题型的例题分析	242
第三节 初等变换与矩阵的秩	245
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	245
3.2 若干常见题型的例题分析	246
练习题与答案	250
第十章 向量	254
第一节 向量组的线性相关性	254
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	254
1.2 若干常见题型的例题分析	254
第二节 向量组的极大线性无关组与向量组的秩	258
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	258
2.2 若干常见题型的例题分析	259
第三节 向量空间	262
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	262
3.2 若干常见题型的例题分析	263
第四节 正交向量组与正交矩阵	265
4.1 关于考试大纲的若干简明诠释	265
4.2 若干常见题型的例题分析	266
练习题与答案	267
第十二章 线性方程组	270
第一节 克莱姆法则	270
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	270

1.2 常见题型的例题分析	270
第二节 齐次线性方程组	271
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	271
2.2 若干常见题型的例题分析	271
第三节 非齐次线性方程组	275
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	275
3.2 若干常见题型的例题分析	276
练习题与答案	281
第十三章 矩阵的特征值和特征向量	286
第一节 矩阵的特征值和特征向量	286
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	286
1.2 若干常见题型的例题分析	286
第二节 相似矩阵	292
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	292
2.2 若干常见题型的例题分析	293
第三节 实对称矩阵的相似对角矩阵	296
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	296
3.2 若干常见题型的例题分析	297
练习题与答案	300
第十四章 二次型	303
第一节 二次型及其矩阵表示	303
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	303
1.2 若干常见题型的例题分析	303
第二节 二次型的标准形	304
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	304
2.2 若干常见题型的例题分析	305
第三节 正定二次型与正定矩阵	307
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	307
3.2 若干常见题型的例题分析	307
练习题与答案	312
线性代数小结	314

第三篇 概率论与数理统计初步

第十五章 随机事件及其概率	315
第一节 随机事件及其运算	315

1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	315
1.2 若干常见题型的例题分析	316
第二节 概率的定义及其性质	317
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	317
2.2 若干常见题型的例题分析	318
第三节 条件概率与统计独立性	323
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	323
3.2 若干常见题型的例题分析	324
练习题与答案	330
第十六章 随机变量及其概率分布	337
第一节 随机变量及其概率分布	337
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	337
1.2 若干常见题型的例题分析	341
第二节 二维随机变量及其概率分布	348
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	348
2.2 若干常见题型的例题分析	353
练习题与答案	364
第十七章 随机变量的数字特征与极限定理	375
第一节 随机变量的数字特征	375
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	375
1.2 若干常见题型的例题分析	377
第二节 大数定律与中心极限定理	385
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	385
2.2 若干常见题型的例题分析	386
练习题与答案	391
第十八章 数理统计	400
第一节 数理统计的基本概念	400
1.1 关于考试大纲的若干简明诠释	400
1.2 若干常见题型的例题分析	403
第二节 参数估计	408
2.1 关于考试大纲的若干简明诠释	408
2.2 若干常见题型的例题分析	412
第三节 假设检验	422
3.1 关于考试大纲的若干简明诠释	422
3.2 若干常见题型的例题分析	424
练习题与答案	428

第四篇 模拟试题

数学一 模拟试题及解答	437
第1套题	437
第1套题解答	439
第2套题	441
第2套题解答	443
第3套题	446
第3套题解答	448
第4套题	452
第4套题解答	454
第5套题	456
第5套题解答	458
第6套题	462
第6套题解答	464
第7套题	467
第7套题解答	469
第8套题	472
第8套题解答	474
数学三 模拟试题及解答	477
模拟试题	477
模拟试题解答	479
数学四 模拟试题及解答	482
模拟试题	482
模拟试题解答	484
附录	487
一、2001年全国攻读硕士学位研究生入学考试数学试题及答案	487
二、2002年全国攻读硕士学位研究生入学考试数学试题及答案	498

第一篇 高等数学

第一章 函数、极限、连续

考试内容 函数的概念及表示法 函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性 复合函数、反函数、分段函数和隐函数 基本初等函数的性质及其图形 初等函数 简单应用问题的函数关系的建立 数列极限与函数极限的定义及它们的性质 函数的左极限与右极限 无穷小和无穷大的概念及其关系 无穷小的性质及无穷小的比较 极限的四则运算 极限存在的两个准则：单调有界准则和夹逼准则 两个重要极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ 函数连续的概念 函数间断点的类型 初等函数的连续性 闭区间上连续函数的性质（有界性、最大值、最小值定理和介值定理）

第一节 函 数

1.1 关于考试大纲的若干简明诠释

1. 函数概念是数学中最重要的基本概念之一，也是高等数学主要的研究对象。应当理解函数的概念，掌握函数的表示方法，会建立简单应用问题中的函数关系式。

2. 关于函数概念要注意以下几点：

1) 函数概念的本质特征，是确定函数的两个要素：定义域和对应法则。定义域是自变量和因变量能相互联系构成函数关系的条件，无此条件，函数就无意义了。对应法则是正确理解函数概念的关键。函数关系不同于一般的依赖关系，“ y 是 x 的函数”并不意味着 y 随 x 的变化而变化。函数关系也不同于因果关系。例如一昼夜的气温变化与时间变化是函数关系，但时间变化并不是气温变化的实际原因。

2) 表示函数对应法则的记号 $f(\)$ 有着广泛的涵义，不要认为它只表示某个数学表达式。只要是对应法则，就可以用它来表示。它可以表示一个或几个数学表达式，也可以表示一个图形、一张表格。

3) 根据实际问题建立起来的函数 $y = f(x)$ 的定义域往往与它的自然定义域不完全一致。一个函数的定义域可以是一个区间，也可以是几个区间，甚至可以是一些离散的数。例如函数 $y = \sqrt{\sin x - 1}$ 的定义域是一些离散的数： $\frac{\pi}{2} + 2k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 。

4) 两个函数,当其定义域相同,对应法则一样(即对定义域中每一个值都对应着相同的函数值)时,那么这两个函数是相等的或相同的.

3. 了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性,这里指出以下几个问题:

1) 并不是函数都具有这些特性,而是在研究函数时,常要研究函数是否具有这些特性.

2) 函数是否“有界”或“单调”,与所论的区间是有关系的.

3) 具有奇、偶性的函数的定义域关于原点对称的. 如果 $f(x)$ 是奇函数,则 $f(0) = 0$. 存在着既是奇函数,又是偶函数的函数: $f(x) = 0$. $f(x) + f(-x) = 0$ 是判别 $f(x)$ 为奇函数的有效方法.

4) 周期函数的周期通常是指其最小正周期,但不是任何周期函数都有最小正周期.

4. 理解复合函数的概念,会将几个相关联的函数正确地复合成一个复合函数;反过来,也会将一个比较复杂的函数分解成几个相关联的简单函数的复合. 应注意的是:

1) 函数的复合是有条件的,并不是任何几个函数都可以复合成一个复合函数.

2) 一个函数是否为复合函数与该函数的对应法则的表示方法有关. 例如函数 $y = 1$ 和 $y = \sin^2 x + \cos^2 x$ 的对应法则相同,但对应法则的表示方法是不相同的,前者不是复合函数,后者可以看成是由 $y = u^2 + v^2$, $u = \sin x$, $v = \cos x$ 复合而成的复合函数.

3) 复合函数的顺序是不能交换的. 例如设 $f(x) = \sqrt{1+x}$, $\varphi(x) = x^2 + 5$, 则 $f[\varphi(x)] = \sqrt{1+(x^2+5)} = \sqrt{x^2+6}$, $\varphi[f(x)] = (\sqrt{1+x})^2 + 5 = x+6$, $f[\varphi(x)] \neq \varphi[f(x)]$.

5. 了解反函数的概念. 设 $x = \varphi(y)$ 是函数 $y = f(x)$ 的反函数,因为它们是变量 x 与 y 之间的同一个方程,所以在同一坐标面上它们有同一个图形. 但习惯上常把自变量记为 x , 因变量记为 y , 也即常把函数 $y = f(x)$ 的反函数记作 $y = \varphi(x)$, 这时,函数 $y = f(x)$ 与它的反函数 $y = \varphi(x)$ 的图形就与直线 $y = x$ 对称. 但应当注意,当变量 x 与 y 有特定的实际意义时, $y = f(x)$ 的反函数就不能记作 $y = \varphi(x)$. 例如 $c = 2\pi R$, 其中 c 表示圆周的长, R 表示圆的半径,这时反函数只能写成 $R = \frac{c}{2\pi}$, 不能写成 $c = \frac{R}{2\pi}$.

6. 理解分段函数的概念,不能因为它在不同的区间由不同的表达式来表示而误认为是几个函数. 此外,对分段函数求函数值时,要注意自变量所在的区间,自变量在哪个区间就要从该区间的表达式中去计算.

分段函数往往不是初等函数,因为它没有用一个数学式子来表示. 但不能说分段函数都不是初等函数,例如 $y = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ 是分段函数,也是初等函数,因为它可以用一个数学式子 $y = \sqrt{x^2}$ 表示.

7. 在自然科学和工程技术中,最常见的函数是初等函数. 初等函数是由常数与基本初等函数经过有限次的有理运算与有限次的复合所产生且能用一个解析式表出的函数. 应掌握基本初等函数的性质及其图形.

初等函数可分为代数函数与超越函数两类. 任何一个函数 $y = f(x)$ 如果满足形如 $p_0(x)y^n + p_1(x)y^{n-1} + \cdots + p_n(x) = 0$ 的代数方程,其中 $p_0(x), p_1(x), \cdots, p_n(x)$ 均为多项式,称为代数函数. 可以证明,有理整函数(多项式)、有理分函数(二多项式之商)及无理函数(除含加、减、乘、除外,还含有根式运算)都是代数函数. 如果一个函数不是代数函数,就称为

超越函数. 例如指数函数 $y = a^x$, $y = a^{x^3-3x+1}$, 对数函数 $y = \ln x$, $y = \ln(\sqrt{x^2+1}+1)$, 三角函数 $y = \sin x$, $y = \tan(2x+1)$, 反三角函数 $y = \arcsin x$, $y = \arctan \sqrt{1-x}$ 等都是超越函数.

8. 非初等函数是指除初等函数以外的函数, 通常有如下的形式:

$$1) \text{ 通过多个式子表示, 例如符号函数 } y = \operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

2) 通过无穷级数表示, 例如

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3 \cdot 3!} + \frac{x^5}{5 \cdot 5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1) \cdot (2n+1)!} + \cdots$$

3) 通过积分表示的函数, 例如 $f(x) = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt$ ($x > 0$), 等等.

9. 几类常见的经济函数. 在生产和经营活动中, 成本、收入、利润关于产品的产量或销量 x 的函数关系分别称为总成本函数, 记为 $C(x)$; 总收入函数, 记为 $R(x)$; 总利润函数, 记为 $L(x)$. 一般说来, $C(x) = \text{固定成本} + \text{可变成本}$; $R(x) = px$, 其中 p 为产品的销售单价, x 为销量; $L(x) = R(x) - C(x)$. 商品的市场需求量和市场供给量相对商品价格 p 的函数关系, 分别称为商品的需求函数 $Q(p)$ 和供给函数 $M(p)$. 经济活动中的均衡价格是指使商品需求量等于供应量的价格.

10. 复合函数与分段函数是本节的重点, 也是考试的热点.

1.2 若干常见题型的例题分析

例1 设 $f(x)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 试求 $f(x+a) + f(x-a)$ 的定义域 ($a > 0$).

解 由 $f(x)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 得 $\begin{cases} 0 \leq x+a \leq 1, \\ 0 \leq x-a \leq 1, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} -a \leq x \leq 1-a, \\ a \leq x \leq 1+a, \end{cases}$ 故 $a \leq x \leq 1-a$, 从而当 $a = 1-a$ 即 $a = \frac{1}{2}$ 时, 函数仅在 $x = \frac{1}{2}$ 一点有定义; 当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 函数的定义域为 $[a, 1-a]$; 当 $a > \frac{1}{2}$ 时无解, 即定义域是空集.

关于求函数的定义域的方法应注意: 如果函数是一个抽象的数学式子, 则其定义域是使这个式子有意义的一切实数. 这时应注意到: (1) 分式的分母不能为零; (2) 偶次根号下应大于或等于零; (3) 对数式的真数应大于零; (4) $\arcsin x$ 或 $\arccos x$, 其 $|x| \leq 1$; (5) 若函数表达式由几项组成, 则其定义域是各项定义域的公共部分; (6) 分段函数定义域是各段定义域的并集.

例2 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 1 \\ x, & x \geq 1 \end{cases}$, $\varphi(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ x^2-1, & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $f[\varphi(x)]$

解 $f[\varphi(x)] = \begin{cases} e^{\varphi(x)}, & \varphi(x) < 1 \\ \varphi(x), & \varphi(x) \geq 1 \end{cases}$

当 $\varphi(x) < 1$ 时, 或 $x < 0$, $\varphi(x) = x+2 < 1$, 即 $\begin{cases} x < 0 \\ x < -1 \end{cases}$, 于是 $x < -1$; 或 $x \geq 0$, $\varphi(x) =$

$x^2-1 < 1$, 即 $\begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 < 2 \end{cases}$, 于是 $0 \leq x < \sqrt{2}$.

当 $\varphi(x) \geq 1$ 时, 或 $x < 0, \varphi(x) = x + 2 \geq 1$, 即 $\begin{cases} x < 0 \\ x \geq -1 \end{cases}$, 于是 $-1 \leq x < 0$; 或 $x \geq 0$,

$\varphi(x) = x^2 - 1 \geq 1$, 即 $\begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 \geq 2 \end{cases}$, 于是 $x \geq \sqrt{2}$.

综上所述, 知

$$f[\varphi(x)] = \begin{cases} e^{x+2}, & x < -1 \\ x + 2, & -1 \leq x < 0 \\ e^{x^2-1}, & 0 \leq x < \sqrt{2} \\ x^2 - 1, & \sqrt{2} \leq x \end{cases}$$

例 3 求下列函数的反函数.

1) $y = \sqrt{\pi + 4\arcsin x}$

2) $y = \begin{cases} x, & x < 1 \\ x^3, & 1 \leq x \leq 2 \\ 3^x, & 2 < x \end{cases}$

解 1) 所给函数的定义域及值域分别是 $[-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$ 和 $[0, \sqrt{3\pi}]$. 由 $y = \sqrt{\pi + 4\arcsin x}$

解得

$$x = \sin \frac{1}{4}(y^2 - \pi)$$

故 $y = \sqrt{\pi + 4\arcsin x}$ 的反函数为

$$y = \sin \frac{1}{4}(x^2 - \pi), \quad x \in [0, \sqrt{3\pi}]$$

2) 当 $x < 1$ 时, $y = x$, 故反函数为 $y = x, x \in (-\infty, 1)$

当 $1 \leq x \leq 2$ 时, $y = x^3$, 故反函数为 $y = \sqrt[3]{x}, x \in [1, 8]$

当 $x > 2$ 时, $y = 3^x$, 故反函数为 $y = \log_3 x, x \in (9, +\infty)$

综上所述, 所求的反函数为

$$y = \begin{cases} x, & x < 1 \\ \sqrt[3]{x}, & 1 \leq x \leq 8 \\ \log_3 x, & 9 < x \end{cases}$$

例 4 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 且对任意 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 有 $|f(x) - f(y)| < |x - y|$, 证明 $F(x) = f(x) + x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加.

证 任取 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 且 $x_2 > x_1$, 则由题设条件有

$$|f(x_2) - f(x_1)| < |x_2 - x_1| = x_2 - x_1$$

而 $f(x_1) - f(x_2) \leq |f(x_2) - f(x_1)| < x_2 - x_1$, 所以 $f(x_1) + x_1 < f(x_2) + x_2$, 从而

$$F(x_1) < F(x_2)$$

所以 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加.

例 5 设在 $[1, +\infty)$ 上, $0 < f'(x) < \frac{2}{x^3}$, 证明 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有界.

证 因 $0 < f'(x) < \frac{2}{x^3}$, 根据积分性质得 $\int_1^x 0 dx < \int_1^x f'(t) dt < \int_1^x \frac{2}{t^3} dt$ ($x > 1$), 即 $0 < f(x) - f(1) < -\frac{1}{x^2} + 1$ ($x > 1$), 也即 $f(1) < f(x) < -\frac{1}{x^2} + 1 + f(1)$ ($x > 1$), 所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有界.

例 6 证明 $f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} + x - 1}{\sqrt{1+x^2} + x + 1}$ 是奇函数 ($x \in R$).

证 因为 $f(x) + f(-x) = \frac{\sqrt{1+x^2} + x - 1}{\sqrt{1+x^2} + x + 1} + \frac{\sqrt{1+x^2} - x - 1}{\sqrt{1+x^2} - x + 1} =$

$$\frac{[(1+x^2) - (x-1)^2] + [(1+x^2) - (x+1)^2]}{(\sqrt{1+x^2} + 1)^2 - x^2} = 0$$

所以 $f(-x) = -f(x)$, 即 $f(x)$ 是奇函数 ($x \in R$).

例 7 设 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_8x^8 = (2x-1)^8$, 求 $a_1 + a_2 + \cdots + a_7$.

解 设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_8x^8 = (2x-1)^8$, 则

$$f(0) = a_0 = 1, \quad f(1) = a_0 + a_1 + \cdots + a_7 + a_8 = 1$$

比较原等式两边 x^8 的系数, 得 $a_8 = 2^8$, 故

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_7 = 1 - a_0 - a_8 = -256$$

例 8 某玩具厂每天生产 60 个玩具, 其成本为 300 元, 若每天生产 80 个玩具, 其成本为 340 元, 求其线性成本函数, 问每天的固定成本和生产一个玩具的可变成本以及平均成本各多少?

解 设该厂每天玩具产量为 x 个, 则其线性成本函数为 $C(x) = a + bx$ (单位: 元), 由已知 $C(60) = 300, C(80) = 340$, 得方程组

$$\begin{cases} a + 60b = 300 \\ a + 80b = 340 \end{cases}, \text{解之得} \quad \begin{cases} a = 180 \\ b = 2 \end{cases}$$

因此, 该厂生产成本函数为 $C(x) = 180 + 2x$, 每天固定生产成本为 $C(0) = a = 180$ 元, 生产一个玩具的可变成本为 $b = 2$ 元, 每天生产 x 单位玩具的平均成本为 $\frac{C(x)}{x} = \frac{a}{x} + b$.

例 9 设某商品的需求函数为 $Q_d = 15 - 0.4p$, 总成本函数为 $C = 12 + 0.3Q_d$, 求该商品总利润对于销售价格的函数.

解 当销售量为 Q_d 时, 总收入为

$$R(p) = Q_d p = (15 - 0.4p)p$$

于是总利润对于销售价格的函数为

$$L(p) = R(p) - C(Q_d) = (15 - 0.4p)p - [12 + 0.3(15 - 0.4p)] =$$

$$15.12p - 0.4p^2 - 16.5$$

第二节 极 限

2.1 关于考试大纲的若干简明诠释

1. 极限是高等数学的理论基础, 要理解极限的概念, 理解函数左、右极限的概念以及极限

存在与左、右极限之间的关系.

2. 关于极限概念, 要注意以下几点:

1) 数列 $x_n = f(n)$ 的极限与函数 $y = f(x)$ 的极限是有区别的. 它们之间的区别在于: 数列 $x_n = f(n)$ 的自变量 n 的变化过程是间断的 (只取正整数), 且只有一种变化过程: $n \rightarrow \infty$ (即 $n \rightarrow +\infty$), 而函数 $y = f(x)$ 的自变量 x 的变化过程是连续的, 变化过程有六种: $x \rightarrow x_0$, $x \rightarrow x_0^+$, $x \rightarrow x_0^-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$.

2) 数列极限与函数极限之间也有一定的联系: (1) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ 必定存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 但当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ 可以存在; (2) (海涅定理) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是对于 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$ 时) 的任意数列 x_n , 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

3. 关于无穷小 (量) 和无穷大 (量), 指出以下几点:

1) 无穷小量是以 0 为极限的一类特殊变量, 不是什么绝对值很小很小的定数; 无穷大量是绝对值无限增大的一类特殊变量, 也不是什么绝对值很大很大的定数. 如果 $f(x)$ 是无穷大, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷小; 如果 $f(x)$ 是无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷大.

2) 如果函数 $f(x)$ 以 A 为极限, 那么 $f(x) - A = \alpha(x)$ 是无穷小, 即 $f(x)$ 等于常数 A 与一个无穷小 $\alpha(x)$ 之和; 反过来, 如果 $f(x) - A = \alpha(x)$ 是无穷小, 即 $f(x)$ 等于一个常数 A 与无穷小 $\alpha(x)$ 之和, 则 $f(x)$ 以 A 为极限. 由此可以把极限问题转化为无穷小的问题来处理. 这一点可以看成是高等数学中特别要提出无穷小这类特殊变量的原因. 应当理解无穷小、无穷大以及无穷小的阶 (下面将提及) 的概念.

3) 无穷小与有界函数既有区别, 也有联系. 它们之间的区别是: (1) 无穷小是指在自变量的某种趋向下, 对应的函数值的变化趋势 (趋向零), 而有界函数是指自变量在某一范围内时, 对应的函数值的变化情况; (2) 无穷小定义中的不等式 $|f(x)| < \epsilon$, 要求 ϵ 是任意小的正数, 而有界函数定义中的不等式 $|f(x)| < M$, 只要求有一个正数 M , 不要求 M 是任意小的数. 它们之间的联系是: 如果函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时是无穷小, 则 $f(x)$ 在点 x_0 附近必定有界, 但离 x_0 远一些的地方是否有界就不能肯定了.

4) 无穷大与无界函数既有区别, 也有联系. 它们之间的区别是: (1) 无穷大是指在自变量的某种趋向下, 对应的函数值的变化趋势 (其绝对值无限增大), 而无界函数是指自变量在某一范围内变化时, 对应函数值的变化情况; (2) 无穷大定义中的不等式 $|f(x)| > M$, 要求适合不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 或 $|x| > X$ 的一切 x 都要满足, 而无界函数定义中的不等式 $|f(x)| > M$, 只要求在 $0 < |x - x_0| < \delta$ 或 $|x| > X$ 中有一个 x 满足即可. 它们之间的联系是: 如果 $f(x)$ 是无穷大, 则 $f(x)$ 必定无界; 但反过来, 当 $f(x)$ 无界时, $f(x)$ 可不一定是无穷大.

4. 一般的教科书只介绍了无穷小的比较, 并未介绍无穷小的阶的概念. 这里一并介绍如下.

设 α 和 β 是同一极限过程中的两个无穷小, 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$, 则称 β 是比 α 高阶的无穷小.

记为 $\beta = o(\alpha)$; 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$, 则称 β 是比 α 低阶的无穷小; 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = C \neq 0$, 则称 β 与

α 是同阶的无穷小, 记为 $\beta = O(\alpha)$; 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$, 则称 β 与 α 是等价的无穷小, 记为 $\alpha \sim \beta$; 如