

〔清〕金德鑒 編校

焦氏喉科枕秘

中國醫學大成續集

焦氏喉科枕秘提要

清·金德鑒編校。德鑒字保三。元和人。保三精研醫學。留心喉科。得喉科枕秘一書。鍼石與湯藥並施。審證繪圖。曲折詳盡。世無副本行世。上卷。首列治喉科法。次列治喉要訣。臨證二十法。手術鍼刺。外吹內服。皆有師承。次列焦氏喉症圖形七十二證。鍼藥秘傳。吹服兼施。下卷列應用良方。秘方吹藥。末附灸刺各法。及附方等。是書參合證因。條列治要。至為明晰。選用成方。尤見精當。

喉科枕秘序

醫之爲道。切於民生日用。理近而事難。故古人有司命之目。自仲景著一百十三方。後賢續而衍之。湯液之方。遂加于鍼石。迨子和河間東垣丹溪輩。根柢聖經。發揮心得。學者益泛濫沈酣。準方施治。而鍼石之法。乃日微。吳中金君保三業。軒歧家言。能貫穿於靈樞。素問。秦越人八十三難經。以意爲變化。心殷濟時。爲士大夫所推服。近得喉科枕秘二卷。鍼石與湯藥並施。審症繪圖。曲折詳盡。特世無副墨行遠。爲難商之孫君雲齋。雲齋遂引爲已任。鳩資以付手民。而請予弁其首。予謂喉以納氣。通于天和。咽以納食。

通于地產。會厭莞乎其上。以司開闔。實爲心肺肝腎呼吸之門。飲食聲音吐納之道。關係生死。爲任綦重。先民有言。喉痺屬痰。喉風屬火。治法宜祛風豁痰。解熱開鬱。乃無遺誤。若猝投辛散。煽動風火。必至增腫腐灼。陰陽絡失所養。遂不可救藥。今觀是書。參合證因。條列治要。錯綜疑似。縷晰絲分。令人一望而得療治之法。有補於民生日用。爲何如耶。鍼石之有裨於湯液。爲何如耶。固宜不脛而走羣奉爲枕中鴻寶者矣。雖然。陰陽相貫。如環無端。營行脈中。衛行脉外。倘脈理之偶淆。卽洞垣其誰屬。權衡乎病之淺深。治之標本。選用成方。能奏奇效。刀圭所授。立起沉疴。是在

善讀書者。

同治七年龍在戊辰孟春月

永康應寶時譔

喉科枕秘序

四

焦氏喉科枕秘卷一

元和金德鑑保三甫編校

治喉秘法

夫喉咽之症。用藥須知緩急。行針貴識頭尾。如牙關緊急。通關散可施。風毒痰壅。追風散當用。三黃涼膈有消痰降火之効。二陳荆芥有豁痰驅風之功。潰瘍必須內托收成全賴生肌。麻藥用于未針之前。秘藥用于旣針之後。籜藥敷之紅腫散。水藥服後欬痰行。洗藥去舊生新。燻藥伐邪存正。吹藥施於痛時。刀針用於腫處。雙单蛾生于咽門。而圓小無膿。吹本行針。有膿挑破自愈。可服涼膈等湯。喉疗

花疔形似鞭疔而差長。上麻藥而鉤住刀割。用鐵烙而吹
秘止痛。內托自消。紅色可治。黑色難療。瘡之雙單耳下腮
邊或腫。治同乳蛾。潰服內托。雀舌左右形小而尖。喉中舌
底有痰。治類喉疔。只服三黃。鉗舌蓮花靠舌根而起。中不
可用針。纏舌喉風。口噤舌捲腫大。三黃涼膈不可緩。緩則
難痊。蛾之雙單並死活。日久脹大作痛。無時用刀細割一
層。搽爛藥于其中。切勿吞下。須吐出吹秘。一月方見其功。
用烙烙之。三黃可服。至若走馬牙疳。喉疳口疳結毒。牙齦
紫腫。臭穢不堪。必吹本秘。生肌在用。午后年干。漱口。臉腫
頭搖。咽乾音啞。身熱唇穿。落牙無血。俱爲不治。服土茯苓。

末。自有奇能。喉單似蛾尖而小。宛若牛乳之狀。氣單似梅核而小。用其四十九針。回食單卽甸氣生。蒂丁兩傍紅起。當中名梅核。吐不出而吞不入。梅核用針。甸氣用三黃十八兼用。二陳四七成功。重舌舌上生。可刺金津玉液。蒂丁腫後號懸疔。吹秘勿針。藥服三黃與犀地死舌名木舌。堅硬不能舒。咂舌瘡生喉中。能令舌短難語。有痰先用追風。癟頭必須剔破。初服三黃。久宜內托白紅紫色。猶堪治黑色。腫時魄魄離。兜腮瘡生腮下。外敷金箍散。內服十八方。膿從口出易治。膿從腮出難痊。膿生火針刺。肉爛秘生肌。蠉舌有心黑。宜挑去。更服三黃涼膈。間用秘本吹之。收功。

仍用生肌飛瘍立時而起。喉痺頃刻而治。此必先探吐。本吹刀刺何傷。鎖喉風牙關緊急。手足登開。先刺四穴。以辨生死。次浴手足以開脾胃。或刀或針。血去腫消爲上策。纏喉風。眼白面紫。項腫不言。勢如角弓。反張命在須臾。而難保。探痰刺血。病根除。喉癩相牽似綿。可服益氣疎風。再用麝香調服。兼吹本秘。追風骨槽風。如口噤者。治之先吐風痰。垂下五分灸七壯。清陽散火。療之愈。舌下痰瘤刺青筋。膠涎隨出。如蛋清加味二陳湯。清熱如聖散。用之皆靈。喉中有息肉。壅塞相重。疊枸橘湯。雄黃末飲。搽最妙。出汗生瘡。腫黑生瘻。左右陰瘡。三般無異。金箍散。十八方。敷之服。

之相當。氣癰喉痺。酒毒喉痺。二者全塗。金鎖匙。三黃散。吹飲卽愈。大抵吹藥本下過刀針秘復吹。餘腫不消用均末。刀口難完上生肌。喉中氣味人中白。追取風痰金鎖匙。水藥時哈口。冰梅頻咽津。抑火三黃涼膈散。消腫須知十八味。內托千金散。化痰二陳湯。虛火血虧從四物。陽虛氣弱四君。當惡寒須解表。便秘必疎通。此是喉科真要訣。學者必得盡心功。

喉
科
枕
秘
卷
一

六

治喉要訣

一針手足辨陰陽。鮮血迸流命自長。若是些些黃白水。預知旦夕見危亡。

二從耳下頸腮中慢說藤絲細刮紅。方用眉刀患處割鮮血多者不爲凶。

三針舌下小青筋。血出鮮紅病體輕。黑腐成條絡是死。胸中結熱把痰清。

四般惡症曰懸瘡。重膀纏喉併鎖風。熱積風痰胸膈結。三黃行下自疎通。

五內虛邪火上行。欲教分散須施針。少商曲池頰車穴。男

左女右辨分明。

六用追風散取痰。痰如清水不多浸。連吹本秘寬胸結涼膈。追風及早啖。

七從頭尾可行針。切忌中間根上行。鮮血多來休慮遠。黑而少者不長生。

八刀割患要深知。麻藥先從患處吹。擰口中間勾搭住。連施刀法莫狐疑。

九行烙鐵要除根。炭火桐油一處焚。只待燒紅方細烙。連

將秘藥上安甯。

十全灸法在風池。五壯原來甚得宜。再把頰車加幾壯。少

商灸罷曲池隨。

臨症二十法

凡咽喉無病。其色淡紅而白。不高不腫。一有患處必紫而腫。試病之法。或瘡或痺或蛾認不眞。只吹本於外腫處。下刀針次吹秘。無有不効。如不腫。只外痛。乃風熱太甚。先宜疎泄。後用清化。若喉痺。不須下刀針。吹本秘。服三黃湯。三四劑自愈。

一蒂丁在喉中。爲人之主。用刀用針用烙。切不可犯之。犯之必死。

一重脰。是上脰腫起至舌。風熱過甚。早治可生。遲則湯藥

難進。

一懸丁卽蒂丁。腫起垂下。懸塞喉中。刀針難施。

一蘊積熱毒。喉中有大小諸瘡。謂之珍珠毒。口乾起稠痰。

辛苦或作痛。吞吐不利。吹本秘挑破出血。服學士湯。

一針之法。先捺倒舌。針靠撩舌根輕輕一挑。卽出。切不可慢。恐病人低頭吐痰血誤事。遠遠刺去。須防蒂丁。

一烙鐵。用紋銀打茶匙樣。用陳艾包烙鐵外。以棉花包住。沾桐油。燈火上燒盡無烟。擋在燈上。取圈撐住口。令人扶住。捺定舌根。使人刮淨烙鐵。看真患處。連烙一烙。卽出。不可緩慢。恐傷犯蒂丁。烙後卽吹秘藥解熱毒。又一

烙法。將炭燒紅。入乾艾。烙鐵放艾上燒紅。依前法治之。
須眼明手快。

一夜深看病用燈。着人站于醫生臘後照看。方見喉中。或
喉小病在喉下。看不真。勿下刀針。只吹追風本秘數次。
待天明再看。

一天陰忌用刀針。恐看病不真。或傷好肉。待天明朗。借日
光以助眼力。方可看治。

一針少商穴。果係病篤。方針其穴。在大拇指角尖。離一韭
葉許。

一頭外腫甚。方用水藥。滾下其痰。若不甚腫。用之非宜。