


国外市售成药介绍



国外市售成药介绍〈六〉

北京市医药情报所译编
北京市药材公司印刷所 印

1982年8月

目 录

作用于神经、肌肉系统的药物


10. 止吐剂..... 1
11. 中枢神经系统兴奋剂.....15
12. 抗抑郁剂.....25
13. 肌肉松弛剂.....45
14. 神经肌肉药, 拟胆碱药.....57

内分泌药物

1. 性激素类
a. 雄激素.....59
b. 雌激素与孕激素.....71
c. 复合性激素.....95
2. 皮质激素类.....99
3. 促激素..... 129

避孕药物

1. 口服与长效避孕药..... 137
2. 其他避孕药..... 155



胰岛素

..... 159

A767799

- 2. 口服降血糖药..... 167
- 3. 甲状腺制品..... 181
- 4. 抗甲状腺药..... 183
- 5. 降胆固醇药..... 187

生殖泌尿系统药物

- 1. 杀滴虫剂，阴道用制剂..... 199
- 2. 泌尿道防腐剂..... 227
- 3. 催产剂..... 241



ANCOLOXIN

【中文名】（复方敏克静）

【剂 型】片剂

【生产厂】Glaxo (A & H)

【成 分】盐酸氯苯甲嗪25mg，维生素B₆50mg。

【适应症】恶心与呕吐。

【用 法】1—2片/次，2—3次/日。儿童不宜服用。

【包 装】50片（7.70）

AVOMINE

【中文名】（安伏敏）

【剂 型】片剂

【生产厂】May & Baker

【成 分】8—氯茶碱异丙嗪25mg

【适应症】由旅行、妊娠、放射治疗、以及用某些药物（例如抗生素、合成雌激素、一般麻醉剂等）治疗时并发的恶心与呕吐。

【用 法】成人：根据个体需要服1—2片。

5—10岁儿童：成人的一半量。

10岁以上：同成人剂量。余遵医嘱。

【包 装】10片（1.50），250片（16.90）。

BENDECTIN

【中文名】（复方苯吡甲醇胺）

【剂 型】片剂

【生产厂】Merrell

【成 分】琥珀酸2—〔 α —（2—二甲氨基乙氧基）— α —甲基苄基〕吡啶（苯吡甲醇胺）10mg，维生素B₆ 10mg。

【适应症】妊娠期恶心与呕吐。

【用 法】就寝时服2片。

【包 装】100片。

CEPHADOL

【中文名】二苯呱啉丁醇

【剂 型】片剂

【生产厂】Nippon Shinyaku

【成 分】盐酸1, 1—二苯基—4—呱啉—1—基—1—丁醇（二苯呱啉丁醇）25mg

【适应症】内耳障引起的眩晕。

【用 法】成人：1—2片/次，3次/日。

【包 装】100片（8.70）。

CORTIGEN B₆

【中文名】（呕得克）

【剂 型】针剂（成人及儿科）

【生产厂】Ormonoterapia Richter

【成 分】成人用每支含天然肾上腺皮质激素12临床
单位，维生素B₆50mg。

儿科用每支含天然肾上腺皮质激素 8 临床
单位，维生素B₆20mg。

【适应症】由原性与外原性中毒引起的呕吐，妊娠剧
吐，习惯性与丙酮血症性呕吐。

【用 法】成人：每天肌注或静注1—3支。

儿科：每天肌注或静注1—2支。

【包 装】成人：6支（5.20）。

儿科：6支（4.00）。

CYCLIZINE HYDROCHLORIDE

【中文名】苯甲嗪

【剂 型】糖浆，片剂

【生产厂】Jean—Marie

【成 分】1—二苯甲基—4—甲基哌嗪盐酸盐（苯甲嗪）

【适应症】恶心与呕吐

【用 法】片剂： $\frac{1}{2}$ —1片/次，3—4次/日，饭前服。

糖浆：需要时饭前服5—10ml。

【包 装】片剂：50mg×250片（10.00）。

糖浆：12.5mg/5ml×1,000ml（10.70）。

DILIGAN

【中文名】（眩立克）

【剂 型】片剂

【生产厂】UCB

【成 分】盐酸氯苯甲嗪 12.5mg，盐酸羟嗪10mg，
烟酸50mg。

【适应症】起因于迷路的眩晕或其它疾病。

【禁忌症】严重低血压，出血。

【用 法】1片/次，3次/日。可以增加到每天4—6
片。

【包 装】20片（3.70），100片（16.70），
500片（73.30）。

DRAMAMINE

【中文名】乘晕宁

【剂 型】针剂，片剂

【生产厂】Searle

【成 分】茶苯醇胺

【适应症】眩晕，美尼尔氏综合症，迷路炎，偏头痛，妊娠期恶心和呕吐，旅行病。

【禁忌症】注意：可能引起倦睡。应警告有此反应者不许开车或操作机器。

【用 法】针剂：需要时肌注或静注50—100mg。

片剂：1—2片/次，2—3次/日。

【包 装】针剂：6小瓶×5ml (9.10)。

片剂：100片 (7.00)

EMETROL

【中文名】（抑吐液）

【剂 型】溶剂剂

【生产厂】W.H.Rorer

【成 分】果糖，葡萄糖，磷酸

【适应症】流行病性呕吐，婴儿反胃，妊娠早期或精神因素引起的恶心和呕吐。

【用 法】未冲淡的溶液15—30ml/次，若有需要可
每隔15分钟服用一次，最多持续一小时。
婴儿及儿童：5—10ml/次。

【包 装】3啊（3.30），16啊（9.00）。

MARZINE

【中文名】（晕吐净）

【剂 型】片剂

【生产厂】Burroughs Wellcome

【成 分】苯甲嗪

【适应症】恶心与呕吐，如晕动病，由美尼尔氏综合症和其他病因引起的眩晕及迷路性疾病。治疗儿童的非特异性或发热性呕吐特别有价值。

【注 意】若非在医生监督下应用，则在妊娠的前四个月期间应慎用。

【用 法】成人1片/次，儿童 $1/2$ 片/次，皆3次/日。

预防旅行病：一般启程前半小时服一次。

【包 装】50mg×10片（1.10），100片（8.30）。

MAXOLON

【中文名】灭吐灵

【剂 型】针剂，糖浆，片剂

【生产厂】Beecham

【成 分】胃复安

参阅胃复安（第四册41页）

MERISLON

【中文名】抗眩啉

【剂 型】片剂

【生产厂】Eisai

【成 分】甲磺酸2—（2—甲氨基乙基）吡啶（甲氨基吡啶）5mg。

【适应症】眩晕与美尼尔氏综合症及眩晕并发的头晕感觉。

【用 法】成人：1—2片/次，3次/日，饭后服。

【包 装】100片（8.10），1,000片（63.00）。

MONOTREAN

【中文名】（眩痛宁）

【剂 型】片剂

【生产厂】Luitpold—Werk

【成 分】盐酸奎宁0.1gm，罂粟碱0.04gm。

【适应症】眩晕，偏头痛。

【用 法】1片/次，3次/日，饭后服。

【包 装】30片（7.00）

MOTILIUM

【中文名】（灭吐敏）

【剂 型】滴剂，糖浆，片剂

【生产厂】Janssen

【成 分】5—氯—1—〔1—〔3—（2—氧代—1—苯并咪唑啉基）丙基〕哌啶—4—基〕—2—苯并咪唑啉酮。

【适应症】并发食管反流性缓慢胃排空的消化系统疾病；各种原因引起的恶心与呕吐。

【用 法】成人：10mg/次，3次/日，饭前15—30分钟服。

儿童：1滴/公斤体重或 $\frac{1}{4}$ 量匙/5公斤体重，3次/日。饭前服。

【包 装】滴剂：1%×30ml（9.00）。

糖浆：0.1%×60ml（9.60）

片剂：10mg×30片（6.00），
100片（14.00）。

NAVICALM

【中文名】（航晕克）

【剂 型】片剂

【生产厂】UCB

【成 分】盐酸氯苯甲嗪25mg

【适应症】晕动病，各种类型的恶心与呕吐。

【用 法】成人：启程前晚一次服2片。

儿童：按情况减量。

【包 装】500片（50.00）。

OPRAM

【中文名】（呕感平）

【剂 型】片剂

【生产厂】Conmed

【成 分】盐酸灭吐灵

【适应症】由胃肠道疾病引起的恶心与呕吐；不耐受药物；充血性心力衰竭；手术后症状。

【用 法】1片/次，3次/日。

【包 装】500片（16.30）。

PLASIL

【中文名】（扑息吐）

【剂 型】滴剂，针剂，糖浆，片剂

【生产厂】Dow—Lepetit

【成 分】盐酸灭吐灵

参阅息胃（第四册47页）

PRIMPERAN

【中文名】（扑吐灵）

【剂 型】滴剂，针剂，糖浆，栓剂，片剂

【生产厂】Delagrangé

【成 分】盐酸灭吐灵

参阅平胃灵（第四册49页）

SEA—LEGS

【中文名】（息晕灵）

【剂 型】片剂

【生产厂】Glaxo (DF)

【成 分】盐酸氯苯甲嗪12.5mg

【适应症】预防和减轻各类旅行病和晕动病。

【用 法】成人及12岁以上儿童：2片/次。

1—12岁儿童：1片/次。

【包 装】15片（1.00）。

STEMETIL

【中文名】（晕吐停）

【剂 型】针剂，糖浆，片剂。

【生产厂】May & Baker

【成 分】甲哌氯丙嗪

【适应症】偏头痛，美尼尔氏症，迷路炎及其它类型的耳性眩晕。各种病因引起的恶心及呕吐。

【用 法】根据病情及病人的需要而定。余遵医嘱。

【包 装】针剂：12.5mg/ml安瓿×10支（5.30）。

片剂：5mg×25片（2.30），250片

（11.60）。25mg×500片（96.40）。

糖浆：5mg/5ml×125ml（3.30）。