

# 国外市售成药介绍



# 目 录

## 一、抗生素类药物（链霉素类药物见“其他化疗药物”）

1. 氨基糖甙类····· 1—15
2. 头孢菌素类····· 17—29
3. 氯霉素类····· 31—34
4. 大环内酯类····· 35—44
5. 青霉素类····· 45—71
6. 四环素类····· 73—95
7. 抗真菌药····· 97—103
8. 其他抗生素类····· 105—121
9. 抗菌复合制剂····· 123—134

## 二、其他化学治疗药物

1. 链霉素类····· 135—139
  2. 其他抗结核药····· 141—158
  3. 磺胺类药物····· 159—165
  4. 止泻药····· 167—199
  5. 抗变形虫药····· 201—205
  6. 驱肠虫药····· 207—219
  7. 抗麻风病药····· 221
  8. 抗疟药····· 223—227
  9. 杀利什曼原虫药、杀锥虫药····· 229
  10. 抗病毒药····· 231—234
-

# AMIKIN

【中文名】丁胺卡那霉素

【剂 型】针剂

【生产厂】Bristol

【成 分】丁胺卡那霉素硫酸盐

【适应症】由敏感的革兰氏阴性菌株，包括：假单胞菌、大肠杆菌、变形杆菌、克氏杆菌、肠杆菌、沙雷氏菌等所引起的严重感染。尿道和呼吸道感染。菌血症和败血症。皮肤和软组织感染。腹内感染。烧伤。手术后感染。

【用 法】成人：

体重40—50 公斤者初次 500 mg，然后  
250mg/次，2次/日。

体重65—75公斤者 500mg/次，2次/日，  
或7.5mg/公斤体重/12小时。

新生儿：

初次10mg/公斤体重，然后15mg/公斤体  
重/日，分2次给药。

【包 装】250mg小瓶（9.20）。

500mg小瓶（16.70）。

# DIBEKACIN

【中文名】双去氧卡那霉素

【剂 型】针剂

【生产厂】Meiji

【成 分】3, 4-双去氧卡那霉素硫酸盐

【适应症】由铜绿色假单胞菌、变形杆菌和对其他药物有抗药性的细菌所引起的感染，败血病，脓肿疖，蜂窝织炎，扁桃体炎，肺炎，支气管炎，腹膜炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，中耳炎。

【注意事项】投用该药需慎重，因该药可能引起听觉损害以及肝或肾功能障碍。

【用 法】成人：100mg/日

婴儿和儿童：1—2mg/公斤体重，分1—2次肌注，剂量可根据个体情况调整。

【包 装】50gm小瓶（9.00）。

100gm小瓶（16.30）。

# ENSAMYCIN

【中文名】西梭霉素

【剂 型】针剂

【生产厂】Schering USA

【成 分】西梭霉素硫酸盐

【适应症】败血病以及肾、生殖泌尿道、下呼吸道、骨或软组织、中枢神经系统、胃肠道的感染。烧伤和创伤感染。腹膜炎或骨盆和胆道感染。

【禁忌症】对西梭霉素过敏。

【用 法】成人：

全身性感染：3mg/公斤体重/日，分3次投药。

尿道感染：2mg/公斤体重/日，分2次投药。

危及生命的感染：4mg/公斤体重/日，分3次投药。

儿童：3—4mg/公斤体重/日，分3次投药。

婴儿和新生儿：5—6mg/公斤体重/日，分3—4次投药。

二周以下的新生儿：分成2份相等剂量，每12小时投药一次。

【包 装】75mg/1.5ml安瓿 (9.20)。

50mg/ml安瓿 (6.70)。

20mg/2ml安瓿 (2.90)。

10mg/ml安瓿 (1.50)。

# GABBROMICINA

【中文名】巴龙霉素

【剂 型】针剂

【生产厂】Farmitalia

【成 分】巴龙霉素硫酸盐

【适应症】由革兰氏阳性和阴性菌以及混合菌所引起的呼吸道感染，外科感染，葡萄球菌脓毒症，淋球菌感染；泌尿道和胆道感染。

【禁忌症】肾功能不全和耳蜗前庭受损者。

【用 法】成人：1gm/日，均匀分次投药。

儿童：10—20mg/公斤体重/日，均匀分成2—3次投药。

【包 装】500mg小瓶 (2.20)。

# GARAMYCIN/GARAMYCIN120

【中文名】庆大霉素/庆大霉素120

【剂 型】针剂/针剂

【生产厂】Schering USA

【成 分】庆大霉素硫酸盐：

40mg/ml（成人用）

10mg/ml（儿科用）

120mg/3ml（庆大霉素120）

【适应症】败血症和中枢神经系统（脑膜炎）、泌尿道、呼吸道、胃肠道、皮肤和软组织（包括烧伤）的严重感染。

【禁忌症】应该避免与引起神经中毒和肾中毒的其他药物同时应用。

【用 法】体重60公斤以上：80mg/8小时、用7—10日。

体重60公斤以下：60mg/8小时，用7—10日。

儿科：3mg/公斤体重/日，分3次等量投用。

泌尿道感染：120mg/安瓿/日。用7—10日。

对儿科或肾受损的病人不推荐每天单剂量的用法。

【包 装】成人：2ml/小瓶 （8.70）。

儿科：2ml小瓶 （2.60）。

庆大霉素120：3ml （11.30）。

# GARAMYCIN 280

【中文名】庆大霉素280

【剂 型】针剂

【生产厂】Schering USA

【成 分】庆大霉素硫酸盐

【适应症】淋病

【用 法】一次剂量

【包 装】280mg/2ml/安瓿 (22.00)。

# JINTAMYCIN

【中文名】庆大霉素

【剂 型】针剂

【生产厂】Ashford

【成 分】庆大霉素

【适应症】败血症和中枢神经系统（脑膜炎）、泌尿道、呼吸道、胃肠道、皮肤和软组织（包括烧伤）的严重感染。

【用 法】体重60公斤以上：80mg/8小时，用7—10日。

体重60公斤以下：60mg/8小时用7—10日。

儿科用：3mg/公斤体重/日，分3次等量投用。

【包 装】80mg/2ml小瓶      (4.70)。

# KANAMYCIN

**【中文名】**卡那霉素

**【剂 型】**胶囊、针剂

**【生产厂】**Meiji

**【成 分】**卡那霉素单硫酸盐

**【适应症】**杆菌性痢疾、急性腹泻、由敏感菌引起的细菌性肠炎。

**【用 法】**50—100mg/公斤体重/日，分3—4投药。

**【包 装】**胶囊：250mg×100粒 (10.70)。

针剂：1gm小瓶，5gm小瓶。

# KANAMYCIN“MEIJI”

【中文名】“明治”卡那霉素

【剂 型】针剂

【生产厂】Meiji

【成 分】卡那霉素硫酸盐

【适应症】呼吸道感染：咽炎、支气管炎、扁桃体炎、肺炎等等。泌尿道感染，肺结核。

【注意事项】肾功能受损者慎用。在长期治疗中应作听觉检查。

【用 法】通常肌注1—2gm/日

【包 装】1gm小瓶       (1.30)。

5gm小瓶       (4.70)。

# KANENDOMYCIN

【中文名】卡那霉素B

【剂 型】针剂

【生产厂】Meiji

【成 分】卡那霉素B硫酸盐

【适应症】由革兰氏阳性和阴性菌：如葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌、大肠杆菌和其他敏感菌所引起的感染。

【用 法】成人：400—600mg/日，分2—3次肌注。

儿童：10—20mg/日，分2次肌注

余遵医嘱。

【包 装】200mg/小瓶 (2.70)。

# KANO

**【中文名】**（卡诺）

**【剂 型】**肌注针剂

**【生产厂】**Plerrel

**【成 分】**卡那霉素硫酸盐，相当于1gm 碱。

**【适应症】**对卡那霉素敏感的细菌所引起的感染。

**【用 法】**1gm/日，分2次投药。

**【包 装】**1gm小瓶 （1.20）。

# KANTREX

【中文名】卡那霉素

【剂 型】针剂

【生产厂】Bristol

【成 分】卡那霉素

【适应症】生殖—泌尿道感染，皮肤、软组织和外科手术后感染，呼吸道感染，胃肠道感染。

【用 法】1gm/日，分次投药。

【包 装】1gm × 3ml小瓶 (2.00)。

# MIRAMYCIN

【中文名】庆大霉素

【剂 型】针剂

【生产厂】Atlantic

【成 分】庆大霉素硫酸盐

【适应症】泌尿、呼吸、胃肠道和严重的软组织感染，包括并发脓毒症的烧伤。

【用 法】每日分2—3次投用7—10日

泌尿道感染：0.8—1.2mg/公斤体重/日

其它感染：3mg/公斤体重/日

严重感染：5mg/公斤体重/日

【包 装】20mg/2ml (1.10)。

80mg/2ml (2.30)。

# NEBCIN

【中文名】妥布霉素

【剂 型】针剂

【生产厂】Eli Lilly

【成 分】妥布霉素硫酸盐

【适应症】败血症，新生儿脓毒症，中枢神经系统感染（包括脑膜炎），由敏感菌：包括绿脓杆菌、变形杆菌、大肠杆菌、克雷白氏杆菌、粪链球菌和金黄色葡萄球菌等所引起的下呼吸道、胃肠道（包括腹膜炎）、泌尿道、皮肤、骨骼、软组织（包括烧伤）感染。

【用 法】通常剂量：3mg/公斤体重/日，分3等分投药。

【包 装】Hyporets（单剂量注射后扔掉的注射器）

60mg/1.5ml (8.20)。

80mg/2ml (9.10)。

橡胶塞小瓶20mg/2ml (3.30)。

## RIBOSTAMYCIN“MEIJI”

【中文名】威他霉素

【剂 型】针剂

【生产厂】Meiji

【成 分】威他霉素硫酸盐 1gm（效价）

【适应症】一种广谱抗菌素。由如葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌、淋球菌、肺炎杆菌、大肠杆菌、变形杆菌等敏感的革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌所引起的感染。

【用 法】成人：根据患者病情可每天 1gm。余遵医嘱。

【包 装】1gm小瓶 (3.00)。