

国家护士执业考试

试题精选

主 编 姜安丽 副主编 余剑珍



人民卫生出版社

国家护士执业考试

试 题 精 选

主 编 姜 安 丽

副主编 余 剑 珍

编写人员(按姓氏笔画排列)

王玉升 王兴华 王玲娣 田荣云 申翠华
张 清 陈京立 陈荣凤 闫文翠 姚跃英
桑未心 倪必群 徐卓立 钱晓路 梁 涛

主编秘书 李 芳 芳

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

国家护士执业考试. 试题精选/姜安丽主编. -北京:
人民卫生出版社,2002
ISBN 7-117-04760-7

I. 国… II. 姜… III. 护理学-护士-资格考核-试题
IV. R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 009664 号

国家护士执业考试
试 题 精 选

主 编: 姜 安 丽

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 67616688)

地 址: (100078)北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

印 刷: 三河市潮河印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 11

字 数: 268 千字

版 次: 2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-04760-7/R·4761

定 价: 15.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

出版说明

我国从1994年开始在北京、河南、云南三省市进行全国护士执业考试试点,1995年正式在全国范围内启考,并将其列为正式资格考试制度,每年举行一次。其目的是提高我国护理执业水平和整个护理队伍的素质,性质为水平考试。为配合考试,方便广大考生备考,我们在广泛收集考试信息、研究历年考卷和同类图书的基础上,组织编写了《国家护士执业考试丛书》。本套丛书以卫生部规划的四年制护理专业教材为蓝本,采用言简意赅的文字和习题的方式对国家护士执业考试大纲进行详尽阐释。本套丛书共计3种,它们是:

1. 国家护士执业考试——考点评估与精解
2. 国家护士执业考试——试题精选
3. 国家护士执业考试——模拟试卷

丛书编写聘请了第二军医大学护理系、上海职工医学院、复旦大学护理学院、上海第二医科大学护理系、协和医科大学护理学院、天津医科大学护理系、山东省滨州医学院护理系、北京军医学院、河北省承德卫生学校、广州卫生学校、山东省立医院护士学校、河北省唐山市卫生学校、黑龙江省卫生学校和厦门卫生学校的15名熟悉国家护士执业考试的资深专家执笔,并严格执行了“两按照一针对”的编写原则,即:严格按照考试大纲要求的知识点编写,不漏写,不超纲;严格按照护士执业考试以基本护理问题为命题重点的特点编写,将重点内容突出;针对考生复习量大,复习时间紧的特点,编写突出了重点,实用性强,便于让读者记忆或启发读者回忆。

与同类图书相比,本丛书具有以下鲜明特点:

1. 丛书内容科学、权威,参考性和实用性强。丛书的编写聘请了14所重点学校的15名熟悉国家护士执业考试的资深专家亲自执笔,集众家之精华,是保证丛书科学性、权威性、参考性和实用性的根本所在。

2. 《考点评估与精解》用精练的文字阐释考纲,并根据专家经验对考点的考试概率、复习要求、适宜题型及习题进行评估,这不仅保证了读者复习备考的高效率和针对性,而且使其与《试题精选》融为一体,紧密配套,便于读者建立“知识-试题”的双向联系,从而提高了读者的考试适应性。

3. 图书篇幅适中,各学科比例和国家护士执业考试命题比例一致,避免了“内容泛滥”和“题海战术”。我们将《考点评估与精解》的规模定位于80万字左右,《试题精选》定位于1500道题,《模拟试卷》定位于6套试卷。这一规模是经过调研以后产生的,是科学的,可为读者省时省力。

4. 图书的品种组合及品种内涵为不同复习方式的读者提供了解决方案。无论读者习惯于以复习基本知识为主,或以作题为主,或边复习基本知识边作题,都可以选择到适合品种并达到事半功倍的效果。

人民卫生出版社

2002年2月

前 言

为配合中华人民共和国护士执业考试,方便广大护士复习迎考,在人民卫生出版社的组织下,我们邀请了国内部分具有丰富教学经验的护理专家、学者以卫生部规划教材为蓝本,根据最新制定的考试大纲,编写了这套复习参考丛书。

本套丛书汲取并综合了国内目前已出版的各种执业考试复习用书的优点,同时根据考生学习迎考的心理活动规律,在科学地揭示学科知识内在的逻辑联系基础上,力求给学生最基本、最精确、最实用的学科知识,使考生在最少的复习时间内,取得最理想的复习效果。

本丛书共三册:《考点评估与精解》、《试题精选》、《模拟试卷》,总字数控制在130万字内。具有如下特色:一是在《考点评估与精解》中新设考点评估、考点精释两大栏目。考点评估中的考试指数是对知识点的重要程度和考试概率做出专家的经验评估,指数越大,考试概率越高;复习要求是编写者根据自己的教学经验,对考生复习所达到的知识掌握水平提出要求;适宜题型及习题是对该考点在考试中最可能出现的题型的专家经验评估。在考点评估的基础上对考纲所覆盖的所有知识点进行精确和精练的阐释。通过这种形式,最大限度地帮助考生把握每个考点的重要程度、复习水平及考试形式和基本内容,合理的利用时间,达到事半功倍的复习效果。二是在《试题精选》中体现少而精,与考点配套,摒弃题海战术,即学即测的特色,共编入A₁、A₂、A₃三种类型的选择题1587道,内容覆盖基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学和心理、法律法规和伦理学科所有重要知识点,可有效地帮助考生熟悉和掌握各科知识点考试题型的规律和答题的方法。三是《模拟试卷》提供了护理专家编写的3套仿真模拟试卷和近年全国护士执业考试全真试卷2套。供考生进行自我训练和自我复习掌握水平,对考生评估自己通过考试的概率有重要作用。

由于编写时间仓促和编写体裁的求新,难免有不足之处,恳请广大读者给予指正。

本丛书的编写过程中,得到了第二军医大学护理系、上海职工医学院、复旦大学护理学院、上海第二医科大学护理系、协和医科大学护理学院、天津医科大学护理系、山东省滨州医学院护理系、北京军医学院、河北省承德卫生学校、广州卫生学校、山东省立医院护士学校、河北省唐山市卫生学校、黑龙江省卫生学校和厦门卫生学校等单位领导和老师的支持和帮助,在此一并表示衷心的感谢。

姜安丽

2001年12月于上海

目 录

第一篇 基础护理学

A ₁ 型试题	(1)
A ₂ 型试题	(15)
A ₃ 型试题	(21)

第二篇 内科护理学

A ₁ 型试题	(32)
A ₂ 型试题	(52)
A ₃ 型试题	(62)

第三篇 外科护理学

A ₁ 型试题	(73)
A ₂ 型试题	(91)
A ₃ 型试题	(100)

第四篇 妇产科护理学

A ₁ 型试题	(111)
A ₂ 型试题	(126)
A ₃ 型试题	(133)

第五篇 儿科护理学

A ₁ 型试题	(141)
A ₂ 型试题	(152)
A ₃ 型试题	(157)

第六篇 心理学基础、法律法规、护理伦理学

心理学基础

A₁型试题 (162)

A₂型试题 (164)

法律法规

A₁型试题 (165)

A₂型试题 (167)

A₃型试题 (167)

护理伦理学

A₁型试题 (168)

A₂型试题 (170)

第一篇 基础护理学

A₁ 型 试题

每一道题都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑,以示正确答案

1. 以下哪一项属于以人的健康为中心阶段的护理特点
 - A. 建立以病人为中心的护理教育模式
 - B. 系统化地贯彻“护理程序”
 - C. 按护理程序的工作方法对病人实施整体护理
 - D. 护理方法是执行医嘱和护理常规
 - E. 强调护理是一门专业
2. 19 世纪中叶,南丁格尔首创了科学的护理专业,代表护理学的发展进入了
 - A. 家庭护理
 - B. 医院护理
 - C. 宗教护理
 - D. 近代护理
 - E. 现代护理
3. 南丁格尔发表的论著中最有名的是
 - A. 医院札记
 - B. 护理札记
 - C. 护理福利札记
 - D. 卫生统计札记
 - E. 护理社会学札记
4. 南丁格尔率领的护理队伍使克里米亚战争中的病死率由 50% 下降到了
 - A. 1.2%
 - B. 2.2%
 - C. 3.2%
 - D. 4.2%
 - E. 5.2%
5. 我国实施全国护士执业考试和注册制度开始于
 - A. 1991 年
 - B. 1992 年
 - C. 1993 年
 - D. 1994 年
 - E. 1995 年
6. 我国的第一所护士学校成立于
 - A. 1780 年
 - B. 1788 年
 - C. 1880 年
 - D. 1888 年
 - E. 1898 年
7. 首次提出“责任制护理”概念的是
 - A. 美国的莉迪亚·海尔
 - B. 英国的南丁格尔
 - C. 美国的恩格尔
 - D. 中国的钟茂芳
 - E. 美国护士学会
8. 中国护理界的群众性学术团体最早名为
 - A. 中华护士会
 - B. 中国护士会
 - C. 中华护士学会
 - D. 中华护理学会

- E. 中国护理学会
9. 以病人为中心的护理特点是
- A. 护患是合作伙伴
 - B. 医护是合作伙伴
 - C. 医患是合作伙伴
 - D. 护士具有诊断和处理病人健康问题的能力
 - E. 系统化地贯彻“护理程序”
10. 护理学是一门独立的
- A. 自然学科
 - B. 社会学科
 - C. 生命学科
 - D. 人文学科
 - E. 综合性应用学科
11. 以下不属于护理工作范畴的是
- A. 临床护理
 - B. 护理管理
 - C. 护理模式
 - D. 护理教育
 - E. 社区保健护理
12. 为术后的病人进行口腔护理,是为了满足病人的
- A. 基本生活需要
 - B. 心理需要
 - C. 治疗需要
 - D. 自尊的需要
 - E. 社交的需要
13. 评估病人的生命体征是为了满足病人的
- A. 基本生活需要
 - B. 心理需要
 - C. 治疗需要
 - D. 自尊的需要
 - E. 社交的需要
14. 护理的对象是
- A. 所有的人
 - B. 健康的人
 - C. 患病的人
 - D. 有心理问题的人
 - E. 有健康问题的人
15. 护理宗旨的四个基本概念中核心是
- A. 人
 - B. 环境
 - C. 护理
 - D. 健康
 - E. 环境与人的关系
16. 整体护理的概念不包括
- A. 护理工作是满足护理对象的生理、心理、社会方面的需要
 - B. 护理的服务对象从病人扩展到健康人
 - C. 病人既有现存的,也有潜在的健康问题
 - D. 人的生命过程,从出生到衰老以至临终各个阶段都需要护理
 - E. 护理既服务于个体,又面向家庭、社区,重视自然环境和社会环境对健康的影响
17. 佩普劳的人际间关系模式认为
- A. 人受到应激原刺激产生的压力,具有干扰平衡或正常防御能力的作用
 - B. 护士与病人间的关系是在护理过程中形成的
 - C. 把自我照顾的必要性作为护理的要点
 - D. 护理活动能促进人类的适应能力而达到帮助人恢复健康的目的
 - E. 健康是一种各种需要不受干扰的满足状态,与正常防御线的动态平衡有关
18. 提出保健系统模式的是
- A. 南丁格尔
 - B. 佩普劳
 - C. 奥雷姆
 - D. 罗伊
 - E. 纽曼
19. 奥雷姆对护理四个基本概念的描述不包括
- A. 人是有能力通过学习行为来达到自我

- 照顾需要的
- B. 支持 WHO 关于健康的定义
 - C. 环境是人以外的所有因素,对不能满足自理需要的人,人们会提供帮助
 - D. 护理是一种服务,是一种助人的方式
 - E. 自理需要不能满足时,可通过医护活动满足病人的需要
20. 适应学说的护理过程不包括
- A. 收集适应方面的资料
 - B. 作出护理诊断
 - C. 制定预期结果
 - D. 实施护理措施
 - E. 反馈结果
21. 人体系统按形态分属于
- A. 自然系统
 - B. 人造系统
 - C. 封闭系统
 - D. 开放系统
 - E. 整体系统
22. 构成护理程序的框架的理论基础是
- A. 解决问题论
 - B. 系统论
 - C. 人类基本需要层次论
 - D. 压力与适应理论
 - E. 信息交流论
23. 希望和周围人们友好相处是
- A. 生理需要
 - B. 安全的需要
 - C. 爱与归属的需要
 - D. 尊重的需要
 - E. 自我实现的需要
24. 丧失自尊是住院病人常见的
- A. 压力
 - B. 压力源
 - C. 压力反应
 - D. 适应
 - E. 特异反应
25. 沟通是信息的
- A. 单向传递
 - B. 双向传递
 - C. 多向传递
 - D. 反向传递
 - E. 正向传递
26. 解决问题的关键是
- A. 发现问题
 - B. 明确问题
 - C. 确定目标
 - D. 制定方案
 - E. 方案实施
27. 素质在心理学上是指人的一种较稳定的
- A. 心理特征
 - B. 文化修养
 - C. 心理涵养
 - D. 行为举止
 - E. 品质特点
28. 护士应具有生理 - 心理 - 社会方面的专业素质是
- A. 有必要的护理理论、人文科学知识
 - B. 有护理教育与护理科研的基本知识
 - C. 有观察和分析能力
 - D. 能用护理程序的工作方法解决病人的健康问题
 - E. 心理健康,情绪乐观,体格健壮,言行举止规范,具有良好的人际关系
29. 病人不愿陈述的内容不追问,符合护士语言用语中的
- A. 规范性
 - B. 客观性
 - C. 尊重性
 - D. 情感性
 - E. 保密性
30. 护理程序可分为
- A. 三个步骤
 - B. 四个步骤

- C. 五个步骤
 - D. 六个步骤
 - E. 尚未确定
31. 护理程序的最初阶段为
- A. 评价
 - B. 计划
 - C. 诊断
 - D. 评估
 - E. 实施
32. 医院的任务是
- A. 以医疗为中心
 - B. 以提高医护质量为中心
 - C. 以保证完成教学和科研任务为中心
 - D. 以病人为中心
 - E. 以做好扩大预防、指导基层和计划生育的技术工作为中心
33. 向来就诊的病人宣传肝炎的防治,属于门诊工作的
- A. 管理工作
 - B. 健康教育
 - C. 治疗工作
 - D. 保健门诊
 - E. 社区服务
34. 急救物品做到“五定”是指
- A. 定时更换数量品种、定点安置、定人保管、定期消毒灭菌和定期检查维修
 - B. 定数量品种、定点安置、定人保管、定期消毒灭菌和定期检查维修
 - C. 定数量品种、定人保管、定期消毒灭菌、定期检查、定期维修
 - D. 定数量品种、定点安置、定人保管、定期消毒灭菌、定期维修
 - E. 定数量品种、定点安置、定人保管、定期维修、定期检查
35. 根据 WHO 规定的噪音标准,白天病区较理想的噪音强度是
- A. 25 ~ 30dB
 - B. 30 ~ 35dB
 - C. 35 ~ 40dB
 - D. 40 ~ 45dB
 - E. 45 ~ 50dB
36. 病区护士接到住院处通知有新病人住院,首先应
- A. 安排床位,将备用床变暂空床
 - B. 到门口迎接新病人
 - C. 向病人作入院指导
 - D. 填写有关表格
 - E. 收集病史及作护理体检
37. 出院病案中排列在最后的是
- A. 出院记录或死亡记录
 - B. 病史及体格检查
 - C. 体温单
 - D. 各种检查及检查报告
 - E. 护理病案
38. 护送坐轮椅的病人,下坡时应做到
- A. 病人的头及背应向后靠
 - B. 轮椅往前倾
 - C. 拉上手闸
 - D. 为病人加上安全带
 - E. 护士走在轮椅前面
39. 对家庭病床的病人提供的护理工作,不妥的是
- A. 提供治疗和护理需要
 - B. 指导与协助病人正确实施康复护理
 - C. 健康教育
 - D. 做好心理护理
 - E. 记录病人护理问题
40. 去枕仰卧位适用于
- A. 全身麻醉未清醒者
 - B. 腹部检查
 - C. 导尿时
 - D. 休克病人
 - E. 肛门检查时
41. 下列为病人翻身的处理中哪项是错误的

- A. 手术后病人,先换药后再翻身
B. 颅脑手术后的病人,只能卧于患侧或平卧
C. 颈椎或颅骨牵引的病人,翻身时不可放松牵引
D. 石膏固定和有较大伤口的病人,翻身后将患侧放于适当位置,防止受压
E. 翻身时注意节力
42. 现代医院感染中,医院感染的发生占最大比例的是
A. 交叉感染
B. 内源性感染
C. 外源性感染
D. 二重感染
E. 社会感染
43. 下列哪一项不是医院内感染的主要因素
A. 医院里病原体来源广泛,环境污染严重
B. 易感人群增多
C. 有效控制大量新型抗生素的开发和使用
D. 各种侵入性诊疗手段增多
E. 医务人员对医院内感染的严重性认识不足
44. 下列处理中,能达到灭菌的是
A. 将水煮沸(达 100℃)后经 5~10 分钟
B. 床垫、毛毯、衣服、书籍暴晒 6 小时
C. 用 2% 碘酊在皮肤上涂擦 20 秒后用 70% 乙醇脱碘
D. 用 0.2% 溶液过氧乙酸浸泡手
E. 2% 溶液戊二醛浸泡金属器械及内镜 10 小时
45. 下列处理中,错误的是
A. 碘酊污渍——用乙醇擦拭
B. 甲紫污渍——用乙醇或草酸擦拭
C. 陈旧血渍——用乙醇或草酸擦拭
D. 高锰酸钾污渍——用维生素 C 溶液
E. 高锰酸钾污渍——0.2%~0.5% 过氧乙酸溶液浸泡后洗净
46. 用紫外线消毒空气的处理中,错误的是
A. 灯管用无水乙醇纱布擦净
B. 消毒过程用纱布遮盖病人双眼
C. 关灯后须冷却 3~4 分钟再开
D. 灯亮 2 分钟开始计时
E. 使用超过 1000 小时的灯管应更换
47. 止血带的消毒可选用
A. 高压蒸汽灭菌
B. 浸泡
C. 擦拭
D. 煮沸
E. 熏蒸
48. 下列消毒剂中属于高效类消毒剂的是
A. 碘酊
B. 碘伏
C. 75% 乙醇
D. 洗必泰
E. 苯扎溴铵
49. 不符合无菌技术操作原则的是
A. 无菌包须有标记和消毒日期
B. 无菌操作时手臂位于腰部水平以上
C. 无菌物品与非无菌物品分别放置
D. 无菌持物钳可夹取所有无菌物品
E. 一份无菌物品供一位病人使用一次
50. 取用无菌溶液,正确的是
A. 取用前首先检查溶液性状
B. 手指可少量触及瓶盖内面
C. 倒溶液时可将瓶口触及无菌容器,以防滴漏
D. 将无菌敷料直接伸入瓶内蘸溶液
E. 溶液未用完,注明开瓶日期和时间并签名
51. 为长期应用激素病人做口腔护理时,应注意观察
A. 口腔粘膜有无溃疡
B. 口腔有无特殊的气味
C. 口腔粘膜有无真菌感染

- D. 口腔粘膜有无出血点
E. 口唇有无干裂
52. 口唇干裂病人口腔护理后可涂
A. 西瓜霜
B. 锡类散
C. 冰硼散
D. 金霉素软膏
E. 液状石蜡
53. 为卧床病人进行床上洗头适宜的水温是
A. $28^{\circ}\text{C} \sim 32^{\circ}\text{C}$
B. $40^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
C. $45^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
D. $20^{\circ}\text{C} \sim 22^{\circ}\text{C}$
E. 50°C 以上
54. 为卧床病人床上擦浴时下列操作错误的是
A. 调节室温至 24°C 左右
B. 遮挡病人, 按需要给予便盆
C. 脱衣应先对侧后脱近侧
D. 为外伤病人先脱健侧后脱患侧
E. 擦浴后骨突处用 50% 乙醇作按摩
55. 褥疮的易发部位是
A. 髌部
B. 背部
C. 腹部
D. 头部
E. 骶尾部
56. 褥疮淤血红润期的特点是
A. 局部皮肤出现红肿热触痛
B. 皮下产生硬结
C. 表皮有水疱
D. 浅层组织感染
E. 局部组织坏死
57. 帮助病人整理床单位的目的不包括
A. 使病床平整
B. 使病人舒适
C. 减少细菌
D. 预防褥疮
E. 保持病室整洁美观
58. 卧床病人更换床单时错误的操作是
A. 移开床旁桌椅
B. 将清洁被服按顺序放于床尾椅上
C. 松开床尾盖被助病人侧卧
D. 松开近侧各层被单
E. 先扫床尾再扫床头
59. 晚间护理的内容不包括
A. 帮助病人入睡
B. 观察病情
C. 进行生活护理
D. 必要时给病人加盖被
E. 饮食指导
60. 关于体温生理性变化的叙述正确的是
A. 清晨 2 ~ 6 时体温最低
B. 下午 2 ~ 8 时体温最高
C. 昼夜体温变动范围不超过 1°C
D. 与人体活动有关
E. 与机体代谢的相应周期变化有关
61. 以口腔温度为标准, 低热的范围是
A. 35°C 以下
B. $35^{\circ}\text{C} \sim 36^{\circ}\text{C}$
C. $36.6^{\circ}\text{C} \sim 37.5^{\circ}\text{C}$
D. $37.3^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$
E. $38.1^{\circ}\text{C} \sim 38.5^{\circ}\text{C}$
62. 为高热病人护理, 下列哪项不妥
A. 密切观察病情变化
B. 测体温每天二次
C. 冰袋冷敷头部
D. 口腔护理每天 2 ~ 3 次
E. 鼓励多饮水
63. 绀脉常见于
A. 发热病人
B. 房室传导阻滞病人
C. 洋地黄中毒病人
D. 心房纤维颤动病人

- E. 甲亢病人
64. 测量脉搏错误的方法是
- A. 用食指中指和无名指诊脉
 - B. 病人剧烈活动后应休息 20 分钟后再测
 - C. 异常脉搏需测 1 分钟
 - D. 绌脉者先测心率,后测脉率
 - E. 偏瘫病人选择健侧肢体测脉
65. 蝉鸣样呼吸多见于
- A. 喉头水肿
 - B. 代谢性酸中毒
 - C. 气管内分泌物蓄积
 - D. 呼吸衰竭
 - E. 高热缺氧
66. 测量呼吸时护士的手不离开诊脉部位是为了
- A. 保持病人体位不变
 - B. 转移病人注意力
 - C. 易于计时
 - D. 对照呼吸与脉搏的频率
 - E. 观察病人面色
67. 当从听诊器中听到第一声搏动时,袖带内压力
- A. 等于心脏收缩压
 - B. 大于心脏收缩压
 - C. 小于心脏收缩压
 - D. 等于心脏舒张压
 - E. 小于心脏舒张压
68. 当测得病人血压异常时,下列护理工作哪项不妥
- A. 与病人的基础血压值对照后给其解释
 - B. 密切观察其他症状
 - C. 及时与医生联系并协助处理
 - D. 病人血压较高应嘱卧床休息
 - E. 病人血压过低应速安置头低脚高位
69. 物理降温 30 分钟后测得体温给别符号是
- A. 红虚线红点
 - B. 红虚线红圈
 - C. 蓝虚线蓝点
 - D. 蓝虚线蓝圈
 - E. 红虚线蓝圈
70. 下列哪项是主要的产热营养素
- A. 维生素
 - B. 碳水化合物
 - C. 水
 - D. 无机盐
 - E. 膳食纤维
71. 低盐饮食每日限用食盐量不超过
- A. 2g
 - B. 4g
 - C. 6g
 - D. 8g
 - E. 10g
72. 评估病人的营养状况不包括
- A. 体重
 - B. 皮下脂肪厚度
 - C. 机体发育状况
 - D. 精神状态
 - E. 活动量
73. 协助病人进食,下列哪项不妥
- A. 危重病人应耐心喂食
 - B. 双目失明病人应告知食物名称
 - C. 不能经口进食者,可采用鼻饲
 - D. 进流质饮食者可用吸管吸吮
 - E. 家属带来食物给予食用
74. 鼻饲的适应病人不包括
- A. 昏迷
 - B. 口腔疾患
 - C. 早产婴
 - D. 拒绝进食
 - E. 偏食者
75. 长期鼻饲病人胃管更换应为
- A. 每日一次
 - B. 隔日一次

- C. 每周一次
 - D. 每周二次
 - E. 每月一次
76. 不需每日记录出入液量的病人是
- A. 休克
 - B. 大面积烧伤
 - C. 心脏病
 - D. 肾病
 - E. 阑尾炎
77. 出入液量的记录内容下列哪项正确的
- A. 每日摄入量主要记录饮水量
 - B. 固体食物只记单位个数
 - C. 病人饮水容器应固定,并测定容量
 - D. 每日排出量主要记录粪便量尿量
 - E. 伤口渗出液需观察不记录
78. 记录 24 小时液量下列哪项是错误的
- A. 用蓝钢笔填写眉栏项目
 - B. 晨 7 时至晚 7 时用蓝笔
 - C. 晚 7 时至次晨 7 时用红笔
 - D. 每班护士交班前作出入量小结
 - E. 24 小时总出入液量用红笔写在体温单相应栏目内
79. 热疗的目的不包括下列哪一项
- A. 促进炎症的消散和局限
 - B. 减轻深部组织充血
 - C. 解除疼痛
 - D. 制止炎症扩散或化脓
 - E. 保暖
80. 昏迷病人用热水袋水温不可超过
- A. 30℃
 - B. 40℃
 - C. 50℃
 - D. 60℃
 - E. 70℃
81. 冷疗控制炎症扩散的机制是
- A. 增强白细胞的吞噬功能
 - B. 降低细菌的活力
 - C. 降低神经的兴奋性
 - D. 溶解坏死组织
 - E. 增强免疫功能
82. 高热病人用乙醇擦浴时冰袋应置于
- A. 头部
 - B. 枕部
 - C. 颈部
 - D. 腋下
 - E. 足底
83. 膀胱炎时,新鲜尿液有
- A. 烂苹果味
 - B. 氨臭味
 - C. 腥味
 - D. 大蒜味
 - E. 苦味
84. 发生溶血反应时,尿液颜色呈
- A. 鲜红色
 - B. 酱油色
 - C. 乳白色
 - D. 黄褐色
 - E. 淡黄色
85. 膀胱肿瘤病人采用导尿术的目的是
- A. 放出尿液,减轻痛苦
 - B. 取不受污染的尿标本作细菌培养
 - C. 测量膀胱容量
 - D. 检查残余尿
 - E. 进行膀胱腔内化疗
86. 为女病人导尿操作下列哪项是错的
- A. 病人取仰卧屈膝位
 - B. 脱下近侧裤腿盖到对侧腿上
 - C. 初次消毒外阴顺序由外向内自上而下
 - D. 第二次消毒顺序由内向外自上而下
 - E. 导尿管插入尿道 4~6cm
87. 上消化道出血病人粪便呈
- A. 黄褐色
 - B. 果酱样
 - C. 柏油样

- D. 陶土色
E. 水样
88. 下列哪一因素可引起便秘
- 大量使用镇静剂
 - 肠道感染
 - 神经系统受损
 - 缓泻剂
 - 大量活动
89. 便秘病人健康教育不正确的是
- 定时排便
 - 多吃蔬菜
 - 卧床病人少活动
 - 每天摄入液体 1500ml
 - 适当食用油脂类食物
90. 大量不保留灌肠的目的不包括
- 解除便秘
 - 高热病人降温
 - 肠道手术前准备
 - 分娩前准备
 - 治疗肠道感染
91. 0.1% ~ 0.2% 肥皂液禁用于
- 高热病人
 - 便秘病人
 - 心衰病人
 - 肝昏迷病人
 - 肾炎病人
92. 小量不保留灌肠适用于
- 镇静催眠
 - 肠道感染
 - 消化道出血
 - 降温
 - 腹部术后肠胀气
93. 保留灌肠的溶液量不宜超过
- 50ml
 - 100ml
 - 150ml
 - 200ml
 - 500ml
94. 保留灌肠时间过长会导致
- 肠痉挛
 - 肠蠕动减慢
 - 排便
 - 肛门括约肌松弛
 - 腹痛
95. 对易风化潮解的药物应放在
- 有色瓶内
 - 阴凉干燥处
 - 密封瓶中
 - 避光纸盒内
 - 冰箱内
96. 不属于“三查”“七对”的内容是
- 床号, 姓名
 - 药名, 浓度, 剂量
 - 方法, 时间
 - 操作前, 操作中查
 - 查用药后反应
97. 下列外文缩写的中文译意, 错误的是
- qod——隔日 1 次
 - qd——每日 1 次
 - hs——每晚 1 次
 - qid——每日 4 次
 - biw——每周 2 次
98. 取药液方法, 下列哪项错误
- 取固体药用药匙
 - 取水剂前将药液摇匀
 - 药液不足 1ml 用滴管吸取
 - 2 种药液可同置一药杯内
 - 油剂药液应倒入盛少量冷开水中
99. 氧气雾化吸入时, 下列哪项错误
- 病人吸入前漱口
 - 药物用蒸馏水稀释药液在 5ml 以内
 - 湿化瓶内不能放水
 - 嘱病人吸气时松开出气口
 - 氧流量为 6 ~ 10L/min

100. 注射时防止感染的主要措施是
- 选择无钩、无弯曲的锐利针头
 - 注意药物配伍禁忌
 - 注射前洗手,戴口罩。注射部位皮肤消毒直径在 5cm 以上
 - 不可在硬结、疤痕处进针
 - 不可用变色、混浊的药物
101. 自安瓿内吸取药液错误的是
- 仔细核查
 - 将安瓿尖端药液弹至体部
 - 用砂轮在颈部划一锯痕,折断安瓿
 - 将针头斜面向下放入安瓿内的液面下吸药
 - 吸药时不能用手握住活塞
102. 皮内注射操作哪项正确
- 皮肤试验取前臂掌侧下段
 - 用稀碘酊消毒皮肤
 - 进针后抽回血
 - 推药液于真皮下
 - 拔针后用干棉签按压
103. 2 岁以下婴幼儿肌肉注射最佳部位是
- 股外侧肌
 - 臀大肌
 - 臀中肌,臀小肌
 - 上臂三角肌
 - 后背
104. 各种注射的定位法哪项正确
- 臀中肌注射:髂前上棘外侧三横指处
 - 臀大肌注射:髂嵴和尾骨连线的外上 1/3
 - 皮内注射:前臂掌侧
 - 皮下注射:肩峰下 2~3 横指
 - 臀小肌注射:髂前上棘与臀裂顶点的外上 1/3 处
105. 股静脉穿刺部位在
- 股动脉内侧 0.5cm 处
 - 股动脉外侧 0.5cm 处
 - 股神经内侧 0.5cm 处
 - 股神经外侧 0.5cm 处
 - 股神经和股动脉之间
106. 在青霉素治疗过程中,下列哪种情况须重做皮试
- 肌肉注射改静脉滴注
 - 肌肉注射每天 2 次改成每天 4 次
 - 病人因故未注射药物
 - 更换不同批号的青霉素
 - 病人病情加重畏冷寒战
107. 有关青霉素快速过敏试验法,错误的是
- 每 ml 试验液含 500u 青霉素
 - 试验液滴在电极板方形头上
 - 试验部位皮肤用注射用水擦净
 - 计时开关开 5 分钟
 - 试验部位皮肤出现白斑,也属阳性反应
108. 不属于过敏性休克的临床表现是
- 胸闷、气急、血压下降
 - 面色苍白、冷汗
 - 头晕眼花、四肢麻木
 - 瘙痒、荨麻疹
 - 全身淋巴结肿大
109. 使用破伤风抗毒素,停药后再用超过多久须重做皮试
- 1 天
 - 3 天
 - 5 天
 - 7 天
 - 9 天
110. 破伤风抗毒素脱敏注射法是
- 所注剂量分四次注射,剂量逐渐递减
 - 所注剂量分四次注射,剂量逐渐递增
 - 所注剂量分五次注射,剂量逐渐递减
 - 所注剂量分五次注射,剂量逐渐递增
 - 所注剂量分四等份,分次注射
111. 细胞色素 C 划痕试验法,每 ml 含量为
- 0.075mg