


国外市售成药介绍



目 录

眼、耳、口腔、喉科用药

眼及眼耳科用药

1. 抗感染剂和防腐剂..... 1—21
2. 皮质激素类.....23—29
3. 含皮质激素的防腐剂.....31—46
4. 扩瞳药和缩瞳药.....47—54
5. 其他药物.....55—68

耳 科 用 药

6. 抗感染剂和防腐剂.....69—71
7. 含皮质激素的防腐剂.....73—75
8. 其他药物.....77

口腔和喉科用药剂

9. 口腔和喉科用药剂.....79—93

皮 肤 科 用 药

1. 抗感染药..... 95—106
2. 含皮质激素的抗感染药.....107—143
3. 局部用皮质激素类.....145—165

- 4. 治痤疮和头皮屑制剂.....167—179
- 5. 防腐剂和消毒剂.....181—193
- 6. 含药的外科敷料.....195—197
- 7. 杀霉菌剂和抗寄生虫药.....199—213

附注：由于皮肤科用药内容过多，影响装订，故将此科用药余下部分放在第八册中编辑出版。

ACETOPT

- 【中文名】(安眼适)
- 【剂 型】滴眼剂
- 【生产厂】Sigma
- 【成 分】磺胺乙酰钠 10%
- 【适应症】眼部感染。
- 【用 法】按说明滴用。
- 【包 装】15ml(2.00)。

ACHROMYCIN

- 【中文名】四环素软膏
- 【剂 型】眼/耳软膏
- 【生产厂】Lederle
- 【成 分】盐酸四环素 1 %
- 【适应症】眼和耳的浅表感染。
- 【用 法】每隔 2 小时直接涂用于眼和耳内患处。
- 【包 装】1/8 俩(1.20)。

ADSORBOPHENICOL

【中文名】(眼速宁)

【剂 型】滴眼剂

【生产厂】Burton, Parsons.

【成 分】聚乙烯吡咯烷酮和水溶性聚合物, 氯霉素
0.5%。

【适应症】由敏感微生物引起的结膜和(或)角膜性眼部浅表感染。

【用 法】2 滴/3 小时或按需滴用。

【包 装】15ml。

ALBUCID

【中文名】(眼病息)

【剂 型】滴眼剂

【生产厂】Nicholas

【成 分】磺胺乙酰钠

【适应症】结膜和眼睑的轻度感染以及眼部工业性损伤。预防眼部感染。

【禁忌症】已知对磺胺类过敏者。

【用 法】按需滴用。

【包 装】10% × 10ml(2,10)。

30% × 10 ml(2,30)。

AUREOMYCIN

【中文名】金霉素软膏

【剂 型】眼科软膏

【生产厂】Lederle

【成 分】盐酸金霉素 1%

【适应症】治疗和预防眼部浅表感染。

【用 法】每隔 2 小时直接敷用于眼部。

【包 装】1/8 呖 (0.70)。

BIOPHTAL

【中文名】(眼复泰)

【剂 型】滴眼剂

【生产厂】Solco Basle

【成 分】氯霉素 0.1%，短杆菌素 0.025%。

【适应症】由革兰氏阳性和阴性菌引起的眼睑、泪腺、角膜和结膜病。

【用 法】遵医嘱。

【包 装】5ml(1.20)。

BLEPH—10

【中文名】(目炎复)

【剂 型】滴眼剂

【生产厂】Allergan

【成 分】磺胺乙酰 10%

【适应症】结膜炎，角膜溃疡和其他眼部浅表感染。

【用 法】遵医嘱。

【包 装】5ml (1.30)。
15ml (1.70)。

BROLENE

【中文名】(扑眼炎)

【剂 型】滴眼剂，软膏

【生产厂】May & Baker

【成 分】滴眼剂：苯脒羟乙磺酸盐 0.1%。

软膏剂：二溴苯脒羟乙磺酸盐 0.15%。

【适应症】慢性结膜炎，特别是由摩一阿二氏杆菌所引起者；某些急性结膜炎。

【用 法】1—2滴/次，2—3次/日，用一周。

【包 装】软膏 5gm (1.90)。

CHLORANSULFA

【中文名】(目耳宁)

【剂 型】眼(耳)溶液

【生产厂】Chibret

【成 分】氯霉素 0.5%，磺胺乙酰钠 10%。

【适应症】眼科疾病：结膜炎，角膜炎，眼色素层炎，沙眼。

耳鼻喉疾病：感染性耳液溢，单纯慢性耳炎。

【用 法】遵医嘱。

【包 装】10ml (1.40)。

CHLOROMYCETIN

【中文名】氯霉素

【剂 型】胶囊，滴眼剂，软膏

【生产厂】Parke Davis

【成 分】氯霉素 1%

【适应症】用于大多数眼病原体的治疗，如细菌性结膜炎，流行性角膜结膜炎、沙眼、泪囊炎等。

【用 法】每 3 小时敷用一次，至少连续用 48 小时，需要时可延长使用时间。

【包 装】胶囊：50 粒 (3.90)。

250 粒 (17.80)。

软膏：3.5gm (1.40)。

滴剂：10ml (2.20)。

CHLORTRALIM

【中文名】金霉素眼膏

【剂 型】眼用软膏

【生产厂】Atlantic

【成 分】盐酸金霉素 1%

【适应症】需用广谱抗生素的眼科感染。

【用 法】每日敷用 1—2 次。

【包 装】1/8 两 (0.50)。

COMYCETIN

【中文名】氯霉素药水

【剂 型】眼(耳)滴剂

【生产厂】Cophar

【成 分】氯霉素

【适应症】急性中耳炎。

【用 法】2—3 滴/次, 3—4次/日

【包 装】2% × 10ml (1.50)。

0.5% × 10ml (1.30)。

CONJUNCTIN

【中文名】(结膜净)

【剂 型】滴眼剂

【生产厂】Allergan

【成 分】新霉素硫酸盐 0.5%, 多粘菌素 B 硫酸盐 5,000单位, 乙苯硫代水杨酸钠(硫柳汞)1:100,000, 液膜辅料 1.4%。

【适应症】急性和慢性感染性结膜炎。

【用 法】每隔 3 — 4 小时滴用 1 — 2 滴。

【包 装】5ml (2.50)。

10ml(4.00)。

注: 液膜辅料: 含聚乙烯醇等成分的辅料作为润湿剂, 可延长药效。

FRAMYGEN

【中文名】(新霉素药水)

【剂 型】眼(耳)滴剂

【生产厂】Fisons

【成 分】新霉素硫酸盐 0.5% (W/W)

【适应症】眼科：睑腺炎，睑炎，结膜炎和其他眼部
浅表感染，角膜磨损。

耳科：外耳炎。

【用 法】1—4滴/次，3—4次/日。

【包 装】5ml (2.40)。

GANTRISIN

【中文名】(目立新)

【剂 型】滴眼剂

【生产厂】Roche

【成 分】磺胺异恶唑 15%

【适应症】眼科中适于用磺胺治疗的所有病症。

【禁忌症】对磺胺不耐受者。

【用 法】遵医嘱。

【包 装】10ml (2.80)。

GARAMYCIN

【中文名】(眼膜净)

【剂 型】眼科软膏, 溶液

【生产厂】Schering USA

【成 分】庆大霉素硫酸盐

【适应症】眼部外表感染, 如结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、睑炎等。

【用 法】1—3次/日。

【包 装】滴剂: 5ml (2.40)。

软膏: 3gm (1.60)。

GLUCOSULMID

【中文名】(眼疾灭)

【剂 型】眼用软膏

【生产厂】Dr. Thilo

【成 分】苯磺胺 5%, 葡萄糖 50%。

【适应症】感染性角膜溃疡, 并发组织坏死的角膜糜烂, 眼肌手术后的坏死。

【用 法】2—3次/日。

【包 装】5gm (2.50)。

HERPIDU

【中文名】(息疱疹)

【剂 型】滴眼剂

【生产厂】Dr.E.Baeschlin

【成 分】5—碘—2—脱氧尿嘧啶核苷(碘苷)0.1%

【适应症】急性单纯疱疹性角膜炎。

【禁忌症】怀疑已受孕的妇女不应使用。

【用 法】白天1滴/小时，滴于眼部患处。夜间每隔2小时涂用软膏一次。

【包 装】10mg (3.20)。

HERPIDU/HERPIDU C

【中文名】(息疱疹/息疱疹C)

【剂 型】眼用软膏

【生产厂】Dr.E.Baeschlin

【成 分】碘苷 0.25% (息疱疹C中加氯霉素1%)

【适应症】急性单纯疱疹性角膜炎。

【禁忌症】怀疑已受孕的妇女禁用。

【用 法】10 mm软膏/2小时。表面疱疹感染部位症状明显改善时，药量即可陆续减少。为防止复发，应在疱疹愈合后继续用药1—2周。

【包 装】息疱疹：4gm (3.50)。

息疱疹C：4gm (3.50)。

HERPLEX

【中文名】(疱疹净)

【剂 型】液膜辅料

【生产厂】Allergan

【成 分】碘苷 0.1%，液膜辅料 1.4%

【适应症】由单纯性疱疹病毒引起的角膜炎。

【禁忌症】对活性成分过敏者。

【用 法】白天每小时，夜间每隔一小时往病眼各滴入一滴；或日夜连续五分钟 1 滴/分，并隔四小时重复一次。

【包 装】15ml (4.50)。

ISOPTO CETAMIDE

【中文名】(炎速灭)

【剂 型】滴眼剂

【生产厂】Alcon

【成 分】磺胺乙酰钠 10 % 或 15%，羟丙基甲基纤维素(4,000厘泊) 0.5%。

【适应症】对磺胺治疗敏感的急、慢性结膜感染，预防措施中有助于获得一无菌区。

【禁忌症】以前显示对磺胺过敏的病人。

【用 法】预防和轻度感染：2 滴/4 小时。

急性感染：2 滴/2 小时。连续用 2 天，
此后 2 滴/4 小时。

【包 装】15% × 5ml (3.10)。

10% × 5ml (1.50)。

ISOPTO FENICOL

【中文名】(炎复克)

【剂 型】滴眼剂

【生产厂】Alcon

【成 分】氯霉素 0.25%，羟丙基甲基纤维素(4,000厘泊) 0.5%。

【适应症】细菌性结膜炎和适用氯霉素治疗的浅表眼部感染。角膜磨损和从角膜移除异物后作预防用。

【禁忌症】以前对氯霉素治疗显示过敏的病人。

【用 法】2 滴/3 小时。

【包 装】5ml (2.40)。

KEMICETINE

【中文名】(克炎仃)

【剂 型】眼用软膏

【生产厂】Carlo Erba

【成 分】氯霉素 1%

【适应症】眼部感染性症状，如睑炎、结膜炎、角膜炎、沙眼等。

【用 法】按说明每日涂用 2 次以上，连续用 5—10 日。

【包、装】5gm (0.80)。

NEBACETIN

【中文名】(炎息定)

【剂 型】眼用软膏

【生产厂】Byk—Gulden

【成 分】新霉素，杆菌肽

【适应症】急性和慢性结膜炎和角膜炎，泪囊炎，角膜的角膜结膜炎性溃疡。

【用 法】按说明用药。

【包 装】2.5gm (1.60)。

NEOSPORIN

【中文名】(抑菌灵)

【剂 型】滴眼剂

【生产厂】Burroughs Wellcome

【成 分】每ml含：硫酸多粘菌素B 5,000单位，硫酸新霉素 1,700单位，短杆菌肽 0.025mg。

【适应症】由敏感菌引起的眼部细菌性感染的预防和治疗。

【禁忌症】对新霉素、卡那霉素和巴龙霉素过敏者禁用。

【用 法】往病眼中滴用1—2滴/次，2—4次/日。需要时可多用几次，(仅限局部用)。

【包 装】5ml (2.70)。