

〔清〕

葉桂

周學海

著

注

幼 科 要 略

中國醫學大成續集

幼科要略提要

清·葉桂著。桂字天士。號香岩。江蘇吳縣人。周學海注。學海字澂之。皖南建德人。上卷、首列總論。次伏氣、風溫、夏熱、受熱、厥逆、疳、口疳、脹、備用各方、吐瀉、霍亂、食瓜果泄瀉、瘧、痢、秋燥冬寒。下卷、列看三關法。痧疹、痘證、驚疳、春溫、風溫、暑熱各案。徐洄溪評云。痘疹諸案。切近和平之法。又能沉着變化。備前人之所未備。去其疵而取其純。我郡有如此名家。而不師法。偏拾庸妄人唾餘。不論何人。不問虛實。總以大黃石膏種種惡毒之藥。大劑灌死。每當出痘發疹之年。枉死載道。全不知慘。此等庸醫。皆有豺狼之心也云云。當時蘇醫之品類不齊。於此可見。如香岩先生有學識經驗。能臨機應變。誠不可多得。是書更由周學

海加以增訂。益臻完備。誠兒科中治時感痘瘡之良法也。

幼科要畧上篇

古吳葉桂天士甫著 皖南建德周學海澂之注

總論

按襁褓小兒。體屬純陽。所患熱病最多。世俗醫者。固知謂六氣之邪。皆從火化。飲食停留。鬱蒸變熱。驚恐內迫。五志動極。皆陽。奈今時治法。初則發散解肌。以退表熱。仍混入消導。繼用清熱苦降。或兼下奪。再令病家禁絕乳食。每致胃氣索然。內風來乘。變見驚癇。告斃甚多。附記世俗通套之方藥於左。不可不知。不足取法。按純陽二字。須善體會。是生氣之極旺。非陽氣之已充也。張景岳已有辨論。所臚治法。亦非全不可用。只在用之得宜。惟禁絕乳食一層。近日淮揚一帶。竟有兒病日久。父母坐視其餓死者。而胃

氣衰竭。致邪內陷。更不待言。真堪髮指。只因將節字。誤認作絕字。遂致流弊如此。

防風 荊芥 葛根 前胡 桔梗 木通

赤芍 荀子 厚朴 陳皮 山查 麥芽

枳殼 神麴 鈎藤 夏佐香 薷冬 佐麻黃 羌活

兩三日熱不解

柴胡 前胡 黃連 黃芩 山梔 連翹

薄荷 葛根 木通 鈎藤 厚朴 枳實

瓜萸實 九劑必用大黃

四五日不解。但言食滯未盡。表裏不和。總以柴芩小陷胸。若嘔逆煩渴。用竹茹黃連半夏。若痰多喘促。卽用葶藶杏仁蘇子荀子胆星貝母。甚者加牛黃。此皆

套法。所當戒也。

屢清消不愈。便無方法。苟不變驚。必曰蒸骨孩勞。所用藥餌。不分氣血陰陽。但知見症施治。如早涼暮熱。必用

地骨皮 丹皮 生地 元參 甘草 北沙參

石斛 知母

有痰加

蘇子 杏仁 貝母 橘紅 膽星 桔梗

其鈎藤 石斛 茯苓 穀芽之屬。每劑必用。總之。取無故

疲藥。待其自愈。倘有變證。希冀掩飾而已。徐靈胎曰。此等藥總

在用之得宜。不對證。則不拘何味。皆能爲害。不必錄出。垂戒。反滋疑惑。

按嬰兒肌肉柔脆。不耐風寒。六府五藏氣弱。乳汁難化。內外二因之病自多。然有非風寒竟致外感不停滯已屬內傷。其故何歟。嘗思人在氣交之中。春夏地氣之升。秋冬天令之降。呼出吸入。與時消息。間有穢濁吸入。卽是三焦受邪。過募原。直行中道。必發熱煩躁。倘幼醫但執前藥。表散消導。清火通便。病輕或有倖成。病重必然顛覆。錢仲陽云。糞履不可近襁褓小兒。余言非無據矣。四十年來。治效頗多。略述其槩云。

按穢濁吸入。由三焦直行中道。意指溫熱之類。竊謂風寒亦有從口鼻吸入者。入肺則令人驟然狂。既入胃則令人營衛不調。微見寒熱者有之。治法不宜發汗。用麻黃羌活走表。每致大汗而病如故。須調氣溫中息風。如桂枝生薑吳萸陳皮之品。則

自愈矣。若欬吐後復大發熱者。此毛竅亦復受邪。宜兼表散。又或因欬吐引動伏邪。宜參用風溫之法矣。

夫春溫夏熱秋涼冬寒。四時之序也。春應溫而反大寒。夏應熱而反大涼。秋應涼而反大熱。冬應寒而反大溫。皆不正之乖氣也。病自外感治從陽分。若因口鼻受氣。未必恰在足太陽經矣。大凡吸入之邪。首先犯肺。發熱咳喘。口鼻均入之邪。先上繼中。咳喘必兼嘔逆腹脹。雖因外邪。亦是表中之裏。設宗世醫發散陽經。雖汗不解。幼稚質薄神怯。日期多延。病變錯綜。茲以四氣常法列左。

按前日嬰兒肌肉柔脆。此日質薄神怯。豈得謂爲純陽。任意攻奪。

伏氣

春溫一症。由冬令收藏未固。昔人以冬寒內伏。藏於少

陰。入春發於少陽。以春木內應肝胆也。寒邪深伏。已

經化熱。昔賢以黃芩湯爲主方。苦寒直清裏熱。熱伏

於陰。苦味堅陰。乃正治也。知溫邪忌散。不與暴感門

同法。若因外邪先受。引動在裏。伏熱必先辛涼以解。

新邪。繼進。苦寒以清裏熱。況熱乃無形之氣。幼醫多

用消滯。攻治有形。胃汁先涸。陰液劫盡者多矣。按伏

新邪。引動而發者最多。或因風熱。或因風寒。或因

飲食。或因勞倦。但新舊兩邪。各有輕重不同。如新

邪輕。一工日後。已自無迹。自可一意清理。伏邪如

新邪重。斷宜急祛。兩邪相併。便難措手。常見外寒

激動。伏熱遷延日久。熱邪充滿。膈中淫溢。腠理而

寒邪避入。經絡脂膜。雖偏身大熱。日日出汗。寒自

品。乃能發疹而愈。此法世竟無知者。

備用方

黃芩湯

蔥豉湯

新邪引動伏邪

涼膈散

清心涼膈散

風溫

風溫者。春月受風。其氣已溫。經謂春氣病在頭。治在上焦。肺位最高。邪必先傷。此手太陰氣分先病。失治則入手厥陰心胞絡。血分亦傷。蓋足經順傳。如太陽傳陽明。人皆知之。肺病失治。逆傳心胞絡。幼科多不知者。俗醫見身熱咳嗽。不知肺病在上之旨。妄投荊防。

柴葛加入枳朴杏蘇。荀子查麥廣皮之屬。輒云解肌消食。有見痰喘。便用大黃。蒙石滾痰丸。大便數行。上熱愈結。幼穉穀少胃薄。表裏苦辛。化燥胃汁已傷。復用大黃大苦。沉降丸藥。致脾胃陽和傷極。陡變驚癇。莫救者多矣。

按此症風溫肺病。治在上焦。夫風溫春溫忌汗。初病投劑宜用辛涼。若雜入消導發散。不但與肺病無涉。劫盡胃汁。肺乏津液。上供頭目清竅。徒爲熱氣薰蒸。鼻乾如煤。目瞑。或上竄無淚。或熱深肢厥。狂躁溺瀉。胸高氣促。皆是肺氣不宣。化之徵。斯時若以肺藥少加一味清降。使藥力不致直趨腸中而上痺。可開諸。

竅自爽。無如城市庸醫。僉云結胸。皆用連蔓柴枳苦寒直降。閉塞愈甚。告斃甚多。

按此症初因發熱喘嗽。首用辛涼。清肅上焦。如薄荷連翹牛蒡象貝桑葉沙參梔皮蘘皮花粉。若色蒼熱勝煩渴。用石膏竹葉辛寒清散。痧症亦當宗此。若日數漸多。邪不得解。苓連涼膈。亦可選用。至熱邪逆傳入膈中。神昏目暝。鼻竅無涕淚。諸竅欲閉。其勢危急。必用至寶丹。或牛黃清心丸。病減後。餘熱只甘寒清養胃。陰足矣。按首用辛涼。清肅上焦。須是認定風溫。咳聲緊悶。便不可用。誤用卽閉邪成癆怯。

備用方

葦莖湯

清心涼膈散

涼膈散

瀉白散

葶薈大棗湯

白虎湯

至寶丹

清心牛黃丸

竹葉石膏湯

喻氏清燥救肺湯

夏熱

夏爲熱病。然夏至已前。時令未爲大熱。經以先夏至病溫。後夏至病暑。溫邪前已申明。暑熱一症。幼醫易眩。夏暑發自陽明。古人以白虎湯爲主方。後賢劉河間創議。迥出諸家。謂溫熱時邪。當分三焦。投藥以苦辛寒爲主。若拘六經分症。仍是傷寒治法。致悞多矣。蓋傷寒外受之寒。必先從汗解。辛溫散邪。是已。口鼻吸入之寒。卽爲中寒。陰病治當溫。裏分三陰。見症施治。若夫暑病。尙方甚少。皆因前人略於暑。詳於寒耳。考古如金匱暑暍瘧之因。而潔古以動靜分中。暑中熱各具至理。茲不槩述。論幼科病暑熱。夾雜別病有諸。而時下不外發散消導。加八香薷一味。或六一散一。

服。考本草。香薷辛溫發汗。能泄宿水。夏熱氣閉無汗。渴飲停水。香薷必佐杏仁。以杏仁苦降泄氣。大順散取義若此。長夏溼令。暑必兼溼。暑傷氣分。溼亦傷氣。汗則耗氣傷陽。胃汁大受劫燄。變病由此甚多。發泄司令。裏真自虛。張鳳達云。暑病首用辛涼。繼用甘寒。再用酸泄微斂。不必用下。可稱要言不煩矣。然幼科因暑熱蔓延。變生他病。茲摘其槩。按口鼻吸入之寒。輕者不得爲中寒。而總屬陰病。其重者爲中寒。其之理已詳注前節。先生真先得我心者。至於溫暑起手。即用辛涼甘寒。直須認定不夾風寒。方可。若因風寒久閉。內氣化熱。便當別議。內化熱而外寒已開者。或從燥熱。或從溼熱。隨證治之。外寒仍閉者。其內必非真熱。只是衛陽內陷。治宜鼓舞正氣。衛通寒解。而熱自消散。

受熱厥逆

夏令受熱。昏迷若驚。此爲暑厥。卽熱氣閉塞孔竅所致。其邪入絡。與中絡同法。牛黃丸至寶丹。芳香利竅可效。神甦以後。用清涼血分。如連翹心竹葉心玄參細生地鮮生地二冬之屬。此症初起。大忌風藥。初病暑熱傷氣。竹葉石膏湯。或清肺輕劑。大凡熱深厥深。四肢逆冷。但看面垢齒燥。二便不通。或瀉不爽。爲是大忌。誤認傷寒也。按熱性散越。何致閉塞。此必乘風飲冷。所迫觀起。手用芳香通竅。可知矣。若真因暑汗太過。肺氣不續。津液內傷。燥火燔灼。以致昏厥。尙可用此。速其散脫耶。

疳

幼兒斷乳納食。值夏月脾胃主氣。易於肚膨泄瀉。頭熱。

手足心熱。形體日瘦。或煩渴善食。漸成五疳積聚。當審體之強弱。病之新久。有餘者。當疏胃清熱。食不入。糞色白。或不化。當健脾。佐消導清熱。若溼熱內鬱。蟲積腹痛。導滯驅蟲。微下之。緩調。用肥兒丸之屬。

口疳

夏季秋熱。小兒泄瀉。或初愈未愈。滿口皆生疳蝕。嘗有阻塞咽喉致危者。此皆在裏。溼盛生熱。熱氣蒸灼。津液不升。溼熱偏傷氣分。治在上焦。或佐淡滲。世俗常刮西瓜翠衣治疳。取其輕揚滲利也。

脹

夏季溼熱鬱蒸。脾胃氣弱。水穀之氣不運。溫着內蘊爲