



FUCHANKE
KAOTIJE

妇产科考题

以何
进行
二十

病。系
腔所
了

生 出 版 社

人 民

妇产科考题解

(供从事妇产科工作的医务人员)
(和医学院校学生复习用)

乐 杰 张崇德 编译

人 民 卫 生 出 版 社

妇 产 科 考 题 解

乐 杰 **张崇德** 编译

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京市崇文区天坛西里10号)

北 京 印 刷 一 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 10印张 4插页 222千字

1981年11月第1版第1次印刷

印数：1—62,100

统一书号：14048·4075 定价：1.10元

编译者的话

适应妇产科医务人员自学提高和医学院校学生复习课程的需要,按照人民卫生出版社1980年出版的全医学院校试用教材《妇产科学》的内容,结合我国实际选择了1954年至1980年共54次的日本医师国家考妇产科部分内容,并在此基础上,加以相当数量的增减和修改,编译成这本《妇产科考题解》。

书共有考题706个。根据考题的形式不同,共分为十,并附有答案和注解。尽量作到考题形式新颖,理论实际,内容重点突出,涉及范围广泛;重视思维能力的掌握妇产科知识的准确性和牢固性。建议读者暂先不,自己动脑筋做题,必要时还可以参考全国统一教材《妇产科学》。我们相信,如果能认真地将本书全部考题进行对巩固妇产科的基本理论和基本知识会有裨益。二十教学实践,使我深深感到编译一本《妇产科考题解》要。

书插图系由李春昌同志绘制,谨致谢意。

于编译者水平有限,加之时间仓促,缺点和错误在所,恳切希望同道和读者们提出宝贵意见,以便再版时订

白求恩医科大学
二院妇产科教研室

乐 杰

1980. 11.

有关考题内容的几点说明

(一) 考题中带有*符号者,表明该项具体内容在该考题的答案中有注解,以答题后再参阅为好。带*符号的注解系编者增添的,相信对部分读者可能会是有用的。

(二) 我国目前多以子宫底高度判断妊娠月份,比较笼统;而国外则均用子宫底长度(厘米)来描述。考题保留日本国家考题的子宫底长度内容,此处作一对照表,供参考。

妊娠各周子宫底高度和子宫底长度对照表

妊娠周数	子宫底高度 [△]	子宫底长度(厘米) [△]
20周末	脐下1横指	18.3 (15.3~21.4)
24周末	脐上1横指	23.6 (22.0~25.1)
28周末	脐上3横指	26.1 (22.4~29.0)
32周末	脐与剑突之间	29.3 (25.3~32.0)
36周末	剑突下2横指	31.5 (29.8~34.5)
40周末	脐与剑突之间或略高	33.3 (30.0~35.3)

[△]根据《妇产科学》,人民卫生出版社1980年版,第78页。

[△]根据上海第一医学院妇产科医院《胎儿宫内生长情况估计》,中华妇产科杂志,4:193,1939。

(三) 我国目前习惯用相当于妊娠多少周来描述子宫或附件肿物的大小,而日本考题中则多用雀卵、鸡卵、鹅卵大小描述,为不更改原题,请答题者自行换算。

(四) 本书仍保留以外国人名命名的综合征,因某些综合征如只用译文时,就已知其中内容了。为了照顾不同读者水平,有关综合征的内容多作了注解。

目 录

- ✓ 第一部分考题(总计 404 题) (1)
 - 采用数个答案选答法
 - 一、妇产科基础知识考题 (70 题) (1)
 - 二、产科考题 (235 题) (22)
 - 三、妇科考题 (75 题) (89)
 - 四、计划生育考题 (14 题) (110)
 - 五、无范围考题 (10 题) (117)
- 第二部分考题(总计 37 题) (122)
 - 采用语句左右内容相符或不符法
- ✓ 第三部分考题(总计 28 题) (133)
 - 采用括号内填空法
- ✓ 第四部分考题(总计 15 题) (145)
 - 采用 2~3 项内容相配法
- ✓ 第五部分考题(总计 9 题) (155)
 - 采用正确划“○”、错误划“×”法
- 第六部分考题(总计 100 题) (160)
 - 采用简要病历之后选答法
- 第七部分考题(总计 17 题) (215)
 - 采用填表答题法
- 第八部分考题(总计 20 题) (226)
 - 采用括号内给数个答案选答法
- ✓ 第九部分考题(总计 20 题) (231)
 - 采用问答式

第十部分考题(总计 20 题).....(236)

形式多样,为自我考核,请自判卷

第十一部分考题(总计 40 题).....(243)

*

*

*

答案及注解

第一部分答案(257)

一、妇产科基础知识答案(257)

二、产科答案(258)

三、妇科答案(264)

四、计划生育答案(265)

五、无范围答案(265)

第二部分答案(267)

第三部分答案(270)

第四部分答案(281)

第五部分答案(286)

第六部分答案(288)

第七部分答案(293)

第八部分答案(301)

第九部分答案(305)

第十部分答案(包括各题分数、扣分项目)(312)

第十一部分答案(315)

第一部分考题

这部分的考题数量最多，区分为妇产科基础知识、产科、妇科、计划生育、无范围五大类，共有404个考题。是采用提出问题后，给予数个答案，任你选择的办法。请先看完各题的全部内容，然后在最后的a、b、c、……中选择一个你认为是正确的答案，并用V在其左上方标出。

一、妇产科基础知识考题

1. 下述哪项是从宫颈部到达骨盆侧壁的韧带？

- a 子宫圆韧带。
- b ☒ 主韧带(子宫颈横韧带)。
- c 子宫骶骨韧带。
- d 卵巢固有韧带。
- e 骨盆漏斗韧带。

2. 下述哪种脏器是由外胚层发生的？

- a 垂体前叶。
- b 心脏。
- c 消化器官。
- d 骨骼肌。
- e 上述各脏器皆非来自外胚层。

3. 当切除附件时，必须切断哪几对韧带？

- (1) 骨盆漏斗韧带。
- (2) 子宫圆韧带。
- (3) 子宫颈横韧带。

(4) 子宫阔韧带。

(5) 卵巢固有韧带。

a (1)(2)(3) b (1)(2)(5) c (1)(4)(5)

d (2)(3)(4) e (3)(4)(5)

4. 下述哪两项是正确的？

(1) 子宫圆韧带终止于大阴唇前端。

(2) 子宫动脉是从髂外动脉分支的。

(3) 右侧卵巢静脉注入右肾静脉。

(4) 主韧带从子宫体部达到骨盆侧壁。

(5) 阴道下 $\frac{1}{3}$ 段(将阴道分为上、中、下3段,指其下段)

的淋巴管注入到腹股沟浅淋巴结。

a (1)(2) b (1)(5) c (2)(3)

d (3)(4) e (4)(5)

5. 子宫动脉从下述的哪条动脉分支？

a 髂内动脉。

b 髂外动脉。

c 上臀动脉。

d 卵巢动脉。

e 股动脉。

6. 右侧卵巢动脉是从哪条动脉分支的？

a 髂内动脉。

b 髂外动脉。

c 肾动脉。

d 腹主动脉。

e 髂总动脉。

7. 下述各项, 哪些是正确的？

(1) 子宫体部的淋巴液, 也可直接沿圆韧带流入腹股沟深

淋巴结。

(2) 阴道动脉为腹下动脉前干的分支。

(3) 阴道下段的淋巴液，首先流入髂内淋巴结。

(4) 膀胱神经是从闭孔神经分支的。

(5) 侧脐韧带是从髂外动脉分支的。

a (1)(2) b (1)(5) c (2)(3)

d (3)(4) e (4)(5)

8. 下述各项，哪项是错的？

a 前庭大腺位于大阴唇后部。

b 输卵管和卵巢常被称为子宫附件，简称附件。

c 子宫体与子宫颈之比，成人为 1:1，婴儿为 1:2。

d 子宫内膜分为基底层和功能层。功能层又分为两层，表层是致密层，其下是海绵层。

e 子宫体与子宫颈之间形成的最狭窄部分，称为子宫峡部。

9. 下述各项，哪些是正确的？

(1) 丘脑下部能分泌与性腺有关的释放激素，称为促性腺素释放激素 (Gn-RH)。

(2) 女性丘脑下部可能存在两个调节中枢(即持续中枢和周期中枢)，控制着促性腺素释放激素的释放。

(3) 丘脑下部的持续中枢，是女性所特有的。

(4) 丘脑下部通过门脉循环与垂体后叶密切联系。

(5) 卵巢分泌的雌激素和孕酮，可以影响促性腺素释放激素的分泌和释放，称为反馈作用。

a (1)(2)(3) b (1)(2)(5) c (1)(3)(4)

d (2)(3)(4) e (3)(4)(5)

10. 下述各项，哪项是错的？

- a 骨盆底的中层是泌尿生殖隔，内层是盆隔。
- b 出生后 28 天内称为新生儿期。
- c 围产期一般指从妊娠第 28 周至出生后 7 天的一段时间。
- d 月经初潮是青春期开始的一个重要标志。
- e 在新生儿的卵巢内约有 10 万左右的生长卵泡。

11. 下述各项，哪些是错的？

- (1) 前列腺素不仅由前列腺产生，几乎全身各重要组织均有，只是有数量多少的区别。
- (2) 内源性前列腺素不参与排卵过程。
- (3) 子宫内膜不能合成前列腺素。
- (4) 分泌期子宫内膜因产生较多的前列腺素 $F_{2\alpha}$ ，故不能引起子宫收缩。

(5) 前列腺素与痛经有关。

a (1)(2)(3) b (1)(2)(5) c (1)(3)(4)

d (2)(3)(4) e (3)(4)(5)

12. 下述各项，哪几项是正确的？

- (1) 羊水是静止不动的。
- (2) 妊娠中期，胎儿尿液可能是羊水的主要来源。
- (3) 妊娠早期，羊水来自羊膜的分泌。
- (4) 妊娠 36~38 周时，羊水量最多，约为 1,000 毫升。
- (5) 妊娠早期的羊水无色透明，妊娠足月的羊水略混浊，不透明。

a (1)(2)(3) b (1)(2)(5) c (2)(4)(5)

d (2)(3)(4) e (3)(4)(5)

13. 在子宫内膜的腺上皮细胞内出现核下空泡时，生理上相当于内膜周期的哪一期？

- a 增生早期。
- b 增生晚期。
- c 排卵期。
- (d) 分泌早期。
- e 分泌晚期。

14. 关于正常阴道脱落细胞涂片像的各项中，哪一项是正确的？

- a 角化系数受孕激素影响而升高。
- b 角化上皮细胞的胞浆，以巴氏 (Papanicolaou) 染色为蓝色。
- c 角化上皮细胞的细胞与核的比值 (细胞/核) 是较大的。
- d 腺上皮细胞一般比鳞状上皮细胞大。
- e 阴道上皮细胞的核，越到表层越大。

15. 下述各项，哪项是正确的？

- (1) 卵巢的卵泡内膜细胞与雌激素分泌有关。
- (2) 月经周期的长短，通常是由增生期所决定的。
- (3) 月经期剥脱的子宫内膜，为致密层和海绵层。
- (4) 妊娠时出现的蜕膜细胞，是结缔组织发生上皮样变化的结果。

- a (1)(3)(4) b (1)(2) c (2)(3)
- d (4) e (1)~(4)全对

16. 请指出下述哪项内容不符合性周期生理情况？

- a 月经期終了时，丘脑下部的黄体生成素释放激素 (LH-RH)，立即发生作用。
- b 黄体生成素释放激素 (LH-RH) 作用于垂体前叶，由垂体前叶分泌黄体生成素 (LH)。

- c 黄体生成素使成熟卵泡发生排卵，形成黄体。
- d 黄体分泌雌激素及孕酮。
- e 如无受精卵着床，则黄体性激素急速减量，出现月经。

17. 下述各项，哪些项是正确的？

- (1) 子宫动脉是从髂内动脉分支的。
 - (2) 前庭大腺开口于前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内。
 - (3) 外阴淋巴的大部分注入腹股沟浅淋巴结。
 - (4) 子宫峡部是指从解剖学内口到组织学内口部分。
- a (1)(3)(4) b (1)(2) c (2)(3)
d (4) e (1)~(4)全对

18. 下述各项，哪些是错的？

- (1) 阴道下1/3段的淋巴液注入腹股沟浅淋巴结。
- (2) 卵巢髓质内含有成熟卵泡。
- (3) 男女性别在外阴部明显的区分时期，是在妊娠7周左右。
- (4) 子宫动脉是从髂内动脉分支的。
- (5) 左右副中肾管（Müller氏管）的最初纵列部分衍化为输卵管。

- a (1)(2) b (1)(5) c (2)(3)
d (3)(4) e (4)(5)

19. 下述各项中，哪些项是错的？

- (1) 子宫颈外口柱状上皮与鳞状上皮交界处，是子宫颈癌的好发部位。
- (2) 输卵管粘膜受性激素的影响，也有周期性的组织变化，但不如子宫内膜明显。

(3) 腹股沟浅淋巴结和腹股沟深淋巴结均汇入髂外淋巴结组。

(4) 内生殖器淋巴分为髂淋巴组及腰淋巴组。

(5) 子宫颈两侧淋巴可沿圆韧带进腹股沟浅淋巴结。

a (1)(2) b (1)(5) c (2)(3)

d (3)(4) e (4)(5)

20. 下述各项中哪项是错的?

a 排卵通常发生在下次月经第一天逆算(向回推算)12~16天。

b 即将到排卵期时, 宫颈粘液量增多。

c 刚排卵后, 子宫内膜腺细胞内出现核下空泡。

d 在基础体温呈高温相时, 卵巢分泌孕激素。

e 在月经前期所作的阴道涂片上, 嗜酸性表层细胞增多。

21. 下述哪种脏器对放射线具有较高的敏感性?

a 骨。

b 卵巢。

c 食管。

d 心脏。

22. 下述各项中, 哪项是错的?

a 卵子的寿命一般在48小时以内。

b 卵子是人体正常细胞中最大的细胞。

c 孕卵的内层是滋养层。

d 孕卵着床通常在子宫体部的内膜处。

e 宫内节育器(IUD)的避孕效果是妨碍着床。

23. 下述各项中, 哪项是错的?

a 受精通常是在输卵管壶腹部进行的。

- b 受精卵经过桑椹期发育至囊胚期。
- c 受精卵于囊胚期着床(植入)。
- d 受精卵通常是在子宫内膜腺腔内着床的。
- e 着床后的孕卵分化为外胚层和内胚层。

24. 下述各项中, 哪项是正确的?

a 排卵是成熟卵泡受生乳素 (prolactin) 作用下发生的。

b 在月经周期中, 雌激素分泌过程中有两次高峰, 其一在排卵前, 另一约在排卵后 7~8 天黄体成熟时。

c 妊娠黄体的功能是单靠垂体前叶分泌的生长激素 (GH) 来维持着的。

d 受精卵在桑椹期着床。

e 胎盘绒毛上皮只有一层合体细胞。

25. 下述各项, 哪项是正确的?

a 绒毛间隙充满着新鲜动脉血液。

b 前羊水是指羊膜与绒毛膜之间贮存的液体。

c 子宫生理缩复环随着宫口开大、胎儿下降而升高。

d 仰伸是胎头贴近胸部的动作。

e 冠状缝位于前囟及鼻之间。

26. 下述各项内容对正常月经周期来说, 哪两项是正确的?

(1) 在排卵后孕激素的分泌量开始增加, 当黄体成熟时, 孕激素分泌量达最高峰。

(2) 血中出现雌激素高峰之后, 接着出现黄体生成素 (LH) 高峰。

(3) 尿中 17-羟类固醇值可成为黄体功能的指标。

(4) 细胞膜上有雌激素受体 (receptor)。

(5) 血中促卵泡素 (FSH) 高峰出现在黄体生成素 (LH) 高峰之前。

a (1)(2) b (1)(5) c (2)(3)

d (3)(4) e (4)(5)

27. 指出下列有错误的项目?

(1) 受精卵分裂成为桑椹胚, 在输卵管内被输送。

(2) 脐带真结节是指胶样质或血管增生形成的结节。

(3) 在孕妇腹部听诊, 从胎儿方面发出的声音有胎心音、脐带杂音和主动脉音。

(4) 通过产道时, 胎头的头围最小的周径是枕下前囟周径。

a (1)(3)(4) b (1)(2) c (2)(3)

d (4) e (1)~(4)均错

28. 在正常月经周期的子宫内膜, 黄体期初期可见下述哪些所见?

(1) 腺腔内分泌。

(2) 间质水肿。

(3) 腺腔迂曲。

(4) 核下空泡。

(5) 假蜕膜变化。

a (1)(2) b (1)(5) c (2)(3)

d (3)(4) e (4)(5)

29. 下述情况, 哪些符合卵巢生理?

(1) 卵泡成熟度与子宫颈粘液分泌量有平行关系。

(2) 成熟卵泡的持续时间不是一定的。

(3) 月经黄体的持续时间大致是一定的。

(4) 黄体最后由结缔组织所替代。

a (1)(3)(4) b (1)(2) c (2)(3)

d (4) e (1)~(4)均符合

30. 下述各项所述的合体细胞及郎罕氏细胞的变化情况, 哪些是正确的?

- (1) 郎罕氏细胞在妊娠后半期几乎消失不见。
- (2) 合体细胞在妊娠前半期分裂活跃。
- (3) 郎罕氏细胞分泌绒毛膜促性腺激素 (HCG)。
- (4) 合体细胞来自郎罕氏细胞。
- (5) 至妊娠末期, 合体细胞仍存在。

a (1)(2)(3) b (1)(2)(5) c (1)(4)(5)

d (2)(3)(4) e (3)(4)(5)

31. 下述各项中, 哪项是错的?

- a 雌激素和孕激素均属于甾体类激素。
- b 卵巢主要合成雌三醇*(257页)及雌酮。
- c 卵巢能分泌少量雄激素。
- d 丘脑下部虽属神经系统, 但既具有神经的特性, 又具有内分泌功能。

e 垂体前叶嗜碱性细胞分泌促卵泡素 (FSH) 及黄体生成素 (LH) 两种影响卵巢功能的激素。

32. 关于甾体类激素, 下述哪些项是正确的?

- (1) 男性不分泌雌二醇。
- (2) 为证明排卵, 可测定血中孕酮值。
- (3) 妊娠期间醛固酮分泌增多。
- (4) 正常妇女, 脱氢表雄酮 (DHA) 大部分是由卵巢分泌的。

a (1)(3)(4) b (1)(2) c (2)(3)

d (4) e (1)~(4)均正确