


全国高等林业院校试用教材

昆虫分类学

中国林业出版社
样书

唐祖庭 主编



森林保护专业用

中国林业出版社

前　　言

本书是根据全国高等林业院校森林保护专业教学计划，由南京林业大学等四院校编写组。从专业的需要出发，除对昆虫纲各目、科进行系统的阐述外，对与林业有关的目、科作了比较深入的介绍，增加了亚科及重要属的识别或检索。为了帮助正确鉴定，分类特征除在检索表中用文字叙述外，还采用插图以助文字的不足。

参加本书编写的有东北林业大学杨立铭（第一章和第八章）、北京林业大学陈树椿（第二章、第九章和第十章）、福建林学院李友恭（第三章和第六章）、南京林业大学张国忠（第四章和第五章）、唐祖庭（第七章、第十二章和第十四章）、田恒德（第十一章和第十三章）。全书由唐祖庭同志主持编写并负责统稿。

本书在编写过程中，得到中国科学院动物研究所张广学、王淑芳同志、中国林业科学研究院林业科学研究所等单位的帮助，北京农业大学杨集昆教授和北京林业大学张执中教授审阅了全书，借此致以诚挚的谢意。

由于时间仓促和我们水平有限，书中必将有缺点和错误，敬希读者批评指正。

编者

1987年3月

目 录

前 言	
第一章 总 论	(1)
一、昆虫纲在动物界中的地位及其分类	
特征	(1)
二、昆虫分类的等级及《国际动物命名	
法规》中的有关问题	(2)
三、种和种下分类单元的若干基本概念	
.....	(4)
四、分类学的发展历史	(6)
五、学习《昆虫分类学》的意义及分类	
工作者的基本任务	(7)
六、昆虫纲的分类系统及分目检索表	(12)
第二章 昆虫纲各目概述	(23)
一、无翅亚纲	(23)
1. 原尾目	(23)
2. 弹尾目	(23)
3. 双尾目	(24)
4. 缘尾目	(24)
二、有翅亚纲	(24)
(一) 外翅部	(24)
5. 蝶蛾目	(24)
6. 蜻蜓目	(25)
7. 漆翅目	(25)
8. 蚊蠏目	(25)
9. 蟬螂目	(25)
10. 等翅目	(26)
11. 纺足目	(26)
12. 直翅目	(26)
13. 竹节虫目	(26)
14. 草翅目	(27)
15. 缺翅目	(27)
16. 啮虫目	(27)
17. 食毛目	(27)
18. 蚤 目	(28)
19. 半翅目	(28)
20. 同翅目	(28)
21. 缨翅目	(28)
(二) 内翅部	(29)
22. 带翅目	(29)
23. 扇翅目	(29)
24. 广翅目	(29)
25. 蛇蛉目	(30)
26. 脉翅目	(30)
27. 长翅目	(30)
28. 毛翅目	(30)
29. 鳞翅目	(30)
30. 双翅目	(31)
31. 蚊 目	(31)
32. 膜翅目	(31)
第三章 直翅目	(33)
分科检索表	(33)
一、蝗亚目	(35)
1. 锥头蝗科	(35)
2. 胀锥蝗科	(36)
3. 丝角蝗科	(36)
二、螽斯亚目	(36)
4. 蝈蝈科	(36)
5. 蟋蟀科	(36)
三、蝼蛄亚目	(37)
6. 蝼蛄科	(37)
第四章 蟑螂目	(38)
分亚科检索表	(38)
1. 怪蟑螂亚科	(39)
2. 小蟑螂亚科	(39)
3. 锥头蟑螂亚科	(40)
4. 方领蟑螂亚科	(40)
5. 椎眼蟑螂亚科	(40)
6. 姬蟑螂亚科	(40)
7. 花童蟑螂亚科	(41)
8. 丝蟑螂亚科	(41)
9. 蟑螂亚科	(41)

10. 长肛螳螂亚科.....	(42)	8. 蛾蜡蝉科.....	(74)
11. 虹翅螳螂亚科.....	(42)	二、胸喙亚目.....	(75)
12. 跳螳螂亚科.....	(42)	(三) 木虱总科.....	(75)
13. 小翅螳螂亚科.....	(42)	9. 木虱科.....	(75)
14. 细足螳螂亚科.....	(43)	分亚科检索表.....	(75)
第五章 等翅目.....	(44)	(四) 粉虱总科.....	(76)
分科检索表.....	(47)	10. 粉虱科.....	(76)
1. 原白蚁科.....	(48)	(五) 球蚜总科.....	(77)
2. 木白蚁科.....	(48)	分科检索表.....	(77)
3. 鼻白蚁科.....	(49)	11. 球蚜科.....	(77)
4. 白蚁科.....	(49)	12. 根瘤蚜科.....	(77)
第六章 半翅目.....	(51)	(六) 蚜总科.....	(77)
分科检索表.....	(52)	分科检索表.....	(78)
一、隐角亚目.....	(59)	13. 瘦绵蚜科.....	(79)
二、显角亚目.....	(60)	14. 大蚜科.....	(80)
1. 蜡科.....	(60)	15. 蚜科.....	(80)
分亚科检索表.....	(60)	16. 毛蚜科.....	(81)
2. 龟蜡科.....	(61)	(七) 蝇总科.....	(81)
3. 土蜡科.....	(61)	分科检索表.....	(82)
4. 缘蜡科.....	(61)	17. 绵蚜科.....	(83)
5. 长蜡科.....	(62)	18. 粉蚧科.....	(84)
6. 红蜡科.....	(62)	19. 绒蚧科.....	(85)
7. 网蜡科.....	(62)	20. 胶蚧科.....	(85)
8. 猎蜡科.....	(63)	21. 链蚧科.....	(85)
分亚科检索表.....	(63)	22. 蚬科.....	(87)
9. 姫蜡科.....	(64)	23. 盾蚧科.....	(87)
10. 花蜡科.....	(64)	第八章 鞘翅目.....	(89)
11. 盲蜡科.....	(66)	分亚目检索表.....	(91)
第七章 同翅目.....	(67)	一、肉食亚目.....	(92)
分亚目、总科检索表.....	(67)	分总科、科检索表.....	(92)
一、头喙亚目.....	(69)	(一) 步甲总科.....	(94)
(一) 蝉总科.....	(69)	1. 步甲科.....	(94)
分科检索表.....	(69)	分亚科检索表.....	(94)
1. 蝉科.....	(69)	2. 虎甲科.....	(96)
2. 沫蝉科.....	(70)	(二) 龙虱总科.....	(97)
3. 角蝉科.....	(70)	3. 龙虱科.....	(97)
4. 叶蝉科.....	(71)	肉食亚目幼虫分科检索表.....	(97)
分亚科检索表.....	(71)	二、多食亚目.....	(98)
(二) 蜡蝉总科.....	(72)	分总科检索表.....	(98)
分科检索表.....	(72)	(三) 水龟虫总科.....	(99)
5. 飞虱科.....	(74)	4. 水龟虫科.....	(99)
6. 蜡蝉科.....	(74)	(四) 泥甲总科.....	(100)
7. 广翅蜡蝉科.....	(74)	分科检索表.....	(100)

5. 泥甲科.....	(100)	分亚科检索表.....	(116)
6. 长泥甲科.....	(100)	24. 天牛科	(119)
(五) 扁甲总科.....	(100)	分亚科检索表(成虫).....	(121)
分科检索表.....	(100)	分亚科检索表(幼虫).....	(121)
7. 谷盗科.....	(101)	(十五) 金龟子总科.....	(125)
8. 瓢虫科.....	(101)	分科检索表.....	(125)
分亚科检索表.....	(102)	25. 金龟子科	(125)
(六) 花甲总科.....	(103)	分亚科检索表.....	(126)
分科检索表.....	(103)	三、象甲亚目.....	(128)
(七) 蛛甲总科.....	(104)	分总科检索表.....	(128)
分科检索表.....	(104)	(十六) 象甲总科.....	(129)
9. 长蠹科.....	(104)	分科检索表.....	(129)
10. 粉蠹科.....	(104)	26. 三锥象甲科	(129)
11. 窃蠹科.....	(104)	27. 象甲科	(130)
(八) 皮蠹总科.....	(105)	分亚科检索表.....	(130)
分科检索表.....	(105)	(十七) 小蠹虫总科.....	(133)
12. 皮蠹科.....	(105)	分科检索表.....	(135)
分亚科检索表.....	(105)	28. 小蠹科	(135)
(九) 叩头甲总科.....	(106)	29. 齿小蠹科	(135)
分科检索表.....	(106)	分亚科及属检索表.....	(136)
13. 叩头甲科	(107)	30. 锯小蠹科	(138)
14. 吉丁虫科	(107)	多食亚目、象甲亚目幼虫分科检索表.....	(138)
分亚科检索表.....	(108)	第九章 脉翅目.....	(145)
(十) 花蚤总科.....	(109)	分科检索表.....	(148)
分科检索表.....	(109)	1. 粉蛉科	(149)
15. 莞菁科	(110)	2. 褐蛉科	(149)
(十一) 隐翅虫总科.....	(110)	3. 草蛉科	(149)
分科检索表.....	(110)	4. 蚁蛉科	(151)
16. 隐翅虫科	(111)	5. 蝶角蛉科	(151)
分科检索表.....	(112)	第十章 鳞翅目.....	(153)
17. 埋葬虫科	(113)	分总科检索表.....	(167)
(十二) 蛾总科.....	(113)	一、同脉亚目.....	(168)
分科检索表.....	(113)	(一) 小翅蛾总科.....	(169)
18. 郭公虫科	(113)	(二) 毛顶蛾总科.....	(169)
19. 蛾科	(114)	(三) 蝙蝠蛾总科.....	(169)
20. 花萤科	(114)	1. 蝙蝠蛾科	(169)
(十三) 拟步甲总科.....	(115)	二、异脉亚目.....	(170)
分科检索表.....	(115)	(四) 微蛾总科.....	(170)
21. 拟步甲科	(115)	(五) 穿孔蛾总科.....	(171)
(十四) 叶甲总科.....	(115)	(六) 木蠹蛾总科.....	(171)
分科检索表.....	(115)	分科检索表.....	(171)
22. 豆象科	(116)		
23. 叶甲科	(116)		

2.木蠹蛾科.....	(171)	(十六) 蚕蛾总科.....	(193)
3.豹蠹蛾科.....	(171)	分科检索表.....	(194)
4.拟木蠹蛾科.....	(172)	25.枯叶蛾科.....	(194)
(七) 谷蛾总科.....	(172)	26.梦纹蛾科.....	(196)
分科检索表.....	(173)	27.蚕蛾科.....	(196)
5.透翅蛾科.....	(173)	28.大蚕蛾科.....	(197)
6.麦蛾科.....	(174)	(十七) 天蛾总科.....	(197)
7.织蛾科.....	(174)	29.天蛾科.....	(197)
8.木殃蛾科.....	(175)	(十八) 夜蛾总科.....	(199)
9.巢蛾科.....	(175)	分科检索表.....	(199)
(八) 细蛾总科.....	(176)	30.舟蛾科.....	(199)
分科检索表.....	(177)	31.腐蛾科.....	(201)
10.潜蛾科.....	(177)	32.灯蛾科.....	(201)
11.叶潜蛾科.....	(177)	33.毒蛾科.....	(202)
12.鞘蛾科.....	(177)	34.夜蛾科.....	(203)
13.尖蛾科.....	(178)	分亚科检索表.....	(204)
14.举肢蛾科.....	(179)	(十九) 弄蝶总科.....	(206)
(九) 蝶蛾总科.....	(180)	35.弄蝶科.....	(206)
分科检索表.....	(180)	(二十) 凤蝶总科.....	(206)
15.蝶蛾科.....	(180)	分科检索表.....	(207)
分亚科检索表.....	(181)	36.凤蝶科.....	(207)
(十) 卷蛾总科.....	(182)	37.粉蝶科.....	(207)
分科检索表.....	(182)	38.瑛蝶科.....	(208)
16.蛀果蛾科.....	(182)	39.灰蝶科.....	(209)
17.细卷蛾科.....	(182)	鳞翅目幼虫分科检索表.....	(209)
18.卷蛾科.....	(183)	鳞翅目蛹分科检索表.....	(219)
19.小卷蛾科.....	(183)	第十一章 双翅目.....	(225)
(十一) 羽蛾总科.....	(185)	分亚目、组、科检索表.....	(229)
分科检索表.....	(185)	一、长角亚目.....	(231)
(十二) 蓑蛾总科.....	(183)	1.大蚊科.....	(234)
分科检索表.....	(186)	2.摇蚊科.....	(234)
20.刺蛾科.....	(186)	3.蝶科.....	(234)
21.蓑蛾科.....	(187)	4.蚋科.....	(234)
(十三) 斑蛾总科.....	(187)	5.蚊科.....	(235)
22.斑蛾科.....	(188)	6.瘿蚊科.....	(236)
(十四) 尺蛾总科.....	(188)	二、短角亚目.....	(236)
分科检索表.....	(188)	7.虻科.....	(236)
23.尺蛾科.....	(189)	8.食虫虻科.....	(236)
分亚科检索表.....	(191)	9.蜂虻科.....	(236)
24.凤蛾科.....	(192)	10.水虻科.....	(237)
(十五) 锯纹蛾总科.....	(193)	11.水虻科.....	(237)
分科检索表.....	(193)	三、环裂亚目.....	(237)

12. 食蚜蝇科	(227)	19. 蚂科	(275)
13. 实蝇科	(238)	(五) 肿腿蜂总科	(275)
14. 潜蝇科	(238)	分科检索表	(275)
15. 黄潜蝇科	(239)	20. 肿腿蜂科	(276)
16. 寄蝇科	(239)	(六) 细蜂总科	(276)
寄蝇科分属检索表	(239)	分科检索表	(276)
17. 蝇科	(243)	21. 缘腹细蜂科	(277)
18. 麻蝇科	(243)	(七) 胡蜂总科	(278)
19. 丽蝇科	(243)	分科检索表	(278)
20. 花蝇科	(243)	22. 胡蜂科	(279)
双翅目幼虫分科检索表	(244)	23. 马蜂科	(279)
第十二章 膜翅目	(249)	(八) 土蜂总科	(280)
分亚目检索表	(252)	分科检索表	(280)
一、广腰亚目	(252)	24. 土蜂科	(280)
分科检索表	(253)	(九) 青蜂总科	(281)
1. 扁叶蜂科	(254)	分科检索表	(281)
2. 三节叶蜂科	(254)	25. 青蜂科	(281)
3. 钩角叶蜂科	(255)	(十) 泥蜂总科	(282)
4. 叶蜂科	(255)	分科检索表	(282)
5. 松叶蜂科	(256)	26. 泥蜂科	(284)
6. 树蜂科	(256)	(十一) 蜜蜂总科	(285)
7. 茎蜂科	(257)	分科检索表	(285)
二、细腰亚目	(257)	27. 分舌蜂科	(287)
分总科检索表	(258)	28. 地蜂科	(287)
(一) 姬蜂总科	(260)	29. 蜜蜂科	(287)
分科检索表	(260)	第十三章 螳类	(288)
8. 姬蜂科	(261)	农林作物上常见螳类分科检索表	(290)
9. 苍蜂科	(263)	1. 叶螳科	(292)
分亚科检索表	(263)	2. 窗螳科	(293)
(二) 瘦蜂总科	(267)	第十四章 昆虫分类研究法	(294)
分科检索表	(267)	一、昆虫的采集	(294)
10. 瘦蜂科	(268)	二、昆虫标本的制作	(297)
(三) 小蜂总科	(269)	三、标本的保存和寄运	(304)
分科检索表	(269)	四、昆虫图的绘制	(304)
11. 赤眼蜂科	(271)	五、昆虫的照相	(306)
12. 雾节小蜂科	(272)	六、资料的收集与整理	(307)
13. 跳小蜂科	(272)	主要参考文献	(309)
14. 旋小蜂科	(272)		
15. 蚜小蜂科	(273)		
16. 金小蜂科	(273)		
17. 广肩小蜂科	(273)		
18. 小蜂科	(274)		
(四) 蚁总科	(275)		

第一章 总 论

一、昆虫纲在动物界中的地位及其分类特征

大约在30亿年前，一些低级生物（如：细菌、蓝藻等）就已生活在地球上，与今天的相比，只是种类相当稀少，构造极其简单罢了。在那些简单的原始生物中，除少数至今仍保留原来性状外，绝大多数种类经过漫长的岁月，通过由简单到复杂，由低级到高级的进化，已演变成当今这些形形色色、千差万别的生物类群。

据统计，生活在地球上的生物现今约有200余万种。其中：微生物约占5%，植物约占20%，动物约占75%。实际上，生物的种类远远不止这个数，在漫长的历史年代中，曾有大量的生物在地球上繁荣昌盛过，只是由于地壳的变迁，环境的变化，使它们从生命的舞台上消失，成了历史的过客。至今，我们只能通过化石去研究，追溯它们了。

进化论的先驱者之一，法国著名生物学家拉马克(1744—1829)于1774年第一次把动物界划分为“无脊椎动物”和“脊椎动物”两大类群。由于后来动物学家的不懈努力，使其得以完善，建立了不同的分类系统。根据构造的繁简、异同及进化水平，把动物界分为10个门。其中，前9个门属于无脊椎动物，第10门为脊椎动物：

1. 原生动物门 *Protozoa*: 系单细胞动物(其它9个门均系多细胞动物)。如变形虫、疟原虫等。
2. 多孔动物门 *Porifera*: 多生活在海洋里。如海绵等。
3. 腔肠动物门 *Coe1enterata*: 多生活在海洋里。如水母、珊瑚等。
4. 扁形动物门 *Platythe1minthes*: 如血吸虫等。
5. 线形动物门 *Nemathelminthes*: 如蛔虫、线虫等。
6. 环节动物门 *Anne1ida*: 如蚯蚓、蚂蟥等。
7. 软体动物门 *Mollusca*: 如蜗牛、蚌、乌贼等。
8. 节肢动物门 *Arthropoda*: 虾、蟹、蜘蛛、蜈蚣、昆虫等。
9. 棘皮动物门 *Echinodermata*: 如海星等。
10. 脊椎动物门 *Chordata*: 如鱼类、两栖类、鸟类及哺乳动物等。

由上可知，节肢动物为无脊椎动物中比较进化的1个门，其数量远远超过其它9个门的总和(只昆虫纲就有近百万种)。节肢动物门的主要特征是：

- ① 体躯分段，附肢分节；
- ② 具有几丁质的外骨骼；
- ③ 循环系统呈开放式；

④中枢神经系统由位于身体腹面的腹神经索和头部的脑神经及围咽神经所组成。

节肢动物分布极为广泛，与人类有着密切的关系。动物学家们多将本门分设为3个亚门，7个纲：

(1) 有鳃亚门 Branchiata：触角1对或2对，多水生，用鳃呼吸。其中包括2个纲：

1) 甲壳纲 Crustacea：触角2对，体躯可明显地划分为头胸部和腹部。如虾、蟹、蝎子等。

2) 三叶虫纲 Trilobita：触角1对，体背面中央耸起，两侧斜落，呈三叶状。如今已全部绝种，仅见于化石。

(2) 有螯肢亚门 Chelicerata：无触角，第1对附肢称为螯肢，第2对附肢称为脚须，多陆生，用书鳃、书肺或气管呼吸；少数水生，用书鳃呼吸。其下包括2个纲：

3) 肢口纲 Merostomata：胸部附肢的基部包围在口两旁，用腹部附肢内侧的书鳃呼吸，水生。现存的种类如鲎。

4) 蛛形纲 Arachnida：头胸部除螯肢和脚须外，还有4对足；腹部附肢退化，陆生，用腹部的书肺或气管呼吸。如蜘蛛等。

(3) 气管亚门 Tracheata：多陆生，少数水生，用气管呼吸。其中包括3个纲：

5) 原气管纲 Onychophora：体蠕虫状，体外分节不明显，附肢具爪，但不分节，兼具环节动物和节肢动物的特点。如栉蚕。

6) 多足纲 Myriopoda：体躯分节明显，头部与胸部（即无分化的胸腹部）界限清楚，每一体节具1—2对附肢。如蜈蚣、马陆等。

7) 昆虫纲 Insecta：体躯分头、胸、腹3个体段。头部具有1对触角；胸部有3对足，通常具2对翅；多陆生，用气管呼吸。如蝗虫、天牛、蝴蝶及蛾类等。

由上可知，昆虫是节肢动物门，气管亚门中的一个纲。有人统计，昆虫的种类占地球上动物总数的3/4以上；E.麦尔（1953）统计，现今世界上共有昆虫850000种。

二、昆虫分类的等级及《国际动物命名法规》中的有关问题

通过上一节“昆虫纲在动物界中的地位”我们了解到昆虫属于动物界、节肢动物门、气管亚门的动物，并列为昆虫纲。然而，昆虫的分类并非到纲为止，纲下分目，目下分科，科下分属，属下分种，这样就形成了阶梯式的分类等级，这种等级的形成，是人们认识过程的具体反映。人类的认识实践告诉我们，认识事物的规律总是由个性到共性，由局部到整体。昆虫分类学家从进化的观点出发，将那些形态性状、地理分布、生物性状、生态性状等相近缘的种类集合成属，将近缘属集合成科，将近缘科集合成目，将各目集合成纲，即昆虫纲。在分类等级中，通常还采用一些中间等级。如：纲下设亚纲，目下设亚目，科下设亚科等。下面以松六齿小蠹虫为例，表示分类等级的顺序：

门 (Phylum) 节肢动物门 Arthropoda

亚门 (Subphylum) 气管亚门 Tracheata

纲 (Class) 昆虫纲 Insecta
 亚纲 (Subclass) 有翅亚纲 Pterygota
 部 (Division) 内翅部 Endopterygota
 目 (Order) 鞘翅目 Coleoptera
 亚目 (Suborder) 多食亚目 Polyphaga
 科 (Family) 小蠹虫科 Ipidae
 亚科 (Subfamily) 棘胫小蠹亚科 Ipinae
 族 (Tribe) 小蠹族 Ipini
 属 (Genus) 齿小蠹属 Ips
 种 (Species) 松六齿小蠹 *acuminatus*

松六齿小蠹虫的学名为 *Ips acuminatus*, 前者为属名, 后者为种名。每一种动物的学名均由属名和种名所组成, 这就是世界上所通用的“双名法”命名制。这种命名制最早由瑞典自然科学家林奈 (Carolus Linnaeus) 创建, 并用于他的《自然系统》(Systema Naturae) 第10版中。由于分类学的不断发展和需要, 动物学家们又提出了一系列有关命名的标准, 并通过国际动物学会议的形式将它确定为《国际动物命名法规》。事实上, 《法规》的真正建成, 还是在第六届国际动物学会议 (伯尔尼, 1904) 以后, 于1905年, 在法国巴黎以法文发表, 同时附以英、德译文。《法规》中关于动物的命名有一系列规定, 以下仅就其中部分问题加以说明。

学名: 不同种或不同类群的生物, 在不同国家或不同地方, 都有其不同名称; 但这种名称的使用多局限于一定范围, 属于地方性的, 在国际上无法通用。林奈为方便国际科学资料、科学知识的交换及免除混乱起见, 用拉丁文或拉丁化的文字去组成动物名称和分类单位名称, 这种名称通称为学名。

“双名法”和“三名法”: 《法规》中规定, 每一种生物 (包括昆虫在内) 的学名均由属名和种名组成, 前者为属名, 后者为种名, 这种由双名构成学名的方法称为“双名法”。在学名后面附有命名者的姓, 如: 松六齿小蠹 *Ips acuminatus* Gyllenhalo。凡由三级名称构成学名的方法, 称为“三名法”。如: 天幕毛虫的学名 *Malacosoma neustria testacea* Motsh., 是由属名、种名、亚种名所组成, 命名者的姓置于亚种名之后。

学名的写法: 学名中的属名第一个字母要大写, 其余小写, 即使种名是以人名或地名命名的也要小写。命名者的姓或姓的缩写置于种名或亚种名称之后, 第1个字母要大写。印刷学名时要排成斜体字, 但命名者须以正体排列; 抄写学名时可在学名下加横线。如: *Ips acuminatus* Gyllenhalo。当同一属的两个种或两种以上的学名先后提及时, 最前面一个学名中的属名要全写, 其后各属名可缩写。如: *Ips acuminatus*、*I.sexdentatus* 及 *I.typographus* 等。

重新组合: 在我们所见的学名当中, 有一部分命名者被置入括号内, 如欧洲落叶松鞘蛾 *Coleophora loricella* (Hübner)。这表明种名 *laricella* 是 Hübner 所命名, 但当时是放在 *Tinea* 属中, 即: *Tinea laricella* Hübner 后来被 Zeller 氏将 *laricella* 移动到 *Coleophora* 属中, 构成现在的欧洲落叶松鞘蛾学名 *Coleophora laricella* (Hübner) Zeller。这种

将种名由一属移到另一属的调动称重新组合，为了表示移动而将种名命名者置入括号内，重新组合者可置于括号后边，实际上常将其省略。“重新组合”用Comb. nov.或Comb. n.表示，并置于命名者之后。

新记录和新种： 凡首次记载本国或本地区的已定名种类或类群，并在正式刊物上发表的，均称国家或地方“新记录”，可用record n.表示。凡一个物种在世界上首次被记载，并发表在国家正式刊物上者，称为“新种”，用sp. nov.或sp. n.表示。“新种”一旦发表，再用别的学名记载此种时，一律作为“同物异名（Synonym）处理，而不被采用。

模式标本： 描述新种时所采用的标本，称为“模式标本”（type）。如果“模式标本”有两个以上时，应选出其中一个完善的作为“完模标本”或“正模标本”（holotype）；与“完模标本”性别相对的一个标本称为“异模标本”或“配模标本”（allotype）；其余的统称为“副模标本”（paratype）。

模式标本是定立新种的物质依据，一旦发生疑问或认为原记载不够详细时，便需复查“模式标本”。因此，“模式标本”具有特殊意义和价值，所以必须妥善保存，以供长期使用。世界多数博物馆都采用红色标签标记“完模标本”。如：英国伦敦自然博物馆用红色的，3、4cm的圆形纸片标记“完模标本”；用绿色纸片标记“异模标本”；用黄色纸片标记“副模标本”。“模式标本”，尤其是“完模标本”通常不外借，不随意使用。

“完模标本”的标签上必须注明采集地点、年月日、性别、采集者姓名；在发表新种的论文内，还应说明存放的地方。“模式标本”一般应放入博物馆保存，我国多数存放在中国科学院动物研究所的标本馆内及高等院校的标本馆内。

分类等级的字尾： 学名一律采用拉丁文或拉丁化的文字。亚族以上分类等级名称多有一定的字尾。如：

目——字尾不定，但多用—ptera表示——翅目。如：Coleo—ptera（鞘翅目），Lepido—ptera（鳞翅目），Hemi—ptera（半翅目），Homo—ptera（同翅目），Hymeno—ptera（膜翅目）等。

总科——～oidea

科——～idae

亚科——～inae

族——～ini

亚族——～ina

三、种和种下分类单元的若干基本概念

关于“种”或“物种”的基本概念问题，始终是唯物主义者同唯心主义者在生物学领域里长期进行争论的焦点。

林奈及其以前的分类学家，局限于当时时代的特点，认为天地间的万物均由上帝创

造。那些被上帝造出来的物种不仅形体不变，而且数量也不变，“当初创造了多少，就有多少”。因此，在他们看来，物种只是形态相似的个体的组成，同一种内的个体不仅应保持同一类型，而且应永远不变。基于这种指导思想，那些形态略有差异的个体全被视为“新种”的代表或“新种”的模式。结果，许许多多的物种只凭一个标本或几个标本来订定，因而个体几乎成了分类的基本单元。

19世纪中叶，进化思想达到了高峰。达尔文等进化论者通过广泛地对大自然的考察获得了大量标本，进一步证实了物种是客观存在的，是有源的，是变异的，是进化着的；近缘的物种或类群来源于共同的祖先，进而使物种的“模式”概念受到了强烈冲击。然而，由于达尔文等人过分地强调种间连续或种间过渡类型，结果，客观上否认了种间间断，否认了物种的真实存在。在他们看来，种与属的特征，只有在材料不全时才能显现出来。

随着科学的发展，斗争的继续，使问题的研究得以深入。尤其在“种群”概念产生并广泛地应用于生物领域之后，“模式”概念逐渐退位。1940年后的“新系统学”已开始把纯形态学的物种定义以生物学的物种定义来取代。即解释物种时，不仅考虑到形态学的特点，而且还顾及到生态学、生理学、遗传学及其他方面的特点。如E.麦尔在《动物分类学的方法和原理》(1953)一书里，基于种群观点，给物种下了这样的定义：“种是能够（或可能的）相互培育的自然种群的类群，这些类群与其它这样的类群在生殖上相互隔离着”。这一定义虽然强调了种群观念，并为种下分类指明了途径，但是它只强调了种间间断，而没有突出种间连续。所以不能全面地反应出进化的历史观点，对种上分类指导意义不大。我国科学院动物研究所陈世骧教授于1977年提出了新的物种定义：“物种是繁殖单元，由又连续又间断的种群所组成；物种是进化单元，是生物系统线上的基本环节，是分类学的基本单元”。这个定义以3种单元说明了什么是“物种”，又以进化论观点说明了种下分类的理论依据，是现代物种定义中较为完善的一个。

新分类学认为，物种是由既连续又间断的种群所组成，种群是种内的分化单元，也是种内的繁殖单元。一个物种在它的分布区域内常有许多个，乃至成百上千个种群。这些处于不同地区、不同环境下的种群，由于环境条件的差别和长期地理隔绝，使之发生了变异，并朝着不同方向分化，分化结果更适应于它所处的环境。所以说，种群在适应新环境的过程中发生了变异、分化，形成了不同类型，这些不同类型被称之为亚种。然而，一旦隔绝条件消失，亚种间仍能自由交配，繁衍后代。故亚种间并无本质差别，而是属于量变范畴。如果亚种间的隔绝条件长期持续下去，那么它们间的分化、差异将得到强化和巩固，进而产生质的变化，形成新的物种。

在分类学上，把那些没有亚种的种，或者只有一个亚种的种称为单型种；把那些包括2个或2个以上亚种的种称为多型种。当一个种被分成几个亚种时，拥有模式标本产地的亚种被称为指名亚种；指名亚种的名称与种名相同，如：核桃扁叶甲指名亚种*Gastrolina depressa depressa*。在一个种的分布区域内，其亚种的空间位置都有一定的局限性，所以，就此意义来讲，每个亚种乃是一个地理宗；然而地球上是没有环境条件完全相同的地区的，因此就此意义来讲，至少在理论上可以说，每个亚种也就是一个生态宗。如一些鸟类不主要依存于地方性的环境条件，因而它们的亚种主要是地理宗；而植物及许多固着的冷血动

物主要是在地方环境条件下生长发育的，所以它们的亚种被视为生态宗。严格地讲，地理宗与生态宗之间没有明显的界限。E.麦尔在他的论文里曾这样写道：“没有一个地理宗不同时就是生态宗，或者没有一个生态宗不同时就是地理宗，至少是一个微地理宗。地理宗与生态宗是同一现象——是一个亚种的两个方面。”

新分类学认为，不仅物种是由种群所组成，即使亚种也是种群的集合体，除了那些极其局限的遗存类型或者孤岛上少数的情况而外，凡是在地理上相互独立的种群均称为异域性的。林奈后大约一百年间，曾发现以前在世界上各不同地区描述的一些地方种可以合并为一个单独的多型种。

常见的种下分类单元，除亚种外尚有变种Variety (var.或v.)，型Form (form或f.)，变型Aberration (aber.或ab.)等。上述这些种下分类单元，除亚种的概念比较统一外，其它尚不甚明确，多不被采用。

四、分类学的发展历史

分类是区分事物的一种基本方法。分类学产生于劳动实践，并在实践中逐渐得到发展、完善。远在原始社会，人类为了生存，必须明辨周围事物，如哪些有害或无害，哪些可食或不可食。类似等等知识，今日看来虽然粗浅，然而在当时，如果没有这种知识，就不易甚至无法生活下去。

研究分类学的历史，应从古希腊的亚里斯多德 (Aristotle, 公元前384—322) 开始。他观察了500多种动物，首次将动物分为有血动物和无血动物，并把有血动物分为胎生和卵生。在古希腊和古罗马衰落之后，宗教统治整个意识形态，科学几乎完全陷入停顿状态。

自欧洲文艺复兴起，封建制度逐渐崩溃，资本主义社会开始萌芽，进而对生产和科学提出了强烈要求，促使生物学首先是分类学开始出现。然而，当时的哲学观点是“自然界绝对不变”，整个科学领域仍禁锢在神学之下。18世纪，瑞典自然科学家林奈 (Linnaeus) 创立了生物的分类系统，于1753年出版了《植物的分类》，1758年出版了闻名世界的《自然系统》，书中不仅阐述了他的物种概念，并提出以“双名制”去命名所发现的每一物种；同时，还采用了较高级的阶元体系，即属、目、纲等。在林奈的分类系统里，将动物界划分为6个纲，即哺乳纲、鸟纲、两栖纲、鱼纲、蠕虫纲和昆虫纲。昆虫纲下又设了7个目：鞘翅目 (Coleoptera)、半翅目 (Hemiptera)、鳞翅目 (Lepidoptera)、脉翅目 (Neuroptera)、膜翅目 (Hymenoptera)、双翅目 (Diptera) 和无翅目 (Aptera)。其中有5个目至今仍基本上保持原来的地位和规模，唯无翅目和脉翅目为混杂类群，现已拆分到其它几个目中。但是，这位伟大的生物学家同许多其他科学家一样仍持有物种不变的观点。

布丰 (1707—1788) 从观察化石中得到启发，进而把生物与地球历史联系起来，获得了进化观点。19世纪初，法国学者拉马克 (J. Lamarck) 吸收地质学、古生物学、胚胎

学和比较解剖学等研究成果，激烈地反对着林奈关于物种永恒的观念，并认为地球上气候条件在变，地面上的生物在连续发展，地下的生物化石是现代地球上生物的祖先，一切生物都是从低级向高级发展的。19世纪中叶，动物学的各个领域中都积累了丰富资料，这与当时占统治地位的唯心主义和宗教观点发生了严重抵触。英国科学家达尔文 (C. Darwin) 就在这种历史条件下完成并总结了他在环球旅行中亲自观察和收集到的资料，终于在1859年出版了《物种起源》一书。从此，以“特创论”为基础的分类学开始土崩瓦解，以进化论为中心的分类学开始建立并得以巩固。

20世纪的分类学，不论是方法还是概念上较19世纪均有所提高。1940年，赫胥黎主编的《新系统学 (The New Systematics)》的出版，引起了生物界很大反响。其主要内容可归纳如下两点：第一、分类学原来仅与形态学密切结合，但随科学的发展，学科间日趋渗透、汇合，生态学、遗传学及细胞学的研究成果已渗透到分类学的内部，为分类学增添了新的血液；生理学、生物化学也正在加强与分类学的接触；因此，新的分类学已从旧分类学的狭隘的形态观点发展到广义的生物学观点，成为名符其实的生物科学。第二、旧分类学是以种为中心，而种又仅在模式概念或个体观点基础上进行研究；所谓变种、形都是从个体变异的观点来鉴定的，因此不能代表自然类群，不能反应客观实际。新分类学是根据物种是由种群组成的基本概念，以种群做为种下分类的基本单元，进而发展了种下分类、种内分化和物种形成的研究。

五、学习《昆虫分类学》的意义及分类工作者的基本任务

现代科学发展的特点之一是学科之间相互渗透。仅就昆虫学范围来讲，生态学、生理学及生物学等与分类学的关系越来越密切，它们的最新成果已渗透到分类学的内部，使分类学的内容更加丰富，并促使分类学向更完善方向发展。越来越多的事实证明，只有当分类工作者把自然界中形形色色的昆虫，按其形态构造、生活习性、地理分布以及进化水平等予以分门别类，并对各不同分类等级给以名称和描述之后，其它学科的研究者们方能认识和选择自己的研究对象，了解国内外的研究动态，达到彼此交流资料和科研成果的目的。因此，昆虫分类学是其它学科不可缺少的重要基础。关于这个问题，Pearl (1922) 曾这样提到：“分类学提供了砖石，使整个生物科学知识的结构得以竖立。如果没有分类学家的劳动，有机进化的事事实就很难理解，而且正是分类学家真正为遗传学家和实验进化学家提供了基本问题”。Elton (1947) 阐述得更加具体而生动：“生态学进展有赖于精确鉴定和各动物类群的完善分类基础……，没有这个基础，生态学家就孤立无助，而他的全部工作也可能归于无用了。”

昆虫种类繁多，体积甚小，分布极广，变态复杂，有的对人类有益，有的有害。如何正确地掌握各个类群的特点？如何认识地球上形形色色的昆虫？这些问题的解决方法必须依赖于昆虫分类学。

进化论阐明了地球上形形色色、千差万别的生物均起源于共同的祖先，并通过由低级

到高级，由简单到复杂的进化道路发展来的。因此，物种或物类间存在着或近或远的血缘关系。关系相近者，表现在形态特征上、生活习性上、以及对各种刺激的反应上等等均为相似；关系相远者，则表现出相反的情形。科学的分类系统不仅反映出不同物种间或物类间差异的大小，并反映出不同物种或物类在进化的系统线上相互间的连续性。科学的分类系统是生物系谱的概括。要了解昆虫的“自然系谱”，必须学习昆虫分类学。

此外，昆虫分类学在解决某些经济昆虫学领域内的一些复杂问题时也发挥了巨大作用。也就是说，在生产或科研上，或者在某些经济昆虫学领域内，如果不注意发挥昆虫分类学的作用，常常出现问题或者造成经济上的损失。例如：1954年，广西宜山林场松毒蛾大发生，该场误认为是松毛虫大发生。一边做防治松毛虫的准备工作，一边向上级林业部门呈报；后经专家现场鉴定，才纠正错误，进入防治松毒蛾的准备工作。再如：粘虫是美国农作物的一种重大害虫。为了有效地防治粘虫，生物防治工作者们花费了很多时间和精力，制定了生物防治计划，并决定于1940年去乌拉圭和阿根廷引进一种粘虫寄生蝇 *Archytas incertus* Macq. (= *piliventris* Van der Wulp)；后来根据分类学家的报告，方知这种寄生蝇在美国南方已经非常普遍，于是出国引种的计划不得不停止。另一明显例子是：为了防治某些重要森林害虫，近几年来，我国不少省份的生物防除工作者，饲养并投放了大量赤眼蜂。然而，那些被投放的种类在当地是否已经能够越冬？是否已形成了生物群落？等等类似问题均不清楚，其主要原因之一就是当地赤眼蜂与引进投放的赤眼蜂在分类学上有何关系一直不清楚。

分类工作者的基本任务有以下三项：

1. 鉴定：昆虫学的任何领域里，研究者初期的首要任务之一就是确认自己所研究的对象，或者说，研究一开始必然遇到鉴定方面的问题。鉴定工作基本可以概括为以下四方面内容：①把自然界中形形色色，千差万别的个体加以分析、整理、划分成易被人们认识、掌握的单元；②提出鉴定这些单元的主要性状；③找出相似单元之间的明显差异；④给以这些单元学名，以便他人使用。

在鉴定工作中，常用以下几种方法：①与已定名的昆虫标本相对照；②与有关图谱相对照；③与有关的描述资料相对照；④利用现有的检索表进行检索；⑤请有关专家鉴定；⑥结合上述方法进行鉴定。

这里需要提及的是昆虫种类繁多，变异复杂，不同类群而外部形态相近似的实例很多。所以，采用单纯的标本对照，或图谱鉴定等方法是不可靠的，常用的方法是先将标本与已定名的标本或权威性的图谱相对照；在初步认定的基础上，再与专门性描述或检索表相对照；若有方便条件，再请有关专家验证一下就更为可靠了。

在鉴定工作中，常常涉及到检索表。检索表也是鉴定工作中常用的工具。其类型虽然不一，但编写的原理却完全相同：面对各种实物标本，经分析、归纳，比较之后，选定明显而稳定的分类特征列成简明条文，编制成表。一个好的检索表应具备以下特点：①所采用的形态特征明显而稳定，②所用术语简明易懂；③每项包含“双征”或“三征”；因为单征有时靠不住，多征则嫌冗长而繁琐，使主次不清。

下面仅介绍五种常见的检索表，目的在于达到会用、会编：

() 双项式(对列式)：每一步都面临两个对立项，其中必有一项与手中标本相适合，该项的后面不是分类单元的名称，就是一个数字。如果是数字，那么与这个数字相符的下一步又是一个对立项。这样，每一步都引出下一项，直至达到一个分类单元为止。这是目前常用的一种，也是本书主要采用的一种方式。

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. 有翅..... | 3 |
| 1'. 无翅..... | 2 |
| 2. 腹末有弹器..... | 弹尾目 <i>Collembola</i> |
| 2'. 腹末有尾须1对，中尾丝1条..... | 缨尾目 <i>Thysanura</i> |
| 3. 刺吸式口器..... | 4 |
| 3'. 咀嚼式口器..... | 5 |
| 4. 前翅半鞘质，后翅膜质；喙着生于头部腹面前端..... | 半翅目 <i>Hemiptera</i> |
| 4'. 前后翅均为膜质，或前翅稍加厚；喙着生于头部腹面的后端..... | 同翅目 <i>Homoptera</i> |
| 5. 前翅皮革质，后翅膜质；后足适于跳跃，或前足适于开掘..... | 直翅目 <i>Orthoptera</i> |
| 5'. 前翅角质，后翅膜质..... | 鞘翅目 <i>Coleoptera</i> |

(2) 单项式(系列式)：每一步只面临一项，如手中标本与此项相符，按括号外的数字次序查下去；若不符，以括号内的数字为依据，寻找与括号外相同的数字，并以该项描述查检下去。这种检索表的优点是，能将许多特征相近似的分类单元列到相近的位置上，其缺点是两条相对的特征往往相距太远，不利对照。也是比较常用的一类检索表。

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 (4) 无翅 | |
| 2 (3) 腹末有弹器..... | 弹尾目 <i>Collembola</i> |
| 3 (2) 腹末有尾须1对，中尾丝1条 | 缨尾目 <i>Thysanura</i> |
| 4 (1) 有翅 | |
| 5 (8) 咀嚼式口器 | |
| 6 (7) 前翅皮革质，后翅膜质；后足适于跳跃，或前足适于开掘 | |
| | 直翅目 <i>Orthoptera</i> |
| 7 (6) 前翅角质，后翅膜质..... | 鞘翅目 <i>Coleoptera</i> |
| 8 (5) 刺吸式口器 | |
| 9 (10) 前翅为半鞘质；后翅膜质；喙着生于头部腹面前端..... | 半翅目 <i>Hemiptera</i> |
| 10 (9) 前后翅均为膜质，或前翅稍加厚，喙着生于头部腹面后端..... | |
| | 同翅目 <i>Homoptera</i> |

(3) 分叉式：将相对的两项分叉排列。其优点是一目了然，便于比较相对立的特征；缺点是占篇幅过大，项数多时排列困难。

昆 虫 纲

无 翅

有 翅

腹末有弹器	腹末有尾须1对 中尾丝1条	口器刺吸式	口器咀嚼式
弹尾目 <i>Collembola</i>	缨尾目 <i>Thysanura</i>	前翅半鞘质，前后翅膜质 后翅膜质，喙或前翅稍加厚，喙着生于头部腹面前端	前翅皮革质，前翅角质，后翅膜质，后膜质 足适于跳跃
		厚，喙着生在腹面前端	或前足适于头部腹面后端
			开掘
	半翅目 <i>Hemiptera</i>	同翅目 <i>Homoptera</i>	直翅目 <i>Orthoptera</i> 鞘翅目 <i>Coleoptera</i>

(4) 锯齿式(退格式)：在排列道理上与单项式相仿，只是在同一序列内的每项排列位置逐次后退一格。优点是能一目了然地反应出相关近缘的分类单元；缺点是篇幅过长、费纸张。现已少用。

1. 有翅
2. 咀嚼式口器
3. 前翅皮革质，后翅膜质；后足适于跳跃，或前足适于开掘..... 直翅目 *Orthoptera*
- 3'. 前翅角质，后翅膜质..... 鞘翅目 *Coleoptera*
- 2'. 刺吸式口器
4. 前翅为半鞘质，后翅膜质；喙着生于头部腹面前端..... 半翅目 *Hemiptera*
- 4'. 前后翅均为膜质，或前翅稍加厚；喙着生于头部腹面后端..... 同翅目 *Homoptera*
- 1'. 无翅
5. 腹末有弹器..... 弹尾目 *Collembola*
- 5'. 腹末有尾须1对，中尾丝1条..... 纓尾目 *Thysanura*

(5) 检索图：以特征简图代替文字叙述，或以特征图并配合文字，二者结合进行。