

张秀成 编著

疑 难 病 实 用 方 药

北京科学技术出版社

疑难病实用方药

张秀成 编著

北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

疑难病实用方药/张秀成编著. -北京: 北京科学技术出版社, 2000.10

ISBN 7-5304-2359-2

I. 疑… II. 张… III. 疑难病-验方-汇编 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 73873 号

疑难病实用方药

张秀成 编著

*

北京科学技术出版社出版

(北京西直门南大街 16 号)

邮政编码: 100035

各地新华书店经销

北京市飞龙印刷厂印刷

850 毫米×1168 毫米 32 开本 13.625 印张 354 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—5000

定价: 23.00 元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者,
本社发行科负责调换。联系电话: 66161952)

内 容 提 要

本书系统收集、整理现代中医内、外、妇、儿、男、皮肤、性病及肿瘤等科中药治病的经验，共选出单方、验方、秘方 1534 个，每个方药分别按方药组成、用法、疗效加以介绍，大部分病症在所述方药后均加有按语，不少方药堪称药专效显，用法简便，极有推广应用价值。全书按病分科编排，内容丰富实用，不仅可作为临床各科医生、中药人员，尤其是基层卫生医务人员、个体行医者的重要参考书，对广大病人及一般读者亦极有助益。

序

随着人类科技的进步，现代医学日新月异，临床医疗水平不断提高。过去所谓的“不治之症”、“顽症”不少已得到有效的治疗或治愈。但对当今世界公认的癌症、乙肝与艾滋病等不少的疑难病症仍缺乏有效的药物和疗法。因此，寻求新的有效药物和治疗方法已成为医学界的当务之急。

近些年，中医中药对许多疑难病症的治疗不断崭露头角，大量的专方专药运用于临床，常收到出人意料的疗效。现今人们崇尚回归自然，世界掀起中医热旋风。事实证明，采用中医药疗法往往独具功效，有其独特的优势。为此，我们有理由坚信，中医中药完全能够在疑难病的研究和治疗领域有所创造，有所突破，大有作为。

在现实生活中，有许多患者病急乱投医，最终却走投无路，失去康复机会。殊不知有些疑难病症原是完全可以治愈的。如果本书能为解除患者朋友们的病痛提供有益的帮助，作者将感到莫大的安慰。


多年的疑难病研究与临床医疗实践，证明验方是“伟大医学宝库”的重要组成部分，用之对症，常力克顽疾，起效快，疗效高，非一般治疗手段所能代替。相信如此众多验方的进一步推广应用，必将为防治疾病，尤其疑难病症发挥更大的作用。

本书有以下特点：①全书按疑难病定义（急性，短期内能治愈的疾患不在此范围内）进行分类，共记述各科疾病（五官科未收入）138种，系统收集、整理、精选出1534个单验方。②所选方药均经近千名临床医生验证，皆有病例与疗效分析，其中许多方剂亦由作者临证反复运用，经得起重复与检验。③不少专方专药，疗效突

出、收效迅速、使用方便；众多的单味药，药专力宏，尤其适于西医人员选方运用，常可应手取效。④书中有关病因、病机、辨证分型与治则，部分方药及中药的功用、毒副反应及临床应用意义的叙述，有助于开阔读者视野。

此书可作为临床医务工作者、科研人员，特别是广大基层中西医务人员和个体行医者的参考书，亦是广大患者及其家属的良师益友。


中国红十字会常务副会长



2000年5月

责任编辑
责任校对
封面设计

洪学仁
黄立辉
耿万义



ISBN 7-5304-2359-2

9 787530 423592 >

ISBN 7-5304-2359-2/R · 509

定价:23.00元



作者简介

张秀成，现为中国中医药学会临床药物评价专家委员会委员，香港从事中医中药研究和治疗疑难杂症多年，其成果与著述颇丰。他所发明的系列中药制剂，治疗恶性肿瘤、乙肝、糖尿病、中风以及男女不孕均获显著疗效。曾主持过五项国家部委级研究课题，并有多项研究成果获省部级奖，其中多项研究属国际先进水平，受到WHO多次报道，受到国内外刊物广泛关注。先后在国内外余篇。著作有《精子检测与分离》、《抗生育中草药》与《现代实用抗癌中药》等。

3AM 13/11
08

发展中医
为人民健康服务

疑难病实用方药

钱信忠



题辞：中华人民共和国卫生部前部长 钱信忠

目 录

| | | |
|-----------------|-------|--------|
| 第一章 内科病症 | | (1) |
| 一、呼吸系统疾病 | | (1) |
| (一) 支气管扩张 | | (1) |
| (二) 支气管哮喘 | | (2) |
| (三) 慢性支气管炎 | | (9) |
| (四) 肺气肿 | | (16) |
| 二、循环系统疾病 | | (16) |
| (一) 慢性肺源性心脏病 | | (16) |
| (二) 冠心病 | | (17) |
| (三) 心律失常 | | (26) |
| (四) 慢性心力衰竭 | | (30) |
| (五) 高血压 | | (33) |
| (六) 脑血管病 | | (43) |
| 三、消化系统疾病 | | (54) |
| (一) 慢性胃炎 | | (54) |
| (二) 消化性溃疡 | | (56) |
| (三) 上消化道出血 | | (64) |
| (四) 胃下垂 | | (68) |
| (五) 便秘 | | (70) |
| (六) 病毒性肝炎 | | (73) |
| (七) 肝硬化 | | (87) |
| 四、泌尿系统病症 | | (92) |
| (一) 泌尿系感染 | | (92) |

| | |
|-------------------|--------------|
| (二) 慢性肾炎 | (96) |
| (三) 慢性肾功能衰竭 | (101) |
| (四) 尿毒症 | (102) |
| (五) 肾病综合征 | (103) |
| (六) 乳糜尿 | (104) |
| (七) 血尿 | (106) |
| (八) 蛋白尿 | (107) |
| 五、血液系统疾病 | (109) |
| (一) 再生障碍性贫血 | (109) |
| (二) 白细胞减少症 | (111) |
| (三) 原发性血小板减少性紫癜 | (115) |
| 六、结缔组织疾病 | (118) |
| (一) 风湿性关节炎 | (118) |
| (二) 类风湿性关节炎 | (124) |
| (三) 系统性红斑狼疮 | (129) |
| 七、内分泌与代谢疾病 | (131) |
| (一) 糖尿病 | (131) |
| (二) 肥胖症 | (139) |
| (三) 甲状腺功能亢进症 | (140) |
| 八、神经系统疾病 | (142) |
| (一) 神经衰弱 | (142) |
| (二) 精神分裂症 | (146) |
| (三) 癫痫 | (150) |
| (四) 面神经麻痹 | (158) |
| (五) 三叉神经痛 | (164) |
| (六) 坐骨神经痛 | (166) |
| 第二章 外科病症 | (170) |
| (一) 颈椎病 | (170) |
| (二) 肩关节周围炎 | (170) |

| | |
|-----------------|-------|
| (三) 腰椎间盘突出症 | (172) |
| (四) 骨质增生症 | (172) |
| (五) 腰肌劳损 | (176) |
| (六) 慢性骨髓炎 | (177) |
| (七) 骨与关节结核 | (180) |
| (八) 淋巴结核 | (183) |
| (九) 甲状腺囊肿 | (186) |
| (十) 膝鞘炎 | (188) |
| (十一) 痰气 | (189) |
| (十二) 肝胆结石 | (190) |
| (十三) 泌尿系结石 | (192) |
| (十四) 血栓闭塞性脉管炎 | (198) |
| (十五) 慢性下肢溃疡 | (203) |
| (十六) 痘疮 | (206) |
| (十七) 跌打损伤 | (209) |
| (十八) 虫蛇咬伤 | (215) |
| (十九) 烧烫伤 | (219) |
| 第三章 妇科病症 | (224) |
| (一) 痛经 | (224) |
| (二) 闭经 | (227) |
| (三) 功能性子宫出血 | (229) |
| (四) 不孕症 | (233) |
| (五) 流产 | (243) |
| (六) 产后无乳、少乳 | (245) |
| (七) 乳腺增生症 | (247) |
| (八) 卵巢囊肿 | (250) |
| (九) 子宫肌瘤 | (251) |
| (十) 子宫脱垂 | (253) |
| (十一) 慢性盆腔炎 | (256) |

| | |
|-----------------|--------------|
| (十二) 子宫颈炎 | (259) |
| (十三) 阴道炎 | (263) |
| (十四) 白带 | (267) |
| (十五) 外阴瘙痒 | (269) |
| (十六) 外阴白色病变 | (269) |
| 第四章 儿科病症 | (271) |
| (一) 小儿支气管哮喘 | (271) |
| (二) 百日咳 | (273) |
| (三) 惊风 | (276) |
| (四) 夜啼症 | (277) |
| (五) 小儿营养不良 | (278) |
| (六) 婴幼儿腹泻 | (281) |
| (七) 遗尿症 | (285) |
| (八) 多汗症 | (287) |
| 第五章 男科病症 | (290) |
| (一) 附睾炎 | (290) |
| (二) 慢性前列腺炎 | (291) |
| (三) 前列腺肥大 | (294) |
| (四) 精索静脉曲张 | (298) |
| (五) 慢性精囊炎 | (300) |
| (六) 阳痿 | (301) |
| (七) 早泄 | (305) |
| (八) 遗精 | (306) |
| (九) 不射精症 | (308) |
| (十) 不育症 | (312) |
| (十一) 精子减少症 | (312) |
| (十二) 死精症 | (316) |
| (十三) 无精子症 | (319) |
| (十四) 精液不液化 | (322) |

| | |
|------------------|--------------|
| (十五) 精子抗体不育 | (324) |
| 第六章 皮肤科病症 | (326) |
| (一) 白癜风 | (326) |
| (二) 银屑病 | (329) |
| (三) 斑秃 | (333) |
| (四) 酒糟鼻 | (338) |
| (五) 腋臭 | (341) |
| (六) 黄褐斑 | (343) |
| (七) 雀斑 | (344) |
| (八) 痘疮 | (345) |
| (九) 神经性皮炎 | (347) |
| (十) 带状疱疹 | (349) |
| (十一) 湿疹 | (351) |
| (十二) 癣 | (352) |
| (十三) 疣 | (355) |
| (十四) 瘢痕增生 | (359) |
| 第七章 性传播疾病 | (361) |
| (一) 淋病 | (361) |
| (二) 梅毒 | (363) |
| (三) 尖锐湿疣 | (364) |
| (四) 生殖器疱疹 | (366) |
| (五) 非淋球菌性尿道炎 | (366) |
| (六) 外阴念珠菌病 | (367) |
| (七) 阴虱 | (369) |
| (八) 艾滋病 | (369) |
| 第八章 肿瘤 | (373) |
| (一) 脑肿瘤 | (373) |
| (二) 鼻咽癌 | (376) |
| (三) 喉癌 | (379) |

| | |
|------------|-------|
| (四) 甲状腺瘤 | (381) |
| (五) 食管癌 | (383) |
| (六) 肺癌 | (387) |
| (七) 胃癌 | (390) |
| (八) 肠癌 | (395) |
| (九) 肝癌 | (398) |
| (十) 胰腺癌 | (401) |
| (十一) 乳腺癌 | (402) |
| (十二) 子宫颈癌 | (404) |
| (十三) 绒癌 | (406) |
| (十四) 膀胱癌 | (408) |
| (十五) 恶性淋巴瘤 | (409) |
| (十六) 白血病 | (411) |
| (十七) 皮肤癌 | (414) |
| (十八) 癌痛 | (416) |
| (十九) 放化疗反应 | (419) |

第一章 内科病证

一、呼吸系统疾病

(一) 支气管扩张

本病为慢性支气管化脓性疾病，因支气管及周围肺组织慢性炎症，损坏管壁所引起的支气管扩张和变形。多继发于呼吸道感染和支气管阻塞。临床较常见。以慢性咳嗽、咳脓性痰、反复咯血为特征。继发感染可表现为发热、盗汗和消瘦等，并发肺纤维化或肺气肿时可有气促，发绀等症状。相当于中医的“咳嗽”、“咯血”、“肺痈”等病症。

【临床治验】

方药一 款冬花 9g,冰糖 9g。

将药用开水冲泡频服。

1 例支气管扩张的成年患者，因受寒咳嗽，久服药无效，经服上方获良效。

(新中医 1981;3:21)

方药二 百草霜、萝卜籽、黑盐各 6g, 藕节、人发、火麻仁各 9g。

上药煅存性，研极细末，分为 5 包，每天 1 包，以童尿冲服，咯血量多时可加黄酒 5ml 或白酒 2ml。

治疗支气管扩张合并大咯血及肺结核 44 例，收到显著疗效。

(江苏中医 1963;10:16)

方药三 鱼腥草注射液。

用 5 号针头抽取本品 2~4ml(1~2mg)，注射于孔最穴。咯血

期间每天2次，双侧孔最穴同时注射，3天为1疗程。咯血止后，改为每天1次。

所治支气管扩张咯血100例，近期治愈93例，显效3例，有效1例，无效3例。

(中医杂志 1990;31(5):40)

方药四 大黄、芒硝、甘草、薄荷、淡竹叶各6g，连翘、山栀、黄芩各9g，蜂蜜18g(兑入)。

血多者加茜草根15g，白茅根30g，白及6g；胸膈胀满加枳壳9g；胸痛加瓜蒌皮9g；气急加苏子9g；痰多加橘红、半夏、胆南星各9g；咳脓痰加鱼腥草、芦根各30g，苡仁12g，桔梗9g。水煎2次，日1剂，分2次服。10~15天为1个疗程。

经治支气管扩张咯血30例，显效(咯血停止，相应症状基本消失)22例，有效(咯血及相应症状好转)6例，无效(反复大量咯血未减轻，转外科手术)2例。

(中西医结合杂志 1985;5(5):305)

【按语】

中医认为本病诱发因素有外感风邪，火邪或七情郁结，耗伤肺阴，阴亏火炽，损及络脉而咯血。临证分为痰热瘀阻型，肝阴虚火旺、灼伤肺络型，肝火犯肺、灼伤血络型及肺虚型。急性发作期宜清热、排痰、止血；缓解期间以益气阴，行瘀滞为主，对于肺虚者，宜益肺通络，使虚者补之，瘀者散之。

方药三所用鱼腥草味辛性微寒，入肺经。擅于清热解毒、排脓消痈、利尿。又可外拔内攻，泻火消痈、攻坚拔毒，对痰热内扰者尤为适宜。

(二) 支气管哮喘

是由变应原、植物性神经功能失调或其他因素引起的广泛性、可逆性支气管痉挛的疾病。其特点是呼吸喘促、间歇发作，发作时先有胸闷、窒息感，继而有呼气性呼吸困难，往往伴有口唇青紫、额