

实用妇科病 中草药彩色图集

黄元金 彭治章 编著

广东科技出版社



实用妇科病中草药彩色图集

黄元金 彭治章 编著

广东科技出版社
· 广 州 ·

图书在版编目(CIP)数据

实用妇科病中草药彩色图集/黄元金;彭治章编著. —
广州: 广东科技出版社, 2002. 3

ISBN 7-5359-2012-8

I. 实… II. ①黄…②彭… III. 妇科病—中草药—图谱 IV. R287.4—64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 075092 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E - mail: gdkjzbb@21cn.com

出版人: 黄达全

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

排 版: 广州家家乐电分工艺有限公司

印 刷: 广东惠阳印刷厂

(广东省惠州市南坛西路 17 号 邮码: 516001)

规 格 787 mm × 1 092 mm 1/32 印张 7 字数 150 千

版 次: 2002 年 3 月第 1 版

2002 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 8 000 册

定 价: 30.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

前 言

本书是作者积累多年行医实践，并收集、整理古今诸多民间方剂、传统经验及参照有关医药文献资料综合编著而成。

我国地域宽广，气象条件复杂，中草药资源丰富而又东西南北各有差异。限于篇幅，本书仅在偏向于中、南部的中草药资源里采载常见常用的中草药 103 种，并精选治疗妇科疾病较为有效的验方 242 条。

本书收载部分现代中草药对一些妇科药用药理的最新研究成果，并统一采用现代医学病名。对收载中草药的名称亦取通用的药材名(附植物拉丁学名)，某些民间药采用地方名或原植物名。

本书图片由广西药用植物园彭治章先生主持拍摄，并由该园分类室余丽莹女士进行中草药植物分类鉴定。全书体例简明扼要，图文并茂，识药用药，一目了然，力求适合有关医患人员和广大群众参考使用。

限于水平、时间和条件，书中文字阐明及方剂筛选难免有不妥之处，有的图像从拍摄部位的构思剪裁到画面效果，亦不易尽善尽美，借此恳请读者批评指正。

编者

目 录

● 一画

- 一点红 *Emilia sonchifolia* (Linn.) DC.(2)

● 二画

- 七指蕨 *Helminthostachys zeylanica* (Linn.) Kaulf.(4)
刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.(6)

● 三画

- 千斤拔 *Flemingia macrophylla* (Willd.) Merr.(8)
土人參 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.(10)
土牛膝 *Achyranthes aspera* Linn.(12)
土密樹 *Bridelia monoica* (Lour.) Merr.(14)
大叶桉 *Eucalyptus robusta* Smith.(16)
大风艾 *Blumea balsamifera* (Linn.) DC.(18)
女贞子 *Ligustrum lucidum* Ait.(20)
广莪术 *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang.(22)
三白草 *Saururus chinensis* (Lour.) Baill.(24)
万寿菊 *Tagetes erecta* Linn.(26)
马鞭草 *Verbena officinalis* Linn.(28)

● 四画

- 水杨梅 *Adina pilulifera* (Lam.) Franch. ex Drake.(30)
水田七 *Schizocapsa plantaginea* Hance.(32)
木瓜 *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne.(34)
五指牛奶 *Ficus simplicissima* Lour. var. *hirta*
(Vahl) Migo.(36)
凤仙花 *Impatiens balsamina* Linn.(38)
丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bunge.(40)
月季花 *Rosa chinensis* Jacq.(42)
木芙蓉 *Hibiscus mutabilis* Linn.(44)
毛稔 *Melastoma sanguineum* Sims.(46)
牛繁缕 *Malachium aquaticum* (L.) Fries.(48)
元宝草 *Hypericum sampsoni* Hance.(50)
火炭母 *Polygonum chinense* Linn.(52)

● 五画

- 白蜡树 *Fraxinus chinensis* Roxb.(54)
白英 *Solanum lyratum* Thunb.(56)
白背叶 *Mallotus apelta* (Lour.) Muell. Arg.(58)
白芷 *Angelica dahurica* (Fisch.) Benth. et Hook.(60)
田七 *Panax pseudo-ginseng* Wall. var. *notoginseng*
(Burkill) Hoo et Tseng.(62)
艾 *Artemisia vulgaris* Linn.(64)
龙船花 *Ixora chinensis* Lam.(66)
仙鹤草 *Agrimonia pilosa* Ledeb.(68)

● 六画

向日葵	<i>Helianthus annuus</i> Linn.	(70)
地榆	<i>Sanguisorba officinalis</i> Linn.	(72)
刘寄奴	<i>Artemisia anomala</i> Moore	(74)
红花	<i>Carthamus tinctorius</i> Linn.	(76)
红毛毡	<i>Ardisia mamillata</i> Hance.	(78)
地笋	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var. <i>hirtus</i> Regel.	(80)

● 七画

扶桑	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> Linn.	(82)
苧麻	<i>Boehmeria nivea</i> (Linn.) Gaud.	(84)
苏木	<i>Caesalpinia sappan</i> Linn.	(86)
杜鹃	<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	(88)
鸡冠花	<i>Celosia argentea</i> Linn.	(90)
鸡血藤	<i>Spatholobus suberectus</i> Dunn.	(92)
诃子	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	(94)

● 八画

卷柏	<i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring.	(96)
侧柏叶	<i>Biota orientalis</i> (Linn.) Endl.	(98)
金银花	<i>Lonicera confusa</i> DC.	(100)
金樱子	<i>Rosa laevigata</i> Michx.	(102)
虎杖	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.	(104)
青凡木	<i>Breynia fruticosa</i> (Linn.) Hook. f.	(106)
青葙子	<i>Celosia argentea</i> Linn.	(108)

茅莓	<i>Rubus parvifolius</i> Linn.	(110)
芥菜	<i>Capsella bursa - pastoris</i> (Linn.) Medic.	(112)
苦参	<i>Sophora flavescens</i> Ait.	(114)
郁金	<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.	(116)

● 九画

香附	<i>Cyperus rotundus</i> Linn.	(118)
香茅	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf.	(120)
荔枝	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	(122)
枳椇	<i>Hovenia acerba</i> Lindl.	(124)
砂仁	<i>Amomum villosum</i> Lour.	(126)

● 十画

桂花	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.	(128)
桂党参	<i>Campanumoea javanica</i> Bl. Ssp. Japonica (Makino) Hong.	(130)
桑寄生	<i>Taxillus sutchuenensis</i> (Lecte.)Danser	(132)
桑树	<i>Morus alba</i> Linn.	(134)
莲子	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	(136)
桃金娘	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk.	(138)
益母草	<i>Leonurus heterophyllus</i> Sweet.	(140)
圆叶节节菜	<i>Rotala rotundifolia</i> (Buch. - Ham. ex Roxb.) Koehne	(142)
铁海棠	<i>Euphorbia milii</i> Ch. des Moulins	(144)

● 十一画

- 续随子 *Euphorbia lathyris* Linn.(146)
菊叶三七 *Gynura segetum* (Lour.) Merr.(148)
黄花败酱 *Patrinia scabiosaefolia* Fisch. ex Link.(150)
黄蜀葵 *Abelmoschus moschatus* (Linn.) Medic.(152)
菝葜 *Smilax china* Linn.(154)
救必应 *Ilex rotunda* Thunb.(156)
匙羹藤 *Gymnema sylvestre* (Retz.) Schult.(158)
榧木 *Loropetalum chinense* (R. Br.) Oliv.(160)
银杏 *Ginkgo biloba* Linn.(162)
排钱草 *Phylodium pulchellum* (Linn.) Benth.(164)
蛇含 *Potentilla kleiniana* Wight et Arn.(166)
犁头草 *Viola inconspicua* Bl.(168)

● 十二画

- 萱草 *Hemerocallis fulva* Linn.(170)
番木瓜 *Carica papaya* Linn.(172)
紫苏 *Perilla frutescens* (Linn.) Britt.(174)
紫金牛 *Ardisia japonica* (Hornst.) Bl.(176)
紫薇 *Lagerstroemia indica* Linn.(178)
棕桐 *Trachycarpus fortunei* (Hook. f.) Wendl.(180)
黑芝麻 *Sesamum indicum* DC.(182)

● 十三画

- 蜀葵 *Althaea rosea* Cav.(184)

赧桐	<i>Caryopteris japonicum</i> (Thunb.) Sweet	·····(186)
蜈蚣草	<i>Achillea wilsoniana</i> Heimerl.	·····(188)
蓖麻	<i>Ricinus communis</i> Linn.	·····(190)
蒲公英	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand. - Mazz:	·····(192)
蒺藜	<i>Tribulus terrestris</i> Linn.	·····(194)

● 十四画

豨莶草	<i>Siegesbeckia orientalis</i> Linn.	·····(196)
酸藤果	<i>Embelia laeta</i> (Linn.) Mez.	·····(198)

● 十五画

橄榄	<i>Canarium album</i> (Lour.) Raeusch.	·····(200)
----	--	------------

● 十七画

翼核果	<i>Ventilago leiocarpa</i> Benth:	·····(202)
-----	-----------------------------------	------------

● 十八画

瞿麦	<i>Dianthus superbus</i> Linn.	·····(204)
----	--------------------------------	------------

● 二十画

蕹荷	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Rosc.	·····(206)
----	--------------------------------------	------------



一点红

别名 红背叶，叶下红，红背紫丁。

来源 为菊科一点红属植物一点红 *Emilia sonchifolia* (Linn.) DC. 的全草做药。

形态 本味系一年生或多年生草本(图1)，高60厘米上下。折断有乳白汁流出，全株有白色毛。茎直立，少分枝。茎下部的叶片长8厘米上下，卵形，琴状分裂，边缘呈钝齿，上部的叶小，全缘，耳状，抱茎，无柄，叶背呈紫红色。头状花序，具长柄，花枝二歧分枝。总苞绿色，圆柱状，基部稍膨大。花紫色，均为管状花。花期于春末至冬初。瘦果圆柱形，有棱；冠毛白色，质柔软。

分布 生于旷野、村旁、路边、田畦等地方。分布于江西、福建、湖南、贵州、云南、广西、广东等省区。

采集 夏、秋采收，去杂质洗净，鲜用或晒干备用。

成分 叶显黄酮甙、糖类的反应。

药理 对溶血性金黄色葡萄球菌有抑制作用。

性味 苦、凉。

功效 清热解毒、散瘀消肿。

用法用量 内服，水煎15~30克。外用适量，鲜品捣烂敷患处。

验方

1. 乳腺炎：一点红鲜全草洗净，约60克，水煎服，每日1剂。另取一点红(干品)、穿心莲、白花蛇舌草、鸡骨香、两面针各50克，共研细粉。经高压消毒后，加凡士林至100克，即成25%的药膏。敷患处，每日1次。

2. 盆腔脓肿(输卵管脓肿)：一点红、穿心莲各2500克，蜂蜜适量。按以下做法，制成蜜丸，每丸约9克。

取上述2药洗净，烘干，粉碎过100目筛；按每100克药粉与炼蜜约130克，制成大蜜丸，包装即得。每次口服1丸，每日3次。



图 1 一点红

七 指 蕨

别名 蜈蚣草、入地蜈蚣。

来源 为蕨类七指蕨科七指蕨属植物七指蕨 *Helminthostachys zeylanica* (Linn.) Kaulf. 的全草或根状茎做药。

形态 本味系多年生草本(图2)，高50厘米上下。根壮茎粗，沿主根有多数肉质粗须根，形似蜈蚣横走，故称为“入地蜈蚣”。营养叶1~2片，从根状茎近顶端抽出；叶柄粗长，约40厘米上下，托叶2，肉质，长圆形，叶片3出，长25厘米上下，宽15厘米左右；羽片再不甚规则地裂为1顶生小羽片和1~2对侧生小羽片，基部有略具窄翅的短柄；孢子囊穗单生，柄长8厘米，直立，青绿色，孢子囊球形，无柄。

分布 生于石山林荫下，灌木丛中。分布于台湾、福建、江西、湖南、广东、广西、云南等省区。

采集 全年可采，洗净、晒干用或鲜用。

性味 苦，微寒、凉。

功效 清热化湿、散瘀镇痛。

用法用量 内服，水煎9~15克。

验方

1. 股白肿(产后10天左右出现发热、患脚下肢疼痛，炎症栓塞部位有明显局部压痛、肿胀，如有动脉栓塞，足背、踝或脘动脉搏动消失)；七指蕨鲜根茎90克(洗净切细)、丹皮12克、丹参15克，水煎服，每日1剂，连续服用20天。此方有治愈或缓解症状效果。

2. 产后腹痛或恶露不绝：入地蜈蚣鲜根茎60克，益母草鲜全草、仙鹤草鲜全草各30克，水煎服，每日1剂。如失血过多，比较虚弱患者，每次可取阿胶10克(烊化)以药液冲服。



图 2 七指蕨

刀 豆

别名 挟剑豆、野刀板藤、刀豆角。

来源 为豆科刀豆属植物刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. 的种子、果壳做药。

形态 本味系缠绕草质藤本(图3)，长有数米。藤状三出复叶互生，大叶叶柄长15厘米上下，小叶叶柄长至1厘米左右；小叶、大叶均宽卵形，先端渐尖，基部近圆形，两面无毛。头状花序腋生，淡红或淡紫色蝶形花；萼具上下唇形；雄蕊10，二体；子房有疏长硬毛。花期于夏季。荚果呈略弯长方形，长30厘米上下，宽3厘米左右，先端具钩状短喙，形态似刀鞘。荚果边缘有明显凸出的隆脊；种子肾形，红色或褐色，长约3.5厘米。荚壳干后种子松动，破壳易出。

分布 生于较温暖的丘陵地带。分布于长江以南各省区。多有栽培。

采集 秋季采收，切片晒干备用或鲜用。

成分 含蛋白质及游离氨基酸、刀豆氨基酸等。

性味 甘，温。

功效 通经活血、散瘀止痛。

用法用量 内服，水煎，种子6~9克；壳及根30~60克。

验方

1. 闭经：刀豆根60克(鲜品120克)、益母草15克，水煎服，每日1剂。
2. 痛经或少女月经初期疼痛：刀豆子50克、黑豆50克、红枣15枚、猪肚1/3具，炖服。此方有治疗、保健作用。
3. 产后腹痛，恶露不绝：刀豆鲜根30克、香附20克，将2味洗净，醋炒至焦脆为度，水煎服，每剂煎服2次，每日1~2剂。依病情而定。此方有止血、止痛作用，一般服1~2剂见效。
4. 产后痹痛：刀豆子1000克、田七叶2000克、淀粉60克，按以下制法，制成1000片。

取刀豆子、田七叶洗净，切碎(打碎)，加水煎煮2次，每次煮沸一个半小时，过滤，合并滤液，浓缩成稠膏；加入淀粉搅匀，烘干粉碎，用乙醇制颗粒，干燥过筛，加入适量滑石粉混匀压片，包糖衣即得。每次服4~6片，每日3次。此方用于瘀滞闭经、瘀滞腹痛均可。



图3 刀豆