

外科考题解

主 编

马永江 仲剑平 喻德洪

编 译

叶必远	申功恩	刘植珊	过宗南	仲剑平
华积德	孙道华	李光业	陈 汉	邱广义
沈炎民	杨瑞和	杨甲梅	金国翔	张长水
张宝仁	季正伦	周正端	周镇万	姜贞祥
郑家富	赵孟尧	耿振江	钱松溪	顾雄华
唐 岩	曹桂松	屠 岳	喻德洪	

审 校

马永江	刘植珊	朱 诚	仲剑平	华积德
吴孟超	赵连璧	徐化民	高学书	高 瀚
	喻 德 洪	蔡 用 之		

民 卫 生 出 版 社

责任编辑：高 闻

外 科 考 题 解

马永江 仲剑平 喻德洪 主编

人民卫生出版社出版
(北京市崇文区天坛西里10号)

四川新华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 27³/₄印张 4插页 621千字

1983年4月第1版 1983年4月第1版第1次印刷

印数：00,001—43,130

统一书号：14048·4326 定价：2.85 元

[科技新书目53--81]

前 言

本书是根据美国医学考试出版公司 (Medical Examination Publishing Company) 1971年出版的第5版《医学试题》第5卷《外科学》编译的。

《医学试题》是为了适应医学院校毕业生参加美国医师国家考试的需要而编写的,是一套包括从基础到临床各学科的系列性医学考试复习书籍。该书全部采用“多项选择测试题”(multiple choice questions),由于题目多,涉及面广,应试者必须对本专业有较坚实的基础,并对其现状和进展有充分了解,方能作出正确回答。因此,使用本测试题,能在较短时间内,较全面地考核应试者掌握本专业知识的深度和广度。

本书分12章,即腹部外科,基础科学,头颈部外科,神经外科,矫形外科,小儿外科,周围血管外科,整形外科,直肠外科,胸部外科,创伤外科,泌尿外科。原有试题2,000个,我们在编译时,从我国实际情况出发,删除了少数试题,并更改了少数试题的题目及答案。

原书只有“试题”和“回答”两部分,其后虽附有指定的参考书目,但考虑到我国多数读者得不到指定的参考书和文献,因此,我们编写了“解释”。这样,本书便由问、答、解三部分组成。解释部分是根据国内外的主要教科书和专

著，对回答作出简明扼要的说明。

本书主要供一般外科医师和医学院校学生阅读，也可供外科教学人员参考。对自学者也有辅益。

在本书的编译过程中，承蒙邹宜昌、邓祖尧同志给予大力支持，谨致谢意。

参加本书编译的人员较多，虽几经审修，但限于水平，不妥和错误之处在所难免，敬请读者批评指正。

马永江 仲剑平 喻德洪

一九八二年五月于第二军医大学

目 录

第一部分 试题..... (1)

第 一 章 腹部外科..... (1)

第 二 章 基础科学..... (79)

第 三 章 头颈部外科..... (127)

第 四 章 神经外科..... (160)

第 五 章 矫形外科..... (175)

第 六 章 小儿外科..... (210)

第 七 章 周围血管外科..... (249)

第 八 章 整形外科..... (267)

第 九 章 直肠外科..... (284)

第 十 章 胸部外科..... (302)

第十一章 创伤外科..... (361)

第十二章 泌尿外科..... (395)

第二部分 回答..... (429)

第三部分 解释..... (443)

第 一 章 腹部外科..... (443)

第 二 章 基础科学..... (520)

第 三 章 头及颈部外科..... (570)

第 四 章 神经外科..... (601)

第 五 章 矫形外科..... (618)

第 六 章	小儿外科.....	(661)
第 七 章	周围血管外科.....	(702)
第 八 章	整形外科.....	(721)
第 九 章	直肠外科.....	(738)
第 十 章	胸部外科.....	(755)
第十一章	创伤外科.....	(813)
第十二章	泌尿外科.....	(854)

第一部分 试 题

第一章 腹 部 外 科

对下列有多个答案的问题，选择一个最适当的答案：

1. 下列哪一种免疫抑制方法是最危险的？
 - A. 摘除淋巴组织
 - B. 胸导管引流
 - C. 体外照射血液或淋巴
 - D. 全身照射
 - E. 抗淋巴细胞血清

2. 下列哪个器官移植后有最好的成功记录？
 - A. 胰腺
 - B. 肝
 - C. 小肠
 - D. 脾
 - E. 肺

3. 下列除哪条外都是上消化道出血鉴别诊断的最好方法？
 - A. 食管镜检查
 - B. 上消化道钡餐检查
 - C. 三腔管气囊填压
 - D. 脾髓测压和门静脉造影

E. 吞线试验

4. 次全胃切除后，十二指肠残端裂开最常见的原因是：
- A. 低血浆蛋白
 - B. 麻醉期中低血压
 - C. 回肠轴向扭转
 - D. 肠胀气引起的残端坏死
 - E. 胰瘘
5. 高位小肠梗阻的初期治疗应是：
- A. 肠切除
 - B. 插入长的胃肠减压管
 - C. 禁食与补液
 - D. 抗菌素
 - E. 抗胆碱药
6. 脾髓测压对下面哪一种疾病的鉴别诊断有帮助？
- A. 地中海贫血〔库利 (Cooley) 贫血〕
 - B. 十二指肠溃疡出血
 - C. 空肠血管瘤
 - D. 食管静脉曲张出血
 - E. 脾功能亢进
7. 肠侧侧吻合所致的盲袢综合征可造成什么？
- A. 巨红细胞性贫血
 - B. 手足抽搐
 - C. 低蛋白血症

- D. 维生素B₁₂吸收不良
E. 所有以上都是
8. 下列除哪条外均为治疗急性胃扩张的方法?
A. 抗菌素治疗
B. 胃肠减压
C. 水与电解质的补充
D. 避免使用镇静药
E. 保持胃肠减压管的通畅
9. 下列哪些情况应探查胆总管?
A. 阻塞性黄疸患者
B. 胰腺炎患者
C. 胆总管扩张时
D. 胆囊内未扪及结石而临床检查提示有胆石症
E. 所有以上都是
10. 夏科 (Charcot) 三联征对什么病有诊断意义?
A. 急性憩室炎
B. 急性出血性胰腺炎
C. 急性胆管炎
D. 十二指肠憩室
E. 胃溃疡
11. 阿米巴肝脓肿应作开放引流的情况是:
A. 所有阿米巴脓肿病例
B. 内科治疗无效的病例

- C. 脓肿继发化脓性细菌感染者
- D. 脓肿局限于肝脏者
- E. 皮肤抗原反应阳性时

12. 胆囊的胆固醇沉积症最好的诊断方法是：

- A. 胆囊造影检查
- B. 十二指肠引流液检查
- C. 手术中发现
- D. 血胆固醇水平
- E. 前面三条都是

13. 手术中发现病人患有胆固醇沉积症时，胆囊肉眼所见应为：

- A. 胆囊皱缩
- B. 胆囊显著扩张、壁薄
- C. 胆囊外表正常
- D. 胆囊壁增厚
- E. 有急性炎症

14. 胃、十二指肠穿孔患者的治疗可采用：

- A. 保守治疗
- B. 穿孔修补术
- C. 胃次全切除术
- D. 上述方法均可采用
- E. 上述方法均不可采用

15. 新生儿脐膨出最好立即施行手术处理，其理由是：

- A.怕感染
- B.患儿将发生肠梗阻
- C.以后内容物不能还纳
- D.覆盖物是母体的组织
- E.肠旋转异常

16. 阑尾残端安全处理的最好方法是:

- A.结扎
- B.结扎和包埋
- C.单纯包埋
- D.挤压
- E.石炭酸烧灼

17. 下列除哪条外都是胰腺移植部位不受限制的理由:

- A.自主神经不需要吻合
- B.静脉血不必回入门静脉系统
- C.动脉不必来自腹腔动脉
- D.胰管必须联接于高位小肠
- E.胰岛素吸收不需要专门途径

18. 关于器官移植的排斥现象,下列除哪条外都是正确的?

- A.排斥加重时血流增加
- B.大部分异体移植排斥在14天内接近完成
- C.淋巴细胞是与排斥有关系的主要细胞
- D.其特点是移植器官被密集的炎性细胞浸润
- E.对植入供体的长期有效的免疫性是不能通过血清来

传递的

19. 移植排斥现象非常类似:

- A. 血清免疫
- B. 结核菌素反应
- C. 被动免疫
- D. 侏儒病现象
- E. 上述都不是

20. 胃、空肠、结肠瘻的理想治疗方法是:

- A. 内科处理
- B. 胃切除术
- C. 结肠造口术
- D. 胃、空肠及结肠切除术
- E. 空肠造口术

21. 胃次全切除术后吻合口溃疡出血的最好治疗方法是:

- A. 保守治疗
- B. 胃内降温
- C. 切除胃及空肠
- D. 迷走神经切断术
- E. 寻找胰腺肿瘤

22. 儿童肾胚胎瘤〔维耳姆斯 (Wilms) 瘤〕的最好治疗方法是:

- A. 化学药物治疗
- B. 肾切除
- C. 肾切除加术前放射治疗

- D. 肾切除加术后放射治疗
- E. 肾切除加化疗

23. 阑尾脓肿包块消散后，接着应采取下列哪项措施：

- A. 停用抗菌素
- B. 继续用抗菌素
- C. 择期阑尾切除术
- D. 让病人出院
- E. 每年用 X 线随访检查

24. 腹部大手术后发生急性肾功能衰竭，常先有：

- A. 术中低血压
- B. 输血的溶血反应
- C. 完全夹住主动脉或肾血管
- D. 以上任何一种都是
- E. 以上情况都不是

25. 哪种情况下需施行海勒（Heller）手术：

- A. 巨结肠
- B. 食管癌
- C. 食管贲门失弛缓症
- D. 局限性肠炎
- E. 膈疝

26. 食管下端及贲门腺癌的最好处理方法是：

- A. 抗代谢药物
- B. 营养性空肠造瘘

C.手术切除

D.放射治疗

E.电灼术

27. 下列除哪条外都是麻痹性肠梗阻常见的症状与体征:

A.腹胀

B.肠鸣音亢进

C.无绞痛

D.大小肠均胀气

E.病人可以无发热

28. 下列除哪条外均为胰岛细胞瘤的特征:

A.低血糖症 (血糖 <50 毫克%)

B.进食葡萄糖后可使症状缓解

C.空腹时有精神症状

D.空腹时有恶心呕吐

E.胰腺头部肿大

29. 肝硬化门静脉高压病人引起腹水的常见原因是:

A.低血浆蛋白

B.门静脉阻塞

C.肝静脉阻塞

D.肝萎缩

E.上述都是

30. 门腔静脉分流术后发生脑病的病因是:

A.摄入大量蛋白

- B. 氨中毒
- C. 胃肠道出血
- D. 饥饿
- E. 上述都是

31. 下列有关静脉尿路摄影术的说明,哪一条与实际最不符合?

- A. 它不包括膀胱镜检查
- B. 所显示的肾盂常不及逆行肾盂造影清晰
- C. 存在着一定的危险性如休克、过敏反应等
- D. 病肾排泄造影剂的能力差,因而不能有足够的浓度满意地显示尿路
- E. 肾小管可能为造影剂所阻塞

32. 施行左肾切除时,须特别小心肾脏后壁与下列哪一个组织的关系:

- A. 胰尾
- B. 脾血管
- C. 胸膜
- D. 横结肠
- E. 膈结肠韧带

33. 下列各项中哪一个在胆汁引流液中不能找到:

- A. 贾第虫 (Giardia) 滋养体
- B. 肺炎球菌
- C. 伤寒杆菌
- D. 支睾吸虫卵

E.大肠杆菌

34. 急性胃扩张用什么方法可以很快得出诊断:

- A.立位胸片
- B.腹腔穿刺吸引
- C.插入鼻胃管
- D.腹部平片
- E.火焰光度计试验

35. 当前在器官移植中,用以控制排斥现象的 各种免疫抑制药的最大缺点是:

- A.淋巴细胞减少
- B.促进血管内凝血
- C.使组织致敏
- D.对细菌的免疫力减弱
- E.用药时间太长

36. 下列哪种因素易引起切口疝:

- A.切口感染
- B.术后腹胀
- C.直切口
- D.切口缝合不正确
- E.上述都是

37. 下列除哪条外都是异位妊娠破裂前的特征:

- A.闭经
- B.妊娠试验阳性

- C.严重腹痛
 - D.阴道少量出血
 - E.附件肿块
38. 下列除哪条外都是先天性膈疝的特征:
- A.呼吸困难
 - B.呕吐
 - C.紫绀
 - D.贫血
 - E.X线检查见到胸腔内有充气的肠管
39. 食管穿孔是由于:
- A.食管镜检查
 - B.吞入异物
 - C.严重呕吐
 - D.肿瘤侵蚀
 - E.上述各项都是
40. 黄疸、寒战、发热综合征提示何种疾病:
- A.胆总管结石
 - B.胆囊积水
 - C.高胆固醇血症
 - D.病毒性肝炎
 - E.库瓦济埃 (Courvoisier) 定律
41. 小肠梗阻引起的疼痛常被描述为:
- A.钝痛