


高等数学 专题辅导讲座(上册)

蔡高厅 邱忠文 主编



国防工业出版社
<http://www.ndip.cn>

高等数学专题辅导讲座

(上册)

蔡高厅 邱忠文 主编

国防工业出版社

·北京·

内 容 简 介

该书为高等工科院校本科生“高等数学”课程辅导书,共有上、下两册,本书为上册,包括函数、极限、连续,导数、微分及其应用,不定积分、定积分及其应用,矢量代数和空间解析几何等。

全书内容全面,重点突出,本书上册共分为4个单元19个专题讲座进行辅导,例题详实典型,分析透彻清晰,方法实用而且富于创新,是天津大学著名数学教育专家蔡高厅教授、邱忠文教授多年从事高等数学教学经验和智慧的结晶。

本书适合于高等院校师生学习使用,不仅可以作为硕士研究生入学考试复习参考书,而且可以作为网络高等教育、高等职业技术教育、成人高等教育以及函授教育的辅导教科书。

图书在版编目(CIP)数据

高等数学专题辅导讲座.上册/蔡高厅,邱忠文主编.
北京:国防工业出版社,2003.10
ISBN 7-118-03125-9

I.高... II.①蔡...②邱... III.高等数学—教学参考资料 IV.013

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 022930 号

国防工业出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号)

(邮政编码 100044)

北京奥隆印刷厂印刷

新华书店经营

*

开本 850×1168 1/32 印张 10% 280 千字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月北京第 1 次印刷

印数:1—4000 册 定价:15.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

前 言

为了适应高等工科院校本科生对高等数学课程的学习需要,结合当前的教学实际,我们编写了《高等数学专题辅导讲座》,作为高等数学课程的教学参考书。本书无论对全日制普通高等学校的学生,或是网络高等教育、函授、高等职业技术教育及成人高等教育的学生学习高等数学都是较为合适的辅导教科书。

高等数学是高等理工科、经济、管理类院校最主要的基础课之一,对学生在校期间的学习和今后的发展都将产生深远的影响。本书的编者在全日制普通高等学校长期从事高等数学及应用数学的教学工作,最近几年又在远程高等教育及高等职业技术教育的教学中积累了丰富的经验,深刻了解学生学习情况和要求,本书就是为了满足学生学习的要求,辅导学生更好地学习高等数学而编写的辅导教科书。书中对学生所学的高等数学知识,系统地进行归纳总结,通过实例进行剖析深化,对相关的内容进行融会贯通。

本书分为上、下两册。全书内容覆盖了现行的理工类院校高等数学教学的全部内容。上册包括函数、极限、连续、导数、微分及其应用,不定积分、定积分及其应用,矢量代数和空间解析几何等,共分为4个单元19个专题进行辅导,内容丰富,例题详实,分析透彻,富于启发,文字通顺,便于自学。

本书的编写和出版得到天津大学网络教育学院的大力支持和教学管理部的具体帮助,编者表示深切的感谢。

参加本书编写的有蔡高厅、邱忠文、李君湘、于桂贞、刘瑞金、韩健、韩月丽、孙秀萍等,由于编者的水平所限,对书中的错误之处,敬请读者批评指正。

编 者

目 录

第一单元	函数、极限与函数的连续性	1
第一讲	函数的基本知识	1
第二讲	求数列和函数极限的方法	19
第三讲	函数的连续性和间断点	38
第二单元	一元函数微分学	58
第四讲	导数的概念	58
第五讲	几类函数的微分法	73
第六讲	导数几何意义的应用——函数曲线的切线 问题	95
第七讲	微分中值定理	107
第八讲	求数列和函数极限的方法(续)——罗比塔 法则	126
第九讲	利用导数研究可导函数的几何性态	143
第十讲	证明不等式与讨论方程的根的方法概述	160
第三单元	一元函数积分学	182
第十一讲	不定积分的概念与基本积分法	182
第十二讲	几类函数的不定积分	201
第十三讲	定积分的概念和性质	220
第十四讲	定积分的基本计算方法	232
第十五讲	关于定积分的等式及不等式的证明方法 概述	253
第十六讲	定积分的应用	271
第四单元	矢量代数与空间解析几何	287
第十七讲	矢量代数	287

第十八讲 平面与直线的方程·····	294
第十九讲 曲面与空间曲线的方程·····	319
常用符号索引·····	332

第一单元 函数、极限与函数的连续性

第一讲 函数的基本知识

人们观察任何一个自然现象或生产过程,总会发现其中某些数量在不断地发生着变化,这种能取得不同数值的量称为变量.诸变量之间相互依从关系称为函数关系.这种关系在数学中的表现形式称为函数.函数是微积分学研究的主要对象,因此掌握函数的基本知识是学习高等数学的基础.

基本概念和重要结论

1. 函数定义

设有两个数集 A 和 B , f 是一个确定的对应规律,如果 $\forall x \in A$, 通过 f 都有惟一的数 $y \in B$ 和它对应,记为

$$x \xrightarrow{f} y, \text{ 或 } f(x) = y,$$

则称 f 是 A 到 B 的函数,或 f 是数集 A 上的函数,并称 A 为函数的定义域.

当 x 遍取 A 中的一切数时,与它对应的数 y 组成的数集

$$B_f = \{y \mid y = f(x), x \in A\}$$

称 B_f 为函数的值域,并称变量 x 为自变量;变量 y 为因变量.

2. 函数的几个性质

1) 有界性

设函数 $f(x)$ 在数集 A 上有定义,若存在常数 $M > 0$,使得 $\forall x \in A$, 恒有

$$|f(x)| \leq M,$$

则称函数 $f(x)$ 在 A 上有界.

2) 单调性

设函数 $f(x)$ 在数集 A 上有定义, 若 $\forall x_1, x_2 \in A$, 且 $x_1 < x_2$, 恒有

$$f(x_1) < f(x_2) \text{ (或 } f(x_1) > f(x_2) \text{)},$$

则称函数 $f(x)$ 在 A 上严格单调增 (或严格单调减). 当恒有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ (或 $f(x_1) \geq f(x_2)$) 时, 称函数 $f(x)$ 在 A 上广义单调增 (或广义单调减).

3) 奇偶性

设函数 $f(x)$ 在某个对称于原点的数集 A 上有定义:

若 $\forall x \in A$, 恒有

$$f(-x) = f(x), \text{ 或 } f(x) - f(-x) = 0,$$

则称 $f(x)$ 为 A 上的偶函数.

若 $\forall x \in A$, 恒有

$$f(-x) = -f(x), \text{ 或 } f(x) + f(-x) = 0,$$

则称 $f(x)$ 为 A 上的奇函数.

奇偶函数的运算性质:

(1) 奇(偶)函数的代数和仍是奇(偶)函数;

(2) 偶数个奇函数之积是偶函数, 奇数个奇函数之积仍是奇函数;

(3) 一个奇函数与一个偶函数之积是奇函数.

4) 周期性

设函数 $f(x)$ 在某个数集 A 上有定义, 若存在常数 $T > 0$, 使得对 $\forall x \in A$, 且有 $x + T \in A$, 恒有

$$f(x + T) = f(x),$$

则称 $f(x)$ 为周期函数. 满足上面等式的最小的 T 值称为 $f(x)$ 的周期.

周期函数的运算性质:

(1) 若 $f(x)$ 、 $g(x)$ 皆是以 T 为周期的函数, 则 $f(x) \pm g(x)$ 也是以 T 为周期的函数;

(2) 若 $f(x)$ 、 $g(x)$ 分别是以 T_1 与 T_2 ($T_1 \neq T_2$) 的周期函数, 则 $f(x) \pm g(x)$ 是 T_1 、 T_2 的最小公倍数 T 为周期的函数;

(3) 若 $f(x)$ 是以 T 为周期的函数, 则 $f(px+q)$ ($p \neq 0$) 是以 $\frac{T}{|p|}$ 为周期的函数.

3. 复合函数

设 $y = f(u)$ 是数集 B 上的函数, 而 $u = \varphi(x)$ 是由数集 A 到 B 的一个非空子集 B_φ 的函数, 对 $\forall x \in A$, 通过 u , 都有惟一的 y 与它对应, 这时在 A 上产生了一个新的函数, 用 $f \circ \varphi$ 表示, 函数 $f \circ \varphi$ 称为 A 上的复合函数, 记作

$$x \xrightarrow{f \circ \varphi} y, \text{ 或 } y = f[\varphi(x)], x \in A$$

这里 u 称为中间变量, A 是 $f \circ \varphi$ 的定义域.

4. 反函数

设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 A , 值域为 W , 那么对 $\forall y \in W$, 必存在 $x \in A$, 使得 $f(x) = y$, 这时如果把 y 看做自变量, x 看做因变量, 按照函数概念就得一个新函数, 这个新函数称为函数 $y = f(x)$ 的反函数, 记为 $x = f^{-1}(y)$, 其定义域为 W , 值域为 A .

习惯上自变量用 x 表示, 因变量用 y 表示, 那么函数 $y = f(x)$ 的反函数也可记作 $y = f^{-1}(x)$.

5. 初等函数

1) 基本初等函数

常数函数、幂函数、三角函数、反三角函数、指数函数和对数函数统称为基本初等函数.

2) 初等函数

由基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的函数的复合步骤所构成的并可用一个解析式子表达的函数, 称为初等函数.

一、求函数的定义域

因为初等函数是由基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的复合步骤而构成的函数, 所以要求初等函数的定义域首先

必须掌握基本初等函数的定义域,在基本初等函数中有一部分函数在整个实数集 $\mathbf{R}$ 上有定义,例如幂函数中 $x^n (n \in \mathbf{N})$, 指数函数 $a^x (a > 0, a \neq 1)$, 三角函数中的 $\sin x, \cos x$, 反三角函数中的 $\arctan x, \operatorname{arccot} x$, 而另一部分函数仅在实数集 $\mathbf{R}$ 的某个子集 $\mathbf{D}$ 上有定义,例如幂函数中的 $x^{-n}, x^{\frac{1}{2n}} (n \in \mathbf{N})$, 对数函数 $\log_a x (a > 0, a \neq 1)$, 三角函数中的 $\tan x, \cot x$, 反三角函数中的 $\arcsin x, \arccos x$ 等,熟练地掌握这些基本初等函数的定义域,对求初等函数的定义域将会起到十分重要的作用。

例 1.1 设函数 $f(x) = \sqrt{x+1} + \frac{1}{\lg(1-x)}$,

(1) 求函数 $f(x)$ 的定义域;

(2) 求函数 $f(\ln x)$ 的定义域;

(3) 求函数 $f(x-a) + f(x+a)$ 的定义域 $\left(0 < a < \frac{1}{2}\right)$ 。

解 (1) 函数 $f(x)$ 是由两个简单的初等函数 $(x+1)^{\frac{1}{2}}$ 与 $\frac{1}{\lg(1-x)}$ 相加而成的,先求两个简单的初等函数的定义域:

为了使 $(x+1)^{\frac{1}{2}}$ 有定义,自变量 x 必须满足不等式

$$x+1 \geq 0,$$

为了使 $\frac{1}{\lg(1-x)}$ 有定义,自变量 x 还必须满足不等式

$$\begin{cases} 1-x > 0, \\ 1-x \neq 1. \end{cases}$$

因此,为了使 $f(x)$ 有定义, x 就必须满足由以上三个不等式构成的不等式组

$$\begin{cases} x+1 \geq 0, \\ 1-x > 0, \\ 1-x \neq 1. \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x \geq -1, \\ x < 1, \\ x \neq 0. \end{cases}$$

上面不等式组的解集就是函数 $f(x)$ 的定义域:

$$D_f = \{x \mid x \in [-1, 0) \cup (0, 1)\}.$$

(2) 求 $f(\ln x)$ 的定义域. 函数 $f(\ln x)$ 是由 $f(u)$, $u = \ln x$ 复合而成, 为了使 $\ln x$ 有定义, x 必须满足不等式

$$x > 0.$$

其次, 为了使 $f(\ln x)$ 有定义, x 还必须满足不等式

$$-1 \leq \ln x < 0, \text{ 或 } 0 < \ln x < 1.$$

因此, 为了使 $f(\ln x)$ 有定义, x 必须满足由以上三个不等式构成的不等式组

$$\begin{cases} x > 0, \\ -1 \leq \ln x < 0. \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x > 0, \\ 0 < \ln x < 1. \end{cases}$$

上面不等式组的解集就是函数 $f(\ln x)$ 的定义域:

$$D_f = \{x \mid x \in [e^{-1}, 1) \cup (1, e)\}$$

(3) 求 $f(x-a) + f(x+a)$ ($0 < a < \frac{1}{2}$) 的定义域.

为了使 $f(x-a)$ 有意义, x 必须满足不等式

$$-1 \leq x-a < 0, \text{ 或 } 0 < x-a < 1.$$

为了使 $f(x+a)$ 有意义, x 必须满足不等式

$$-1 \leq x+a < 0, \text{ 或 } 0 < x+a < 1.$$

为了使 $f(x-a) + f(x+a)$ 有意义, x 必须满足由上面 4 个不等式构成的不等式组:

$$\begin{cases} -1 \leq x-a < 0, \\ -1 \leq x+a < 0. \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 0 < x-a < 1, \\ 0 < x+a < 1. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} -1+a \leq x < a, \\ -1-a \leq x < -a. \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a < x < 1+a, \\ -a < x < 1-a. \end{cases}$$

不等式组的解集为

$$-1+a \leq x < -a, \text{ 或 } a < x < 1-a$$

因此, 函数 $f(x-a) + f(x+a)$ 的定义域是

$$D_f = \{x \mid x \in [-1+a, -a) \cup (a, 1-a)\}$$

例 1.2 设函数 $f(x) = \frac{x}{x-1}$, 求函数 $f\left[\frac{1}{f(x)}\right]$ 的定义域.

解 为了使 $f(x)$ 有意义, x 必须满足不等式

$$x - 1 \neq 0.$$

为了使 $\frac{1}{f(x)}$ 有意义, x 必须满足不等式组

$$\begin{cases} x - 1 \neq 0, \\ f(x) = \frac{x}{x-1} \neq 0. \end{cases}$$

为了使 $f\left[\frac{1}{f(x)}\right]$ 有意义, x 还必须满足

$$\frac{1}{f(x)} - 1 \neq 0, \text{ 即 } f(x) = \frac{x}{x-1} \neq 1,$$

此不等式显然成立, 因此, 为了使 $f\left[\frac{1}{f(x)}\right]$ 有意义, x 必须满足上面两个不等式构成的不等式组

$$\begin{cases} x - 1 \neq 0, \\ \frac{x}{x-1} \neq 0. \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x \neq 1, \\ x \neq 0. \end{cases}$$

所以, $f\left[\frac{1}{f(x)}\right]$ 的定义域是

$$D_f = \{x \mid x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)\}$$

综上两例可知, 求初等函数的定义域的步骤如下:

(1) 确认函数 $f(x)$ 是由哪几个简单的初等函数或基本初等函数经过四则运算或复合步骤而构成的函数;

(2) 为了使这些简单的初等函数或基本初等函数有定义, 求出自变量 x 必须满足的不等式;

(3) 把以上这些不等式联立在一起, 就得到 x 必须满足的不等式组;

(4) 解这个不等式组, 所得到的解集就是所求的函数 $f(x)$ 的定义域.

二、抽象函数符号的运用

在函数概念中, 自变量 x 的取值范围, 即函数的定义域及自变量 x 与因变量 y 的对应规律 f , 通常称为函数 ($y = f(x)$) 概念的

两要素. 因此能熟练地运用抽象的函数符号来表达一个函数, 是学习高等数学的基本知识之一.

在函数的表示法中, 只需把函数的定义域以及自变量和因变量的对应规律表达清楚, 而与用什么字母来表示自变量和因变量无关. 这种函数表示法的“无关性”, 对抽象函数符号运用十分重要.

例 1.3 设 $f(x) = \frac{x+1}{x}$, 求 $f[f(x)]$ 及 $f\left[\frac{1}{f(x)+1}\right]$ 的表达式和定义域.

$$\text{解} \quad (1) f[f(x)] = \frac{f(x)+1}{f(x)} = \frac{\frac{x+1}{x} + 1}{\frac{x+1}{x}} = \frac{2x+1}{x+1}$$

为了使 $f(x)$ 有意义, x 必须满足不等式

$$x \neq 0,$$

为了使 $\frac{f(x)+1}{f(x)}$ 有意义, 除了 x 必须满足不等式 $x \neq 0$ 之外, 还必须满足不等式

$$f(x) \neq 0, \text{ 即 } \frac{x+1}{x} \neq 0.$$

即复合函数 $f[f(x)]$ 的自变量 x 必须满足不等式组

$$\begin{cases} x \neq 0, \\ x \neq -1. \end{cases}$$

于是 $f[f(x)]$ 的定义域为 $D = \{x \mid x \in (-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, +\infty)\}$.

$$(2) \text{ 求 } f\left[\frac{1}{f(x)+1}\right].$$

先计算 $f(x)+1$,

$$f(x)+1 = \frac{x+1}{x} + 1 = \frac{2x+1}{x},$$

$$\text{再计算 } f\left[\frac{1}{f(x)+1}\right].$$

$$f\left[\frac{1}{f(x)+1}\right] = f\left(\frac{x}{2x+1}\right) = \frac{\frac{x}{2x+1} + 1}{\frac{x}{2x+1}} = \frac{3x+1}{x}.$$

为了使 $f(x)$ 有意义, x 必须满足不等式

$$x \neq 0.$$

为了使 $\frac{1}{f(x)+1}$ 有意义, x 还必须满足不等式

$$f(x) + 1 \neq 0, \text{ 即 } \frac{x+1}{x} + 1 \neq 0.$$

所以, 为了使 $f\left[\frac{1}{f(x)+1}\right]$ 有意义, x 必须满足不等式组

$$\begin{cases} x \neq 0, \\ \frac{x+1}{x} + 1 \neq 0. \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x \neq 0, \\ x \neq -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

因此, 函数 $f\left[\frac{1}{f(x)+1}\right]$ 的定义域为

$$\{x \mid x \in (-\infty, 0) \cup \left(0, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)\}.$$

例 1.4 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & 0 \leq x < 4, \\ x-2, & 4 \leq x \leq 6. \end{cases} \quad \varphi(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 2, \\ x+2, & 2 \leq x \leq 4. \end{cases}$$

求 $f[\varphi(x)]$.

解 由 $f(x)$ 的表达式知

$$f[\varphi(x)] = \begin{cases} \sqrt{\varphi(x)}, & 0 \leq \varphi(x) < 4, \\ \varphi(x) - 2, & 4 \leq \varphi(x) \leq 6. \end{cases}$$

下面求不等式 $0 \leq \varphi(x) < 4$ 的解集. 由 $\varphi(x)$ 的表达式知

当 $0 \leq x < 2$ 时, $\varphi(x) = x^2$, 由 $0 \leq \varphi(x) = x^2 < 4$, 得 $-2 < x < 2$. 由不等式组

$$\begin{cases} 0 \leq x < 2, \\ -2 < x < 2, \end{cases} \quad \text{得解集 } 0 \leq x < 2.$$

当 $2 \leq x \leq 4$ 时, $\varphi(x) = x+2$, 由 $0 \leq \varphi(x) = x+2 < 4$,

得 $-2 \leq x < 2$, 不等式组

$$\begin{cases} 2 \leq x \leq 4, \\ -2 \leq x < 2. \end{cases} \text{ 无解}$$

所以不等式 $0 \leq \varphi(x) < 4$ 的解集为 $0 \leq x < 2$.

再求不等式 $4 \leq \varphi(x) \leq 6$ 的解集. 由 $\varphi(x)$ 的表达式知

当 $0 \leq x < 2$ 时, $\varphi(x) = x^2$, 由 $4 \leq \varphi(x) = x^2 \leq 6$, 得不等式组

$$\begin{cases} 0 \leq x < 2, \\ 4 \leq x^2 < 6. \end{cases} \text{ 无解}$$

当 $2 \leq x \leq 4$ 时, $\varphi(x) = x + 2$, 由 $4 \leq \varphi(x) = x + 2 \leq 6$, 得 $2 \leq x \leq 4$, 由不等式组

$$\begin{cases} 2 \leq x \leq 4, \\ 2 \leq x \leq 4. \end{cases} \text{ 解集 } 2 \leq x \leq 4,$$

所以不等式 $4 \leq \varphi(x) \leq 6$ 的解集为 $2 \leq x \leq 4$.

于是有

$$\begin{aligned} f[\varphi(x)] &= \begin{cases} \sqrt{\varphi(x)}, & 0 \leq \varphi(x) < 4, \\ \varphi(x) - 2, & 4 \leq \varphi(x) \leq 6, \end{cases} \\ &= \begin{cases} \sqrt{x^2}, & 0 \leq x < 2, \\ (x+2) - 2 & 2 \leq x \leq 4, \end{cases} \\ &= x(0 \leq x \leq 4). \end{aligned}$$

例 1.5 设 $f[\ln x] = x^2(1 + \ln^2 x)$, 求 $f(x)$.

解 解法 1 令 $t = \ln x$, 解出反函数 $x = e^t$, 代入原式的两边, 得

$$f(t) = e^{2t}[1 + (\ln e^t)^2] = e^{2t}(1 + t^2).$$

因此, 有

$$f(x) = e^{2x}(1 + x^2).$$

解法 2 把原式右端的函数 $x^2(1 + \ln^2 x)$ 凑成以 $\ln x$ 为变元的函数, 即

$$f(\ln x) = e^{2\ln x}(1 + \ln^2 x),$$

把 $\ln x$ 换成 x , 即得

$$f(x) = e^{2x}(1+x^2).$$

例 1.6 设单值函数 $f(u)$ 满足关系式:

$$f^2(\lg x) - 2xf(\lg x) + x^2 \lg x = 0,$$

其中 $x \in [1, 10]$, 且 $f(0) = 0$, 求 $f(x)$.

解 令 $y = f(\lg x)$, $x \in [1, 10]$, 原关系式化为

$$y^2 - 2xy + x^2 \lg x = 0,$$

把 y 看做未知函数, 解此二次方程, 得

$$\begin{aligned} y &= f(\lg x) = x(1 \pm \sqrt{1 - \lg x}) \\ &= 10^{\lg x}(1 \pm \sqrt{1 - \lg x}), \end{aligned}$$

把 $\lg x$ 换成 x , 便得

$$f(x) = 10^x(1 \pm \sqrt{1 - x}),$$

因为 $f(0) = 0$, 可知上式只能取“-”号, 于是有

$$f(x) = 10^x(1 - \sqrt{1 - x}), x \in [0, 1].$$

例 1.7 设 $f\left(\sin \frac{x}{2}\right) = \cos x + 1$, 求 $f\left(\cos \frac{x}{2}\right)$.

解 解法 1 令 $t = \sin \frac{x}{2}$, 解出 $x = 2\arcsin t$, 代入原关系式的两边, 得

$$\begin{aligned} f(t) &= \cos(2\arcsin t) + 1 \\ &= 1 - 2\sin^2(\arcsin t) + 1 \\ &= 2 - 2t^2 \end{aligned}$$

由 $t = \sin \frac{x}{2}$ 可知 $|t| \leq 1$, 因此

$$f(x) = 2 - 2x^2, |x| \leq 1$$

显然 $\cos \frac{x}{2}$ 满足 $\left|\cos \frac{x}{2}\right| \leq 1$, 于是有

$$f\left(\cos \frac{x}{2}\right) = 2 - 2\cos^2 \frac{x}{2} = 2\sin^2 \frac{x}{2} = 1 - \cos x.$$

解法 2 因为 $\cos \frac{x}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}\right) = \sin \frac{\pi - x}{2}$,

令 $\pi - x = t$, 则有 $\cos \frac{x}{2} = \sin \frac{t}{2}$. 于是有

$$\begin{aligned} f\left(\cos \frac{x}{2}\right) &= f\left(\sin \frac{t}{2}\right) = \cos t + 1 \\ &= \cos(\pi - x) + 1 = 1 - \cos x. \end{aligned}$$

例 1.8 设 $f(x) + f\left(\frac{x-1}{x}\right) = 2x$ 其中 $x \neq 0, x \neq 1$, 求 $f(x)$.

解 由于函数表示法与用什么字母表示变量无关, 可令 $t = \frac{x-1}{x}$, 或 $x = \frac{1}{1-t}$, 代入原关系式, 得

$$f\left(\frac{1}{1-t}\right) + f(t) = \frac{2}{1-t}$$

或

$$f\left(\frac{1}{1-x}\right) + f(x) = \frac{2}{1-x} \quad (1.1)$$

再令 $x = \frac{1}{1-u}$, 则 $\frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-\frac{1}{1-u}} = \frac{u-1}{u}$, 代入(1.1)

式, 得

$$f\left(\frac{u-1}{u}\right) + f\left(\frac{1}{1-u}\right) = \frac{2(u-1)}{u},$$

或

$$f\left(\frac{x-1}{x}\right) + f\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{2(x-1)}{x} \quad (1.2)$$

解方程组

$$\begin{cases} f(x) + f\left(\frac{x-1}{x}\right) = 2x, \\ f\left(\frac{1}{1-x}\right) + f(x) = \frac{2}{1-x}, \\ f\left(\frac{x-1}{x}\right) + f\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{2(x-1)}{x}. \end{cases}$$

前两个方程相加, 再减去第三个方程, 得

$$2f(x) = 2x + \frac{2}{1-x} - \frac{2(x-1)}{x},$$