


华北地区

中藥原料選編



天津人民出版社

华北地区中兽医资料选编

华北地区中兽医科研协作组编

天津人民出版社

华北地区中兽医资料选编
华北地区中兽医科研协作组编

*

天津人民出版社出版

(天津市赤峰道124号)

天津市第一印刷厂印刷 天津市新华书店发行

*

开本787×1092毫米 1/32 印张 2 1/8 字数41,000

一九七五年七月第一版

一九七五年七月第一次印刷

印数 1—11,500

统一书号：16072·2

每 册：0.17元

前 言

中兽医学是我国劳动人民长期和家畜疾病斗争的经验总结，有其独特的理论体系及诊疗技术，是祖国医学遗产的一个重要组成部分。在毛主席的无产阶级革命路线指引下，经过无产阶级文化大革命和批林批孔运动，使畜牧兽医工作有了很大发展。

为了进一步促进农牧业生产的发展，推广中兽医先进技术和医疗经验，现将一九七四年华北地区中兽医科研工作协作会议上交流的一些经验，及与会的一些单位提供的部分材料选编成册，内容包括电针、电麻、耳针、中西医结合治疗疑难病的经验和验方等。供基层单位饲养员、兽医和科技人员工作中参考。

由于我们水平所限，书中可能存有缺点和错误，希望读者批评指正。

编 者

目 录

针 灸.....	(1)
家畜三阳络组穴电针麻醉的临床应用.....	(1)
电针蹄叉治疗猪的常见病.....	(3)
耳针疗法治疗猪病.....	(5)
用耳穴割治法治疗家畜消化不良症.....	(8)
针灸治疗马骡消化不良症.....	(10)
应用水针治疗马骡腰肢病.....	(12)
应用水针治疗马骡吐水癖.....	(13)
应用烧烙术治疗马骡顽固性跛行.....	(14)
内 科.....	(17)
马属动物咳喘症的辨证施治.....	(17)
马骡幼驹血晕症的治疗.....	(20)
马属动物因药致泻后伤津不食症的治疗.....	(21)
“党参散”在兽医临床上的应用.....	(21)
“负重劳伤散”在兽医临床上的应用.....	(23)
马骡脾胃虚弱性泄泻的治疗.....	(25)
应用“蚯蚓定喘散”治疗马骡慢性肺泡气肿.....	(25)
应用“龟板散”和蜂毒治疗马骡骨质疏松症的体会.....	(26)
应用油当归治疗马骡食滞性胃扩张.....	(28)
应用“枳实破结散”治疗大家畜便秘.....	(29)
外 科.....	(31)

削蹄法治疗马骡习惯性膝盖骨上方脱臼·····	(31)
中西医结合治疗马属动物周期性眼炎·····	(33)
针治马属动物滚蹄病的体会·····	(35)
治疗大家畜肿瘤病的体会·····	(36)
治疗马骡后肢迎风痛的体会·····	(37)
马骡牙痛病及其治疗·····	(38)
“六八一”和“乌梅卤碱汤”在兽医外科临床上的应用·····	(39)
“白芨散”治疗马骡颊部透创·····	(41)
应用“决明散”治疗大家畜眼病·····	(42)
白砒在兽医外科临床上的应用·····	(43)
传 染 病 ·····	(45)
马属动物破伤风症的治疗·····	(45)
中西医结合治疗马属动物破伤风·····	(46)
中西医结合治疗马疑似乙型脑炎·····	(47)
中西医结合治疗马脑膜炎·····	(50)
验 方 ·····	(52)
治疗猪病方一·····	(52)
治疗猪病方二·····	(53)
应用“拨云散”治疗大牲畜外障眼方·····	(56)
应用“辛萸散”治疗额窦蓄脓方·····	(56)
治疗唾液腺痿管方·····	(56)
治疗马属动物几种流涎症方·····	(56)
治疗马属动物风湿症方·····	(57)
治疗马属动物鼻出血方·····	(58)
治疗马属动物胎产症用方·····	(58)
民间预防猪白菜帮中毒的两种方法的介绍·····	(59)

针 灸

家畜三阳络组穴电针麻醉的临床应用

我们应用家畜三阳络组穴电针麻醉对马、骡、驴、牛、猪及小动物全身各种部位施行手术20余种，共525例，成功率达95%，而且一般不用配合镇痛或麻醉药物即可达到麻醉目的。通过以上病例观察，我们初步认识到麻醉效果与家畜品种、性别、神经类型有关；肌肉紧张现象只表现在针刺肢体的局部，其他部位不明显；牵拉内脏反应，仅在复杂的肠变位整复手术中有时出现，但手术仍能进行。此外，虽然有部分病例存在镇痛不全的现象，但在抢救危重病畜时大量强心输液也不影响针麻效果，而且针麻具有调节病畜生理机能的作用。总之，三阳络组穴电针麻醉的方法简便易行，适用范围广泛，安全有效，是一种值得进一步研究推广的新技术。

穴位分布 三阳络穴，位于前肢桡骨外侧，韧带结节下方两寸处的肌沟中。夜眼，位于前肢内侧夜眼正中处。抢风穴，位于肩关节后稍下方，三角肌后缘、臂三头肌长头与外头之间的凹陷处。

器 材 兽用针麻仪（自制71—5型）或SB—71—2型兽用电针治疗麻醉机一台；4—6寸新针各一支。

保 定 横卧、仰卧或驻立。

针 法 三阳络穴透夜眼，针体垂直刺入三阳络穴皮肤

后针与皮肤呈15—20度角，沿桡骨后缘斜向内下方夜眼方向刺入3—4寸（以不穿透夜眼穴皮肤为度）；抢风穴，垂直刺入2—3.5寸（切勿过深）。

脉冲电刺激 在针柄上联接针麻仪的两条输出导线，频率、电压逐渐加大，以使患畜逐渐适应，经五分钟左右时间，使频率达到40至50次/秒左右，输出电压达患畜最大耐受量（约负载电压5—10伏）；诱导5—10分钟，测痛无反应即可施行手术。手术中，一直通电，依据具体情况适当调整频率及电压。

注意事项

1. 除马属动物外其他动物均无夜眼，针刺相应部位即可。

2. 针刺抢风穴深度，应根据畜体大小，肥瘦程度酌情掌握，切不可过深。

3. 针麻仪的频率及电压输出一定要达到麻醉的要求，否则影响针麻效果。

4. 横卧保定时多取与术部同侧穴位；仰卧保定时可取任何一侧均可。

5. 手术操作要求稳、准、轻、快。

电针麻醉手术中，患畜神志清醒，能采食、饮水。术后能立即站立行走；在进针通电诱导期间，脉搏、呼吸次数略有增加，但不久即能恢复到针前情况；体温变化不明显；个别患畜有局部出汗等现象。

三阳络组穴电针麻醉法效果统计(1970年10月至1973年10月)

项目 效果分类	畜 别						合 计	手 术 范 围										合 计	百 分 比
	马	骡	驴	牛	猪			头	颈	耆甲	胸	腹	臀	会阴	鼠蹊	四肢			
优	322	35	11	2	7		377	5	4	2	5	349	1	4	4	3		377	71.8
良	108	22	4	2			136		1		2	128			5			136	25.9
无 效	10	2					12		1			9	1		1			12	3.3
合 计	440	59	15	4	7		525	5	6	2	7	486	2	4	10	3		525	100
附 记	头部手术：眼球摘除、圆锯术、舌的缝合、声囊剔除。颈部手术：颈静脉切除、气管切开、颈肌切开缝合。耆甲部手术：肌肉切开缝合、瘰管摘除。胸部手术：肋骨切除、气胸闭锁。腹部手术：腹壁疝、肠变位整复、肠管吻合、剖腹产、膀胱手术、肾脏摘除等。臀部手术：肌肉切开缝合。会阴部手术：尿道造口。鼠蹊部手术：阴茎截断、包皮肿瘤切除。四肢手术：蹄冠肿瘤切除、断腱术。																		

(北京部队军马防治检验所)
北京市兽医院

电针蹄叉治疗猪的常见病

应用电针蹄叉疗法治疗猪的常见病，如感冒、消化不良、轻度胃肠炎、无名高热等，均有良好的疗效，对非适应症亦有降温作用。现介绍如下：

器 材 土制或普通电疗机一台，三寸长的新针两根。

保 定 横卧保定。

穴 位 蹄叉穴，位于蹄叉缝前上方顶端处(见图1)，左右蹄各一穴。

针 法 针尖刺透皮肤后，顺皮下向腕关节方向平刺1至3寸，以针尖接近腕关节为宜（见图1）。




图1

电疗机的使用 按要求进针后，在两个针柄上分别联接电疗机的正、负极，通电后第一分钟电压即升到猪体能忍受的强度；频率可由120次/分逐渐加快到250—300次/分，持续10分钟。此时两前肢呈现与电流频率相一致的节律性收缩。

注意事项

1. 取穴力求准确。如进针困难，可能是针尖刺在骨头上或皮内，此时应起针另扎。

2. 穴位、针具要消毒，以防感染。
3. 针后应加强护理，防止猪蹄踩入污泥与粪尿中。
4. 一般情况是电针一次后在 6—24 小时内即可痊愈。重症则须针 2—3 次，每日一次。

623 例电针蹄叉疗效统计

病 名	治 疗 总 数	其 中					
		痊 愈		好 转		无 效	
		头 数	%	头 数	%	头 数	%
感 冒	426	368	86.3	31	7.3	27	6.4
消 化 不 良	124	106	85.5	16	12.9	2	1.6
轻 度 胃 肠 炎	30	27	90	3	10		
无 名 高 热	43	43	100				
合 计	623	544	87.3	50	8	29	4.7

(山西省畜牧兽医研究所)
(山西省运城县兽医院)

耳针疗法治疗猪病

运用耳针疗法治疗猪病，疗效快，简便易行，现将具体方法介绍如下：

取 穴

1. 根据病变部位，直接针刺相应的穴位。
2. 用探棒在耳内均力探压或用“耳电针器”寻找敏感点然后针刺。

3. 辨证取穴。如肺与大肠为表里关系，肺经有病必传大肠，故治肺经病变除取肺穴外还可加大肠穴。

针 法

1. 方向，一般是向耳廓垂直刺入，有些穴位则须斜刺，如交感穴等。

2. 深度，一般刺过软骨，但不应透过对面皮肤。

3. 手法，右手持针，刺入后向内转补之，向外转泻之；还可采取强刺激提插法和弱刺激不捻针的方法。

穴位分布情况及所主疾病

胃穴，在第一耳褶的下端，主消化道疾病。交感穴，在第二耳褶的中间，行气和血，调和五脏。神门穴，在第二耳




图 2

褶延长线和第三耳褶交点的上方，主安神，镇惊，止痛。肾穴，在第二耳褶延长线和第三耳褶的交点的下方，强腰健肾，利筋骨，止痛，利水。脾穴，在第一耳褶和第二耳褶的中间胃穴的稍上部，主消化，燥湿，利水。肺穴，在胃穴的下方，与脾穴相对。大肠穴，在半耳轮的上端，主消化道疾患。强壮穴，在屏间切迹的前方，半耳轮内，活气血，止全身发抖、畏寒、止痛。脑穴，在屏间切迹的后方，主驱除风邪（见图2）。

消化系统病，以脾、胃、肠穴为主。如出现泄泻，肠鸣或大便干燥，可加神门穴、交感穴施以不同手法。

呼吸系统疾病，取肺穴、肠穴、脑穴、强壮穴。

泌尿系统疾病，取肾穴、交感穴、神门穴、强壮穴。

典型病例

1. 尿淋漓：患畜毛粗乱无光泽，小便淋漓，尿液含有乳白色絮状物。针刺肺、脾、肾三穴，留针二十分钟，半小时后第一次排尿成泡，以后转为正常。穴位分析：肺、脾、肾三穴均与水湿有密切关系，肾主水，脾燥湿，肺通调水道；尿淋漓，说明肾主水，脾燥湿的功能减弱，所以采取了补的手法。肺既通调水道，肺实则水道不利，故采取泻的手法。这样一补一泻，加强了排水功能，也通调了水道，使小便功能恢复了正常。

2. 消化不良：患畜食欲不振，大便干燥，鼻盘发干，皮肤温度不均，有时耳尖发凉。针刺胃、大肠、交感穴，交感穴给予强刺激，留针20分钟，每天一次。连续治疗三天，病猪痊愈。穴位分析：胃和大肠是消化道主要组成部分，胃是受盛之府，大肠是传送之府，直接影响了食物的消化，交

感穴行气活血，调和五脏，强烈刺激交感穴，促进了全身血液循环，故食欲转为正常。

(天津市西郊区木厂公社冯高庄大队)

用耳穴割治法治疗家畜消化不良症

家畜消化不良症是兽医临床常见的一种多发病，各种牲畜均可发生。过去对此病大都采取健胃消导药物进行治疗。耳穴割治则是一种治疗此病的新方法。我们通过对 206 例患畜的治疗，不论病程长短，都有显著疗效，现将这种方法介绍如下：

穴位分布 小肠穴，从内缘脚与耳屏间的凹陷处(耳屏切迹)向前耳褶引一垂线，付耳褶与前耳褶中点即为此穴。大肠穴在小肠穴上方 4 公分处(见图 3)。



图 3

器 材 辣椒粉、手术刀、胶布、棉花。

保 定 站立保定。

操作方法 棉花适量堵塞外耳道（防止毛、血、辣椒面落入），用刀在穴位处上下切开皮肤 1.5—2 公分长（不要切透软骨），切口向两侧钝性分离约 0.5 公分。提取辣椒粉少许敷于切口处，然后粘贴胶布（以免辣椒粉脱落），两耳四穴均一次割治。

疗效观察 一般 1—4 天即可见效（如无效改用其他方法进行疗治）。割治 5—7 天在切口处可见到 2 公分左右的圆形红斑，以后逐渐结痂脱落。通过对二百多例的观察，未见不良反应和副作用（由于某些疾病引起的消化不良症，用此法治疗无效）。

22例割治前后食欲饮水比较表

编 号	病 程 (天)	畜 别	毛 色	年 龄	割 治 前			割 治 后			割治后增加量			效果判定		
					食欲(斤)		饮水量	食欲(斤)		饮水量	食欲(斤)		饮水量	优	良	无 效
					草	料		草	料		草	料				
1	90	马	黑	4	3	1	30—40	7	4	30—40	4	3	0	"		
2	"	"	宗	4	8	2	20	15	4	30—40	7	2	20	"		
3	3—4	"	黑	2	4	1	30—40	8	3	40—50	4	2	10	"		
4	2—3	驴	"	8	5.2	4	97	9	4	98	4	0	1	"		
5	2—3	"	灰	4	5.2	4	97	9	4	99	4	0	2	"		
6	5—6	骡	黄	2	5	9	67	7	10	82	2	1	15	"		
7	3—4	马	黄	8	3	1	20	25	3	80	22	2	60	"		
8	"	驴	黑	15	5	2	0	20	3	30—40	15	1	30—40	"		

接上表

编号	病程 (天)	畜别	毛色	年 龄	割 治 前			割 治 后			割治后增加量			效果判定	
					食欲(斤)		饮水量	食欲(斤)		饮水量	食欲(斤)		饮水量	优	良
					草	料		草	料		草	料			
9	5—6	驴	黑	2	2.5	1	20	5.5	1	30	25	0	30	"	
10	30—60	"	"	3	12	2	30	15	2	30	3	0	0	"	
11	2—3	"	"	2	4.7	1	30	6.6	1.5	40	1.9	0.5	10	"	
12	3—4	"	"	18	5.2	1	"	7.1	1.5	"	1.9	0.5	10	"	
13	"	"	灰	14	4.7	1	"	6.6	1.5	"	1.9	0.5	10	"	
14	不详	"	黑	14	6	1	"	9.5	2	"	3.5	1	10	"	
15	2—3	"	"	6	5	2	20	8	2	35	3	0	15	"	
16	不详	"	黑	14	6	2	30	9.5	2	40	3.5	0	10	"	
17	6—15	"	"	3	1	20	6	1	25	3	0	5	"		
18	4—5	马	红	10	10	2	20	20	3	60	10	1	40	"	
19	2—3	驴	黑	20	4	2.4	22	15	6.2	52	11	2.8	30	"	
20	4—5	马	骝	5	22	2	47	26.5	2	53	4.5	0	2.5	"	
21	2—3	骡	红	17	6	2	10	6	2	14	0	0	4	"	
22	30—60	"	"	10	8	1	20	8	1	20	0	0	0	"	

(山西省畜牧兽医科学研究所)
(山西省栒山县兽医院)

针灸治疗马骡消化不良症

根据中兽医诊断方法，我们对马骡消化不良症进行了综

合分析，初步归纳为四种不同类型，应用针灸疗法进行治疗，取得良好效果。现介绍如下：

临床类型及施针穴位

临床类型	主要症状	施针穴位	备 注
胃 肠 热 型	口色鲜红而热，有时有黄色舌苔，有粘液或干燥无津，粪稍干，尿色黄，食欲不佳，肠音低沉，脉洪数	玉堂（盐擦主穴）、 舌阴（针后凉水冲）、锁口	热重加鸭脉、 胸膈
胃 肠 寒 型	口色白滑，上唇呈淡白色显微黄，肠音亢进，精神沉郁，食欲不振，脉迟细，寒唇似笑	脾膈（主穴白针）、 玉堂、双姜、分水、 锁口	寒重加脾膈 （改用火针）
伤 料 型	口色红或黄，卧蚕较深，口腔不洁，灰料草细，肠音沉弱，腹部微胀，排粪迟滞、附有不消化草料	四蹄（主穴）、脾膈 （白针）、玉堂、 分水	腹胀加带脉
脾 弱 型	口色青白、精神不振，行动无力，日见瘦弱；食欲不振，粪便松散、不成球形，天气变化有成栗或有轻度疝痛	脾膈（主穴火针）、 百会（火针）、分水、 锁口、双姜	结合中药健脾 散灌服