

中华人民共和国兽药规范

一九九二年版

二 部



中华人民共和国兽药规范

一九九二年版

二 部

中国兽药典委员会 编

中国农业出版社

(京)新登字060号

中华人民共和国兽药规范

一九九二年版

二 部

中国兽药典委员会 编

* * *

责任编辑 顾之春

中国农业出版社出版 (北京市朝阳区农展馆北路2号)

新华书店北京发行所发行 中国农业出版社印刷厂印刷

787×1092mm16开本 10.5印张 230千字

1994年3月第1版 1994年3月北京第1次印刷

印数 1--5 000册 定价 20.00 元

ISBN 7-109-03040-7/S·1948

中国兽药典委员会委员名单

主任委员 刘 江

副主任委员 于 船 马闻天 冯淇辉 刘士珍 陈凌风

委	员	于 船	马月嫦	马闻天	王灿成	王 珊	王 奕	王 森
		王德镛	左文功	叶友珍	白紫儒	包鸿俊	冯淇辉	朱心玲
		朱仕铭	朱润一	朱蓓蕾	朱模忠	朱鑫源	向德林	刘士珍
		刘 江	刘若柏	刘佩玉	刘振乾	米建华	杨兴业	杨桂芝
		李公喆	李呈敏	李伯涛	李明忠	李学粹	李敬言	吴弋熙
		吴新政	何家栋	邹介正	沈福庆	宋大鲁	张麦歧	张克家
		张英圣	陈永佃	陈忠国	陈秉正	陈凌风	周 正	郑动才
		郑 洛	孟 枋	孟海芬	赵广珠	赵荣材	赵淑范	赵隆锦
		姚金保	郭明清	郭景煜	唐志强	唐桂运	黄耀泰	盛锡明
		常民生	章元琅	谈 伦	梁圣译	梁兆年	韩福祥	傅沙丁
		谢占武	廉守仁	蔡尔问	潘蕴慈	瞿自明		

顾问委员 何正礼

已逝世的委员、顾问委员

委 员 杨宏道 林 群 项翊源 袁庆志

顾问委员 程绍迥

前 言

《中华人民共和国兽药规范》(一九九二年版),经中国兽药典委员会组织全国药政、药检、教学、科研、生产单位,用近三年的时间,完成了起草修订、技术复核、审稿定稿工作,并经全体委员会审议通过。这是我部继《中华人民共和国兽药典》(一九九〇年版)后又一兽药国家标准,现予以颁布,作为兽药生产、经营、使用以及监督等部门检验质量的法定依据。

中华人民共和国农业部
一九九二年十月

说 明

《中国兽药典》(一九九〇年版)颁布后,原《兽药规范》(一九七八年版)中收载的品种大多已收入《中国兽药典》,还有一部分品种没有收入,但各地仍有生产和使用,加之近年来农业部又陆续颁布了一些新兽药的质量标准,为加强兽药的质量管理,1989年底我在厦门召开了修订《兽药规范》第一次工作会议,讨论并通过了修订《兽药规范》的计划及分工方案。1990年农业部批准了该计划及方案。近三年来经组织起草、技术复核及审稿、定稿,最后由全体委员会审议通过。

《兽药规范》分一、二两部。一部收载化学药品、抗生素及生化制品;二部收载中药材及成方制剂。

《兽药规范》采用的凡例和附录均照《中国兽药典》(一九九〇年版)一部或二部的规定,正文中只注明附录的页码。

中国兽药典委员会
一九九二年十月

目 录

药材及其制品

一点红	1
二色补血草	2
八角莲	2
九头狮子草	3
了哥王	3
三叉苦	4
三分三	4
大蒜	5
山大黄	6
山大黄末	7
山芝麻	7
广枣	8
广藿香	9
小叶莲	10
小通草	10
飞扬草	11
马兰草	12
马尾连	12
无根藤	13
木芙蓉叶	13
木槿花	14
五指毛桃	14
瓦松	15
牛筋树	16
毛诃子	16
凤仙透骨草	17
凤尾草	17
乌桕	18
文冠木	19
火炭母	19

水杨梅	20
水蜈蚣	21
甘松	21
石见穿	22
石灰	22
石楠叶	23
布渣叶	23
龙葵	24
打破碗花花	25
北刘寄奴	26
北野菊	26
北寒水石	27
叶下珠	28
四叶参	28
四季青	29
仙人掌	30
仙桃草	30
白花菜子	31
白英	31
白屈菜	32
白降丹	33
白碓砂	33
丝棉木	34
地耳草	34
地红花	35
地胆草	35
地椒	36
地锦草	36
列当	37
光枝勾儿茶	38

光慈姑.....	38	草血竭.....	62
回回蒜.....	39	芥菜.....	63
竹叶.....	39	胡颓子叶.....	63
刘寄奴.....	40	荔枝草.....	64
羊红膻.....	41	南瓜子.....	64
羊蹄.....	41	南寒水石.....	65
寻骨风.....	42	枸骨叶.....	65
红花龙胆.....	43	柠条.....	66
红狼毒.....	43	钩吻.....	66
杠板归.....	44	香青兰.....	67
杨树花.....	45	鬼箭羽.....	68
两面针.....	45	禹余粮.....	68
岗梅.....	46	胆木.....	69
佛甲草.....	47	胆汁.....	69
沙枣叶.....	47	穿山龙.....	70
沉香.....	48	除虫菊.....	71
鸡矢藤.....	49	珠芽蓼.....	71
苦瓜.....	49	莲须.....	72
苦地丁.....	50	莪大夏.....	72
茅莓.....	50	莓叶委陵菜.....	73
松花粉.....	51	桃金娘根.....	74
松针.....	51	铁苋菜.....	74
松香.....	52	铁棒锤.....	75
枫杨.....	52	铅丹.....	76
抱茎苦苣菜.....	53	称钩风.....	76
虎掌草.....	54	倒扣草.....	77
岩陀.....	54	徐长卿.....	78
金果榄.....	55	狼毒.....	79
金荞麦.....	56	粉萆薢.....	80
金莲花.....	57	娑罗子.....	80
金钱白花蛇.....	57	海石花.....	81
肿节风.....	58	海芋.....	81
狗肝菜.....	58	浮小麦.....	82
夜明砂.....	59	浮石.....	83
泡桐叶.....	60	浮萍.....	83
泡桐花.....	60	黄荆子.....	84
珍珠透骨草.....	61	雪胆.....	84
草乌叶.....	61	救必应.....	85

蛇莓	85
甜地丁	86
猪殃殃	87
猫爪草	87
猫眼草	88
鹿角	89
断血流	89
绵马贯众	90
绵草薺	91
绿豆	92
斑蝥	92
葫芦茶	93
葱白	94
酢浆草	94
紫珠叶	95
紫萁贯众	95
景天三七	96
黑老虎根	97
黑芝麻	97
筋骨草	98

成 方 制 剂

七味诃子散	112
七味胆膏散	112
三子散	113
大黄末	113
天麻散	114
五皮散	115
止痢散	115
龙胆末	116
四神散	116
生乳散	117
白及膏	117
白矾散	118
半夏散	118
加味知柏散	119
加减消黄散	119
百合固金散	120
当归苁蓉散	120

滑石粉	98
蓍草	99
蓝花参	100
蓬蘽	101
矮地茶	101
鼠曲草	102
蔊菜	103
榧子	103
榜嘎	104
辣蓼	105
樟木	105
鹤草芽	106
薯莨	107
薄荷脑	107
薜荔	108
薜荔果	109
槌苏	109
螞蜥菊	110
翻白草	110

朱砂散	121
伤力散	121
壮阳散	122
阳和散	123
防己散	123
防腐生肌散	124
如意金黄散	124
牡蛎散	125
肝蛭散	125
鸡痢灵	126
金锁固精散	126
肥猪菜	127
肥猪散	127
定喘散	128
茵陈木通散	128
香薷散	129
复方大黄酊	129

复方龙胆酊.....	130	通肠散.....	135
复方豆蔻酊.....	131	桑菊散.....	135
保胎无忧散.....	131	猪健散.....	136
保健锭.....	132	麻黄桂枝散.....	136
胆膏.....	132	清热散.....	137
泰山盘石散.....	133	催奶灵.....	137
健鸡散.....	133	催情散.....	138
消毒散.....	134	镇痢散.....	138
消疮散.....	134	擦疥散.....	139

附 录

锭剂.....	141	试药.....	142
成方制剂中一九九〇年版兽药典及本版 兽药规范未收载的药材及炮制品...	141	试液.....	142

索 引

中文索引.....	143	拉丁名索引.....	150
汉语拼音索引.....	147	拉丁学名索引.....	152

药材及其制品

一点红

Yidianhong

HERBA EMILIAE

本品为菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，晒干，或趁鲜切段，晒干。

【性状】 本品长10—50cm。根细而弯曲，有须根。茎细圆柱形，表面暗绿色，下部被茸毛。叶多皱缩，展平后基生叶呈琴状分裂，长5—10cm，宽2.5—5cm，表面灰绿色或暗绿色，背面常为紫红色，先端裂片大，近三角形，基部抱茎，边缘具疏钝齿；茎生叶渐狭。头状花序2—3个排成聚伞状，总苞圆柱形，苞片1层，呈条状披针形或近条形，长约1cm；管状花紫红色或棕黄色，冠毛白色，柔软。瘦果狭矩圆形，长约3mm，有棱。气微，味淡，微苦。

【鉴别】 (1) 本品茎横切面：表皮细胞一层，呈椭圆形或类方形，木化。棱角处可见木化的上皮细胞，一层。皮层狭窄，薄壁组织中含较多棕色色素。维管束18—22束，木质部由导管、木薄壁细胞、木纤维组成，均木化，导管椭圆形或类圆状多角形，直径达60 μ m。髓部宽广，占横切面的2/3，由大形薄壁细胞组成。

(2) 取本品粉末5g，加0.5%盐酸乙醇溶液30ml，置水浴上回流30分钟，滤过，滤液加氨试液使成中性，蒸干，残渣加5%硫酸溶液5ml使溶解，滤过。取滤液1ml，加碘化铋钾试液1—2滴，发生红棕色沉淀。

【炮制】 未切段者，除去杂质，切段。

【性味与归经】 微苦，凉。归脾、胃、肝经。

【功能】 清热解毒，散瘀消肿，去湿。

【主治】 咽喉肿痛，湿热腹泻，痢疾，疮痈肿毒，跌打损伤，湿疹。

【用法与用量】 马、牛60—150g；羊、猪30—60g。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处。

二 色 补 血 草

Erse Buxuecao

HERBA LIMONII BICOLORIS

本品系蒙古族习用药材，为白花丹科植物二色补血草 *Limonium bicolor* (Bunge) O. Kuntze 的干燥全草。夏、秋二季采挖，洗净泥沙，晒干。

【性状】 本品根呈圆柱状，棕褐色。茎圆稍弯，色深绿，质脆，易折断，断面中空。叶多基生，叶基紫红色，完整者润湿展平后呈匙形或倒卵状匙形，顶端具小尖头，并有疏生腺体。花葶上部多分支，顶端具有紫红色的苞片及白色残存的萼片。

【炮制】 除去杂质，切断，晒干。

【性味】 甘，平。

【功能】 止血，益气。

【主治】 子宫出血，尿血，虚劳。

【用法与用量】 马、牛50—150g；羊、猪25—50g。

【贮藏】 置通风干燥处。

八 角 莲

Bajiaolian

RHIZOMA DYSOSMAE

本品为小檗科植物六角莲 *Dysosma pleiantha* (Hance) Woodson 或八角莲 *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng 的干燥根茎。秋、冬二季采挖，洗净泥沙，晒干。

【性状】 六角莲 本品根茎呈横生的小结节状，长2—3cm，直径0.5cm，表面棕色，上有略凹陷的茎基痕，下面具环纹。质硬而脆，易折断，断面黄绿色。须根多数，长达20cm，径约0.1cm，棕黄色，断面黄色，中央有圆点状中柱。气微，味苦。

八角莲 本品长8—10cm，直径1.5—2cm，表面皱缩。须根较稀疏，长3—5cm。

【炮制】 洗净，去须根，切片，晒干。

【性味与归经】 苦、辛，平。归肺经。

【功能】 清热解毒，祛瘀散结。

【主治】 痈疮疔肿，跌打损伤，毒蛇咬伤。

【用法与用量】 马、牛15—30g；羊、猪6—9g。

【贮藏】 置通风干燥处。

九头狮子草

Jiutou Shizicao

HERBA PERISTROPHIS

本品为爵床科植物九头狮子草 *Peristrophe japonica* (Thunb.) Bremek. 的干燥全草。夏、秋二季采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品长达50cm。根须状，浅棕褐色。地上部分暗绿色，被毛。茎有棱，节膨大。叶对生，有柄，叶片多皱缩，展平后呈卵形、卵状长椭圆形或披针形，长5—10cm，宽3—4cm，先端渐尖，基部楔形，全缘。聚伞花序集生于枝梢的叶腋，总梗短，叶状苞片2片，大小不等，花冠常脱落。气微，味微苦、涩。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。

【性味】 辛、微苦，凉。

【功能】 清热解毒，发汗解表，行气和血。

【主治】 外感发热，咽喉肿痛，跌打损伤；外治痈疮肿毒。

【用法与用量】 马、牛60—120g；羊、猪15—30g。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【贮藏】 置干燥处。

了哥王

Liaogewang

RADIX WIKSTROEMIAE INDICAE

本品为瑞香科植物了哥王 *Wikstroemia indica* (L.) C. A. Mey. 的干燥根或根皮。全年均可采挖，洗净，晒干，或剥取根皮，晒干。

【性状】 本品根呈弯曲的长圆柱形，常有分枝，直径0.5—3cm，表面黄棕色或暗棕色，有略突起的支根痕、不规则的纵沟纹及少数横裂纹，有的可见横长皮孔状突起，质硬而韧，断面皮部类白色，易剥离，木部淡黄色。根皮呈扭曲的条带状，厚1.5—4mm，栓皮或有剥落，强纤维性，纤维绒毛状。气微，味微苦甘，嚼后口腔有持久的灼热不适感。

【鉴别】 (1) 本品根的横切面：木栓层为10—20余列细胞，有的充满黄棕色或红棕色物。皮层较窄，纤维多，成束或单个散在，类圆形，直径7—22μm，壁厚，非木化至微木化。韧皮部宽广，射线宽1—3列细胞；纤维甚多，与薄壁细胞交互排列。形成层成环。木质部发达，射线细胞壁稍厚，纹孔明显；导管多单个散在，类圆形，直径26—85μm，

木纤维多。薄壁细胞含淀粉粒。

(2) 取本品根皮，切制横切面，置紫外光灯(365nm)下观察，显亮蓝色荧光；用氨气熏后，在日光下变为黄色，紫外光灯下显黄绿色荧光。

【炮制】 除去杂质，洗净，切片，干燥。

【性味与归经】 苦，寒；有毒。归心、小肠、大肠经。

【功能】 清热解毒，散瘀消肿，利水。

【主治】 高热发痧，风湿痹痛，疮黄肿毒，腹水，毒蛇咬伤；外治跌打损伤。

【用法与用量】 马、牛15—50g；羊、猪9—15g。外用适量，捣烂包敷或煎水洗患处。

【注意】 孕畜及体质虚寒者慎用。

【贮藏】 置干燥处。

三 叉 苦

Sanchaku

FOLIUM ET RAMULUS EVODIAE LEPTAE

本品为芸香科植物三叉苦*Evodia lepta* (Spreng.) Merr. 的干燥枝叶。夏、秋二季采收，晒干。

【性状】 本品枝呈圆柱形，直径0.5—1.5cm，表面灰棕色或绿灰色，有细纵皱纹；嫩枝呈方柱形，表面灰绿色至绿褐色，质硬而脆，易折断。三出复叶对生，叶柄长3—5cm；小叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈长圆状披针形，长6—15cm，宽2—5cm，先端渐尖，全缘或不规则浅波状，基部稍偏斜，狭尖延长成短的小叶柄，上表面褐绿色，下表面色较浅，两面光滑无毛，有透明腺点。气微，味苦。

【炮制】 除去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。

【性味与归经】 苦，寒。归心、肝、胃经。

【功能】 清热解毒，散瘀消肿，祛风止痛，燥湿止痒。

【主治】 咽喉肿痛，跌打损伤，腰膝风湿，湿疹。

【用法与用量】 马、牛180—240g；羊、猪60—90g。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

三 分 三

Sanfensan

RADIX ANISODI ACUTANGULI

本品为茄科植物三分三*Anisodus acutangulus* C. Y. Wu et C. Chen、丽江山莨菪

Anisodus luridus Link et Otto var. *fischerianus* (Pasch.) C. Y. Wu et C. Chen, 齿叶赛茛苳 *Scopolia carniolicoides* C. Y. Wu et C. Chen var. *dentata* C. Y. Wu et C. Chen 或赛茛苳 *Scopolia carniolicoides* C. Y. Wu et C. Chen 的干燥根。秋季采挖，除去泥沙，切成块片，晒干。

【性状】 本品为圆形、卵圆形或不规则的块片，直径2—12cm，厚0.5—2cm。外皮棕褐色或黑褐色，有皱纹。切面灰白色至微黄色，可见年轮和放射状纹理及数层同心性环纹。质硬，断面颗粒状，有粉性。气微，味苦麻。

【鉴别】 取本品细粉10g，加氯仿150ml，浸渍10分钟后，加浓氨试液4ml，振摇30分钟，静置30分钟，滤过。取滤液5ml，置蒸发皿中，蒸去氯仿，加发烟硝酸数滴，蒸干后残渣呈黄色，再加乙醇制氢氧化钾试液，则呈紫蓝色，随即变紫红色。

【性味】 苦、辛，温；有大毒。

【功能】 解痉止痛，祛风除湿。

【主治】 肚腹冷痛，风湿痹痛；外治跌打损伤。

【用法与用量】 马、牛3—6g；羊、猪0.6—0.9g。外用适量。

【注意】 本品有大毒，慎用。

【贮藏】 置干燥处。

大 蒜

Dasuan

BULBUS ALLII

本品为百合科植物大蒜 *Allium sativum* L. 的鳞茎。夏季采收，除去泥沙，通风晾晒或烘烤至外皮干燥。

【性状】 本品呈类球形，多由6—10个肉质鳞茎瓣抱合而成，直径3—6cm。外包白色或淡紫红色的膜质鳞皮。顶端略尖，中间有残留花葶，基部有多数须根或须根痕。鳞茎瓣略呈卵圆形，外皮膜质，先端略尖，一面弓状隆起，除去外皮，内白色，肉质。气特异，味辛辣。

【性味与归经】 辛，温。归脾、胃、肺经。

【功能】 开胃理气，抗菌，解毒。

【主治】 慢草不食，肚腹胀满，下痢。

【用法与用量】 马、牛30—90g；羊、猪15—30g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

山大黄

Shandahuang

RADIX ET RHIZOMA RHEI FRANZENBACHII

本品为蓼科植物华北大黄 *Rheum franzenbachii* Munt.、河套大黄 *Rheum hotaense* C. Y. Cheng et C. T. Kao、天山大黄 *Rheum wittrochii* Lundstr. 或藏边大黄 *Rheum emodi* Wall. 的干燥根及根茎。秋末茎叶枯萎或次春发芽前采挖，除去细根，刮去外皮，晒干。

【性状】 华北大黄 本品呈类圆柱形，一端稍细，长5—11cm，直径1.5—5cm。除去表皮者，表面黄棕色，有皱纹。质坚体轻。横断面有红棕色射线，无星点。气微香。味苦。

河套大黄 本品呈类圆柱形及圆锥形，多纵切成条状或块片状。断面淡黄红色。

天山大黄 本品长8—21cm，直径2.5—4cm。未去表皮者，表面棕褐色。断面黄色，形成层环明显，有同心性环纹。

藏边大黄 本品呈类圆锥形，长4—20cm，直径1—5cm。未去表皮者，表面红棕色至灰褐色。新折断的横断面多呈淡蓝色，有明显的形成层环。

【鉴别】 (1) 取本品粉末0.2g，加甲醇2ml，温浸10分钟，放冷，取上清液10μl，点于滤纸上，以45%乙醇展开，取出，晾干，放置10分钟，置紫外光灯(365nm)下检视，显持久的亮紫色荧光。

(2) 取本品适量，置滤纸上，加氢氧化钠试液，滤纸即染成红色。

(3) 取本品适量，加稀盐酸5ml，煮沸2分钟，趁热滤过。滤液冷后加乙醚5ml振摇，乙醚液即染成黄色。分取乙醚液，加氨试液2ml振摇，氨液层即染成红色，醚层仍显黄色。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。

【性味】 苦，寒。

【功能】 健胃消食，清热解毒，破瘀消肿，凉血止血，杀虫。

【主治】 食欲不振，胃肠积热，湿热黄疸，热毒痈肿，损伤瘀血，外治烧伤，疮疡肿痛。

【用法与用量】 马、牛30—100g；驴50—150g；羊、猪10—20g。外用适量，研末调敷患处。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

【制剂】 山大黄末。

山大黄末

Shandahuang Mo

PULVIS RHEI FRANZENBACHII

本品为山大黄制成的散剂。

【制法】 取山大黄，粉碎成粗粉，过筛，即得。

【性状】 本品为黄棕色的粉末，气香，味苦。

【鉴别】 取本品，照山大黄项下的【鉴别】（6页）试验，显相同的反应。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录2页）。

【功能】 健胃消食，清热解毒，破瘀消肿。

【主治】 食欲不振，胃肠积热，湿热黄疸，热毒痈肿，损伤瘀血；外治烧伤，疮疡肿痛。

【用法与用量】 马、牛30—100g；驼50—150g；羊、猪10—20g。外用适量，调敷患处。

【贮藏】 密闭，防潮。

山芝麻

Shanzhima

RADIX HELICTERIS

本品为梧桐科植物山芝麻 *Helicteres angustifolia* L. 的干燥根。夏、秋二季采挖，除去须根，洗净，切段，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，稍弯曲，长短不一，直径0.3—1.5cm。表面黑褐色、灰棕色或灰黄色，有不规则的纵皱纹及细根痕，部分外皮呈膜状脱落。质坚硬，不易折断，断面不平整，皮部浅棕色，纤维性，木部黄白色。气微，味苦。

【鉴别】（1）本品横切面：木栓层为20余列细胞，有时含棕色物。皮层甚窄。韧皮部宽广，纤维束断续排列成环，纤维壁厚，微木化至木化；薄壁细胞常充满黄棕色物。形成层明显。木质部均木化，射线宽1—5列细胞；导管类圆形，直径8—50μm，多单个作放射状排列；木纤维发达。薄壁细胞含淀粉粒。皮层、韧皮部薄壁细胞含草酸钙簇晶。

（2）取本品粗粉5g，加水50ml，煮沸20分钟，滤过。取滤液1ml，加二硝基苯胍试液3—5滴，产生黄棕色沉淀。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性味】 苦，寒。

【功能】 清热解毒，凉血泻火。