

新集良方

保善滑胎散

凡孕婦傷胎氣必小產雖見紅者亦可保定或婦人受孕後常易墮胎服之可保足月分娩

仙方

頭二驪蔞黃

不拘多少以陰陽瓦煨不可過性碾為

保胎各受孕後月飲一

又方熟地

八錢

山藥

五錢

杜仲

鹽水

炒白芍

酒炒

黃芪

酒炙各

白朮

土炒

補骨脂

酒炒

川斷肉

各

二錢

錢

清先服此方亦可保

達生散

每產難於生有臨月時每早

乳香

去油二兩

枳殼

四錢

蜜為丸

如桐子大

共碾細末煉

催生散

滑石

水飛

車前子

當歸

各一錢

白芍

酒炒

生甘草

桔梗

百草霜

烏藥

各五分

水煎好加真

香油五茶匙服下即生

產後宜服方

當歸

五錢

川芎

山查

各二錢

紅花

一錢

凡生產畢扶上床坐定即與此方熟飲一服能去敗血止空
腹疼并除一切雜症孕婦臨月須預備此藥一劑以便產
後即可煎服含下凡有孕婦
俱服此方產後從無患病者

產後血暈

黑荆芥

二錢

碾細末以童便紹酒各半杯調好
再燒紅炭烹醋薰鼻即醒或

以傘衣燒煙薰之亦醒

急救血崩

舊爛棕棚心

或舊棕蓑衣之領

陰陽瓦煨黑碾細末每服三錢

童便調服立止

下乳方

治強壯婦人乳汁不通

王不留行

二錢

通草

二錢

歸尾

二錢五分

穿山甲

二錢

猪前蹄

七星者一隻煎湯代水
加生酒全煎前藥服

小兒失音不語

大蝦蟆膽汁

點少許於小兒舌
尖上少頃即語

小兒胎毒胎瘡

治小兒胎毒頭上紅赤痒極是必頭搖出
血痒後大哭不睡遍身無皮一片血肉

白附子

蛇床子

黃丹

各五錢

羌活

獨活

白鮮皮

滑石 雄黃 枯黃 胭脂 燒灰各三錢五分共為細末

屬痒瘡不拘大人 又方小兒胎瘡 以真麻油三兩熬鮮嫩

小兒俱可通治 以鉛粉一兩 輕粉一錢煨石膏

三錢碾勻入麻油內蒸熟調搽 急慢驚風 大蝦蟆膽 五個刺破 硃砂 飛一錢 犀黃一分 麝香

五厘同入碗內陰乾為丸金箔為衣 每服二分人乳調服立效寔可回生

出痘不起 葶薺汁和酒窩兒 調勻敷溫服之即起但

又方痘疹不起 心胸滿悶發熱命在須臾者 用白公

痘疔方 柏樹根皮 為細末以 痘毒潰爛 調搽可愈

痘爛生蛆 柳葉 不拘多少鋪席上卧之

痘疹後成毒 柏樹根皮 煨一兩 五倍子 煨五錢 菉豆粉一兩

共為細末麻油調敷初起者可消 已成者即潰潰後以六一散摻之

瘡疹不發

貓屎

瓦上乾白者佳水煎服之即透發矣又治小兒童子癆

小兒痰毒

土南星

搗塗患處不過數次即愈

小兒熱癰

金菓蘭

米醋磨濃汁搽之亦愈

瘡癩頭

胡椒

焙碾細末搽患孔中外以膏貼一

疳積壞眼

穀精草

炒小青草

刺蒺藜

青黛

海粉

各一兩

共為細末每早用三錢以羊肝七片拌藥末蒸熟食之吃完眼好

百病消散

凡屬強壯之人或吃十分之六十分之三可也治氣虛之人

葱頭

七個生薑

連皮陳茶葉

三錢

焦查肉

三錢

六神麴

沙糖

半酒杯

水二碗共煎服加陳酒隨量飲得汁

咳嗽吐血虛癆

小紅棗

揀好者二斤水煮熟去皮核

黑糖

一觔

麻油

四兩

搗礪爛不見星成飯一餅碗盒盛之每晚用一兩滾水調服

又方生藕汁

半杯

好童便

半杯

服水宜熱徐徐溫
服常服可以見效

骨蒸癆病 北沙參 大熟地 銀柴胡 鱉甲 醋炙 知母

釵石斛 川貝母 地骨皮 麥冬 各二兩 為細末煉
送下三錢 久服可愈

夜出盜汗 五倍子 炒二分 枯礬 少許同為細末用本人津唾
調塗臍上外以膏藥貼之效

又方馬料豆 二酒杯 浮麥 五錢 黑棗頭 五個水煎
服可愈

脫力勞傷 香附 醋炒二兩 砂仁 一兩 白朮 土炒五錢 右為末
送下 若氣血虛者加蜜炙嫩黃芪一兩 每服二錢燈心湯

酒炒當歸二兩 忘生冷麪食油膩發物 又方嬰嬰針線

包草 一兩 水煎加
紹酒和服亦可

三消病 糖煮芋芳 日食七八碗連
食數日可愈

呃逆不止 茶葉簍內棕箬葉帶 七個煎湯
服可止

廠服發腫 多年陳香聞 四兩去瓢淨 人中白 三兩二味共為

空 心白滾湯送下服完 又方隔年西瓜一個 生芽滿肚者佳 錢

全愈忌食鹽一百日 大蒜數十個去衣裝入瓜內仍將瓜蓋蓋好以黃泥封固掘

土深一尺將瓜埋於土內離土二三寸用炭火燒一晝夜出

火氣將大蒜與病人每 日隨意食之食完可愈 癩痢症 治癩癰瘡症發時揚手擲足拔頭 犀角末 五錢 赤石

脂 三兩 蠶蠶 一兩 薄荷葉 一兩 朴硝 二兩 右為末 麪糊丸

滾湯送下 又方苦參 四兩 為末煉蜜為丸桐子 又方

忌食油膩 以蒸豆大艾圓系患穴七壯 其穴以二大 手指合並在指甲下手指節上二指之間即是

羊癩瘋症 并治諸 癩症 陳瞻星 一兩另碾 白附子 六錢 全蝎 十四個 酒洗

蟬退 三十個 雄黃 川貝母 天竹黃 橘紅 防風 羌

活 鈎藤 石菖蒲 遠志肉 甘草 天麻 茯神 薑衣

各五錢 眞琥珀 當門子 一錢 共爲細末煉蜜爲丸如圓
下 眼大辰砂爲衣每服一丸開水化

廣瘡解毒湯

專治楊梅瘡 凡生楊梅瘡千萬不可吃升
丹隱藥以圖速效仍恐引毒入臟後發莫效

鮮生地 生米仁 各五錢 淨銀花 三錢 花粉 連翹 白蘚

皮 威靈仙 皂角刺 蟬退 各三錢 白芷 一錢 生甘草

一錢五分 白菓肉 十四個 紅棗 十四個 新鮮土茯苓 四兩水

湯至三碗代水煎前藥 如毒甚者加生大黃三錢 六碗煎
頭者加升麻五分 發在足者加川牛膝三錢 日服一劑以
愈爲度

珠黃十寶丹

能治一切廣瘡楊梅結毒下疳 滴乳石 人乳拌
潰爛并小兒胎毒功效異常

眞琥珀 乳香 去油 沒藥 去油 山茨菇 各三錢 敗龜板 炙

雄黃 水飛淨各四錢 犀黃 一錢 辰砂 水飛淨一錢 上藥珠錢一

礪爲極細末

真人中黃五錢當門子

五分各取淨細末秤

小菰豆大辰砂爲衣分作一月服完卽愈甚者再服一料必然全愈

魚口便毒

開羊花

強壯者用七分

芫花一錢五分

銀花三錢

淮牛膝

獨活

各一錢水煎服吃酒者加紹酒入內更妙初起三日內者不過三服卽消凡服此藥者

忌服

甘草

又方遠志肉一兩甘草湯炒水酒各半碗煎服次日可消

婦人乳癰

砂仁

去殼五分

冬葵子

八分共礪細末

蒲公

括蕒仁

三錢二味煎湯調服初起在三四日內者三服可消

乳頭破爛

敗龜板

炙礪細末加冰片少許碾勻麻油調搽卽愈

豬頭風

荷葉蒂

七個水煎服外

紅白蛇纏

卽愈

起紅點者名紅蛇纏用真麻油調銀條搽三四次起白點者名白蛇纏用機頭絲寸段煨存性

麻油調搽只三次

卽愈