

# 中药

主编  
王辉武

## 临床新用

人民卫生出版社



中药临床新用

中药临床新用

中药临床新用


中药临床新用

中药临床

中药临床

中药临床新用

中药临床新用



# 中药临床新用

主 编 王辉武

副主编 王志坦  
杨国汉

审 阅 邓文龙

人民卫生出版社

## 中药临床新用

主 编: 王 武

出版发行: 人民卫生出版社 (电话线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园3区3号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E-mail: [pmph@pmph.com](mailto:pmph@pmph.com)

印 刷: 三河南潮河印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 44.5

字 数: 1057千字

版 次: 2001年1月第1版 2001年1月第1版第1次印刷

印 数: 00 001—4 000


标准书号: ISBN 7-117-04116-1/R·4117

定 价: 65.00元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

## 内 容 提 要



本书共收载常用中草药 300 余味，主要介绍每味药的临床新用途、新用法、新剂型及临床疗效，也简要介绍了传统药性、功效主治、注意事项、不良反应等，对现代药理研究成果和一些具有启发性的临床经验，亦作了简要综述。书末附有病（症）名索引，便于读者查阅。

本书具有内容新颖，简洁实用的特点。读者阅读本书后能对中药的新用途有全面的了解，有助于启迪临床处方遣药思路，提高治疗效果。

本书可广泛适用于各级中医临床医师、中西医结合工作者、中药工作者、新药开发人员及自学中医者参考。

## 《中药临床新用》编委会

**主 编** 王辉武 (重庆医科大学附属第二医院)

**副主编** 王志坦 (成都中医药大学)  
杨国汉 (第三军医大学大坪医院)

**编 委** 雷正荣 (重庆市中医院)  
吴行明 (重庆医科大学附属第二医院)  
张晓明 (重庆市中医研究所)  
陶 红 (重庆医科大学附属第二医院)  
晋献春 (第三军医大学新桥医院)  
王 洲 (成都中医药大学)  
刘 培 (重庆市中医学校)  
孙成超 (四川省资阳市药检所)

**审 阅** 邓文龙 (四川省中药研究所)

# 前 言

科学的生命在于创新，中医中药也不例外。

广大的中医药、中西医结合工作者，在长期的实践中，对中药的药理、药效，特别是在临床应用方面做了大量的研究，提出了不少新颖、实用的创见，为中医药学术的发展做出了卓越的贡献。

为了让这些成果与经验能得到更广泛的验证和应用，我们编写了《中药临床新用》一书，书中共载常用传统中药以及近年应用较多的草药、民族药 300 余味。每味药独立成篇，以概说、临床新用、注意事项和主要参考文献为序。【临床新用】以教科书上没有或虽有记载而未被临床重视的新用途、新用法、新剂型为主要内容，按病（症）名列项，分别详述其药物配伍、制法、剂型、剂量、用（服）法和临床疗效等。对药理研究成果和一些具有启发性的临床经验，虽资料不够完整，亦作简要综述。读者如能在掌握传统用法的基础上，熟悉其药理、药效和新用途，把辨证论治与现代研究成果有机地结合起来，则将利于启迪遣药思路、研制开发新药和提高治疗效果。

中医治病讲究辨证论治，临床疗效和毒副反应与药物的剂量、配伍、炮制和体质等因素密切相关。因此，对本书所介绍的方与药，尤其是有毒副作用的药，一般应在医生指导下应用，切忌滥施，以防发生意外。

中医中药正受到世界各国的普遍关注，多学科的研究进展很快，文献资料浩如烟海，我们虽作了一些努力，但限于条件和水平，错漏之处殊难避免，诚望读者提出意见，以期在本书修订时改进。

王辉武

2000 年 9 月

# 目 录

## 二 画

|    |      |
|----|------|
| 丁香 | (1)  |
| 人参 | (4)  |
| 儿茶 | (11) |

## 三 画

|              |      |
|--------------|------|
| 三七           | (14) |
| 三棱           | (20) |
| 土茯苓          | (21) |
| 土鳖虫          | (23) |
| 大枣           | (25) |
| 大黄           | (27) |
| 大戟           | (40) |
| 大蓟           | (41) |
| 大青叶          | (43) |
| 大蒜           | (44) |
| 大血藤          | (50) |
| 山楂           | (51) |
| 山药           | (56) |
| 山豆根 (附: 北豆根) | (59) |
| 山茱萸          | (61) |
| 山慈姑          | (62) |
| 川芎           | (63) |
| 川楝子          | (68) |
| 女贞子 (附: 女贞叶) | (71) |
| 小蓟           | (73) |
| 马勃           | (75) |
| 马齿苋          | (77) |
| 马钱子          | (82) |
| 马鞭草          | (87) |

## 四 画

|              |       |
|--------------|-------|
| 天冬           | (90)  |
| 天麻           | (91)  |
| 天花粉          | (93)  |
| 天南星          | (96)  |
| 木瓜           | (98)  |
| 木贼           | (99)  |
| 木蝴蝶          | (100) |
| 木鳖子          | (101) |
| 五味子          | (102) |
| 玉倍子          | (104) |
| 车前子 (附: 车前草) | (109) |
| 太子参          | (112) |
| 玉不留行         | (113) |
| 牛黄           | (116) |
| 牛膝           | (119) |
| 牛蒡子          | (120) |
| 升麻           | (121) |
| 乌药           | (124) |
| 乌头           | (125) |
| 乌梅           | (128) |
| 乌梢蛇          | (131) |
| 乌贼骨          | (133) |
| 丹参           | (136) |
| 巴豆           | (146) |
| 巴戟天          | (150) |
| 水蛭           | (151) |

## 五 画

|    |       |
|----|-------|
| 艾叶 | (157) |
|----|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 玉竹                | (161) |
| 甘草                | (162) |
| 甘松                | (167) |
| 甘遂                | (168) |
| 石韦                | (170) |
| 石灰                | (172) |
| 石膏                | (173) |
| 石斛                | (177) |
| 石菖蒲               | (178) |
| 石榴皮 (附: 石榴花)      | (180) |
| 龙胆                | (182) |
| 龙骨                | (184) |
| 仙人掌               | (185) |
| 仙鹤草               | (187) |
| 冬瓜皮               | (191) |
| 代赭石               | (191) |
| 生姜                | (193) |
| 冬虫夏草              | (196) |
| 白及                | (200) |
| 白术                | (204) |
| 白英                | (206) |
| 白芷                | (207) |
| 白芍                | (209) |
| 白头翁               | (213) |
| 白芥子               | (216) |
| 白果                | (219) |
| 白茅根               | (220) |
| 白花蛇舌草             | (223) |
| 瓜蒌                | (226) |
| 玄参                | (228) |
| 半夏                | (229) |
| 半枝莲               | (232) |
| 丝瓜络 (附: 丝瓜汁、丝瓜藤根) | (233) |

## 六 画

|     |       |
|-----|-------|
| 地龙  | (235) |
| 地骨皮 | (240) |
| 地黄  | (241) |

|     |       |
|-----|-------|
| 地榆  | (245) |
| 芒硝  | (250) |
| 老鹳草 | (255) |
| 西洋参 | (256) |
| 百合  | (258) |
| 百部  | (260) |
| 当归  | (262) |
| 肉桂  | (270) |
| 肉苁蓉 | (273) |
| 延胡索 | (273) |
| 血竭  | (276) |
| 全蝎  | (277) |
| 合欢皮 | (281) |
| 竹茹  | (282) |
| 决明子 | (283) |
| 冰片  | (286) |
| 刘寄奴 | (289) |
| 防己  | (291) |
| 防风  | (293) |
| 红花  | (294) |
| 红景天 | (298) |

## 七 画

|     |       |
|-----|-------|
| 麦冬  | (300) |
| 麦芽  | (301) |
| 远志  | (303) |
| 杜仲  | (305) |
| 芫花  | (305) |
| 花椒  | (307) |
| 苍术  | (308) |
| 苍耳子 | (310) |
| 芦根  | (314) |
| 芦荟  | (314) |
| 赤芍  | (316) |
| 赤小豆 | (320) |
| 杏仁  | (321) |
| 连翘  | (323) |
| 吴茱萸 | (325) |
| 牡丹皮 | (330) |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 牡蛎              | (332) |
| 何首乌 (附: 夜交藤)    | (333) |
| 皂荚 (附: 皂角刺)     | (336) |
| 辛夷              | (340) |
| 沙参 (附: 南沙参、北沙参) | (341) |
| 沙棘              | (342) |
| 沙苑子             | (344) |
| 没药              | (344) |
| 诃子              | (346) |
| 补骨脂             | (347) |
| 灵芝              | (350) |
| 阿胶              | (356) |
| 附子              | (358) |
| 鸡内金             | (362) |
| 鸡矢藤             | (364) |
| 鸡血藤             | (365) |

## 八 画

|     |       |
|-----|-------|
| 青蒿  | (368) |
| 青黛  | (371) |
| 板蓝根 | (374) |
| 松香  | (378) |
| 刺五加 | (379) |
| 苦参  | (383) |
| 郁金  | (390) |
| 虎杖  | (392) |
| 败酱草 | (398) |
| 明矾  | (400) |
| 昆布  | (405) |
| 垂盆草 | (406) |
| 侧柏叶 | (407) |
| 佩兰  | (409) |
| 乳香  | (410) |
| 金银花 | (412) |
| 金钱草 | (416) |
| 金樱子 | (418) |
| 鱼腥草 | (420) |
| 肿节风 | (425) |
| 泽泻  | (426) |

|    |       |
|----|-------|
| 泽漆 | (429) |
| 细辛 | (431) |
| 贯众 | (434) |

## 九 画

|            |       |
|------------|-------|
| 枳实 (附: 枳壳) | (436) |
| 梔子         | (438) |
| 枸杞子        | (441) |
| 柿蒂         | (443) |
| 胡椒         | (444) |
| 茜草根        | (446) |
| 草果         | (448) |
| 菟蔚子        | (449) |
| 茵陈蒿        | (450) |
| 茯苓         | (453) |
| 革薷         | (454) |
| 砂仁         | (455) |
| 牵牛子        | (456) |
| 虻虫         | (459) |
| 威灵仙        | (459) |
| 鸦胆子        | (462) |
| 骨碎补        | (468) |
| 钩藤         | (469) |
| 香附         | (471) |
| 独活         | (473) |
| 砒石         | (473) |
| 轻粉         | (476) |
| 蚕休         | (477) |
| 胖大海        | (481) |
| 穿山甲        | (481) |
| 姜黄         | (485) |
| 神曲         | (486) |
| 绞股蓝        | (487) |

## 十 画

|     |       |
|-----|-------|
| 蚕沙  | (490) |
| 桂枝  | (491) |
| 桃仁  | (494) |
| 莱菔子 | (496) |

|     |       |
|-----|-------|
| 莪术  | (498) |
| 荷叶  | (501) |
| 夏枯草 | (502) |
| 柴胡  | (505) |
| 党参  | (508) |
| 积雪草 | (512) |
| 射干  | (512) |
| 徐长卿 | (513) |
| 狼毒  | (515) |
| 浮萍  | (517) |
| 益母草 | (518) |
| 海马  | (522) |
| 海浮石 | (523) |
| 桑叶  | (523) |
| 桑白皮 | (525) |
| 桑螵蛸 | (526) |
| 桑寄生 | (526) |

## 十 一 画

|                |       |
|----------------|-------|
| 菟丝子            | (528) |
| 草薢             | (529) |
| 菊花             | (530) |
| 黄芩             | (532) |
| 黄芪             | (534) |
| 黄连             | (544) |
| 黄柏             | (552) |
| 黄精             | (556) |
| 黄药子            | (558) |
| 硼砂             | (559) |
| 蛇床子            | (560) |
| 野菊花            | (562) |
| 猪胆             | (563) |
| 猪苓             | (565) |
| 商陆             | (567) |
| 银杏叶            | (569) |
| 麻黄             | (571) |
| 鹿茸 (附: 鹿角、鹿角霜) | (574) |
| 淫羊藿            | (577) |
| 淡竹叶            | (580) |

## 十 二 画

|     |       |
|-----|-------|
| 斑蝥  | (582) |
| 葶草  | (586) |
| 葛根  | (588) |
| 葱白  | (591) |
| 葶苈子 | (594) |
| 篇蓄  | (596) |
| 硫黄  | (597) |
| 雄黄  | (600) |
| 紫河车 | (603) |
| 紫草  | (606) |
| 紫苏  | (613) |
| 番泻叶 | (614) |
| 蛤蚧  | (618) |
| 黑豆  | (618) |

## 十 三 画

|            |       |
|------------|-------|
| 槐角 (附: 槐花) | (620) |
| 蒲黄         | (621) |
| 蒲公英        | (624) |
| 硼砂         | (627) |
| 雷公藤        | (628) |
| 蜈蚣         | (635) |
| 蒺藜         | (639) |
| 蜂房 (附: 蜂毒) | (641) |
| 蜂蜜         | (643) |

## 十四画以上

|            |       |
|------------|-------|
| 槟榔         | (646) |
| 酸枣仁        | (648) |
| 蝉蜕         | (650) |
| 罂粟壳        | (655) |
| 熊胆         | (656) |
| 稀莩草        | (657) |
| 墨旱莲        | (659) |
| 僵蚕 (附: 僵蛹) | (660) |
| 蝼蛄         | (662) |
| 壁虎         | (663) |

|          |       |                     |       |
|----------|-------|---------------------|-------|
| 橘皮.....  | (664) | 藿香.....             | (672) |
| 薤白.....  | (666) | 蟾酥 (附: 蟾皮、蟾蜍) ..... | (673) |
| 薏苡仁..... | (667) | 鳖甲.....             | (678) |
| 薄荷.....  | (669) | 麝香.....             | (679) |
| 藕节.....  | (670) | 附: 病 (症) 名索引 .....  | (685) |
| 藤黄.....  | (671) |                     |       |



## 丁香

Ding xiang

本品系桃金娘科丁香属常绿乔木植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. 的花蕾，又名公丁香（成熟果实名母丁香，又名鸡舌香，性味、功效略弱于公丁香）。味辛，性温。归脾、胃、肾经。功能温中降逆，温肾助阳。传统主要用于治疗胃寒呕吐、呃逆，以及肾阳不足所致的阳痿、脚弱。一般用量为 2~5g。现代药理研究表明，丁香具有抗菌、驱虫、止痛、麻醉、降低血压、抑制呼吸、抗惊厥、健胃和刺激胃液、胆汁分泌等作用。

### 【临床新用】

#### 一、治疗肠梗阻

**方：**丁香 30~60g，研成细末，加 75% 酒精调和，对酒精过敏者，可用开水调和，敷于脐及脐周（直径约 6~8cm），再用纱布和塑料薄膜覆盖，周围用胶布固定，对胶布过敏者可用绷带固定。

李世祥等用上方治疗麻痹性肠梗阻 20 例，其中腹部手术后肠麻痹 10 例，弥漫性腹膜炎后肠麻痹 7 例，脊椎损伤所致肠麻痹 3 例，均有满意效果。一般用药 2 小时后即可听到肠鸣音，4~8 小时排便排气<sup>[1]</sup>。

#### 二、治疗腹泻

**方一：**丁香 30g，炒车前子 20g，萆薢 10g，胡椒、肉桂各 5g。诸药共研极细末装瓶备用。用时取药末 100~300mg，置于脐窝内。若脐突出者则用食指轻按，使之陷下后才放药，并以胶布固定，1~2 天换药 1 次。有脐部发炎或过敏者忌用。

尤文俊用上方治疗小儿泄泻 321 例。结果痊愈（用药 1~2 次症状完全消失，大便恢复正常）221 例，有效 92 例，无效 8 例，总有效率 97.5%<sup>[2]</sup>。

**方二：**取丁香 25 个（约 2g），草果 1 枚（约 4g）打碎，白面粉 250g，食糖 200g。将丁香、草果分别炒焦黑存性并研细末；再炒白面粉至焦黄，以味香不苦为宜，加入食糖，乘热在锅内搅匀，成颗粒状。口服，每次 2~3 匙，小儿酌减。

俞宝典等用上方治疗急、慢性腹泻 180 例，结果痊愈 104 例，有效 27 例，无效 49 例。

**方三：**丁香 5~10g，肉桂 4~6g，木香 5~10g，研细末，置于纱布袋内，用绷带缚于小儿脐上一夜。

陈建平用上方治疗小儿泄泻 66 例，结果痊愈 56 例，显效 6 例，好转 4 例。一般用

药 1~3 次见效。

### 三、治疗早泄

方：丁香、细辛各 20g，75%乙醇 100ml。将两药浸泡于乙醇内半个月即可。使用时，用浸出液涂擦阴茎之龟头部位，经 1.5~3.0 分钟后即行房事。

周午平用上方治疗早泄患者 156 例，对精神因素所致的早泄效果较好，单用本方即有效。兼有其它原因所致者，可配合辨证加用内服药，能提高疗效<sup>[3]</sup>。

### 四、以丁香为主治疗神经痛

方：丁香、郁金、柴胡、枳壳、川芎、赤芍、甘草各 9g，板蓝根 30g。水煎，每日 1 剂，分两次口服。

杨恒裕用上方治疗带状疱疹后遗神经痛 30 例。结果治愈 23 例，显效 7 例。通过临床观察，丁香配伍郁金并未发生不良反应<sup>[4]</sup>。

### 五、治疗腋臭

方：公丁香 18g，红升丹 27g，石膏 45g。将丁香和石膏（石膏洗净，取出石块和砂粒）粉碎，研细，红升丹研成粉末，均过 7 号筛。然后将 3 种药混研，再过筛，装入茶色瓶内，密封保存。用棉花团蘸着药粉揉动涂擦腋窝部，每日 1 次，连续涂擦 5 天。

孙迅等用上方治疗腋臭 188 例，均获痊愈<sup>[5]</sup>。

### 六、治疗乳头皲裂

方：公丁香 5g，研细末，红糖 5g，将两味药放铁勺内加白酒 1 小杯，置于火上炒至干枯，研细用菜油或麻油调敷患处。哺乳时洗去，哺乳后涂药。

刘汉兴用上方治疗乳头皲裂 20 例，其中哺乳期 18 例，非哺乳期 2 例，双侧乳头皲裂者 15 例，共计 35 个乳头，全部治愈<sup>[6]</sup>。

据报道，丁香配肉桂，研细，外敷穴位，治疗胃痛、肝炎、食道炎、胆囊炎、腰痛等均有良效。丁香乙醇提取物，可作为一种新的脱碘剂来代替酒精，经 200 多例临床观察，证明既可脱碘又能止痛<sup>[7]</sup>。

### 七、治疗鞘膜积液

方：母丁香粉 2g，放入患儿脐部，隔 2 日换药 1 次，20 天为 1 疗程，疗程间隔 5~10 天。

索寿臣用上方治小儿睾丸鞘膜积液 243 例，结果痊愈 148 例，显效 72 例，有效 20 例，无效 3 例<sup>[8]</sup>。

### 八、以丁香为主治疗冠心病、心绞痛

方：丁香四神散：丁香 15g，郁金 15g，川芎 20g，山楂 30g，人参 10g，共为细末装 81 粒胶囊。口服：每次 3 粒，每日 3 次；外敷：每次 6 粒，米酒调成药饼，贴敷双足涌泉穴，每日 1 次。

姜国峰等用上方治疗冠心病心绞痛 31 例，总有效率 93.5%<sup>[9]</sup>。

### 九、治疗麦粒肿

方：用公丁香 7 粒，大枣 1 枚去核，与丁香粉拌匀制成花生米大小药丸，纳鼻中（左眼病纳右鼻腔，右眼病纳左鼻腔），1 日 1 粒。一般 3~5 天见效。

许水玉用上方治疗麦粒肿 156 例，显效 94 例，有效 57 例，无效 5 例<sup>[10]</sup>。

### 十、治疗口臭

方：丁香漱口液：丁香、厚朴各2份，薄荷1份。制法：将上药馏取挥发油，密封贮存备用，或每次取丁香、厚朴、薄荷，按4:4:2的比例，开水浸泡15分钟，滤去药渣后使用。用于口臭时，温开水50ml，加入丁香漱口液0.5~1ml，摇匀后含漱。

王亚楠等用上方治口臭32例，牙痛15例，全部治愈<sup>[11]</sup>。

#### 十一、以丁香为主治疗青光眼

方：绿风安胶囊：用丁香、芦荟、黑丑各50g，磁石100g，共研细末，混匀装入胶囊，每日早晚各取3~5粒（重2~4g），饭后1小时服用。

据报道，用上方治疗青光眼71只患眼，显效51只，进步7只，无效13只。总效率为81.69%，对降低眼压、缩小瞳孔、恢复视力有良好作用<sup>[12]</sup>。

#### 十二、治疗口腔溃疡

方：用丁香9~15g，打碎，放入杯或小瓶中，用冷水浸过药面，约经4小时后，取药液涂于口腔溃疡表面，每日6~8次。

据报道，用上方治疗口腔溃疡，一般2~3天即愈，明显优于碘甘油<sup>[12]</sup>。

近年来笔者用丁香配伍淫羊藿、蛇床子等，制成软膏状的“壮阳固本膏”，外用涂擦神厥、关元、肾俞以及会阴、龟头，治疗男性性功能减退、阳痿、早泄有较好疗效；用丁香配伍花椒、苦参、黄柏等，煎水洗浸双脚，治疗足癣有较好的止痒效果。

此外，用丁香100g，防风400g，薄荷冰2g，冰片10g，将丁香、防风共研极细粉，再入冰片、薄荷冰，研均匀后，装入洗净的小瓶中，封固备用。用于鼻部按摩吸入，防治感冒<sup>[13]</sup>。用丁香、肉桂、味精等制成“代针膏”外用，对戒烟有效<sup>[14]</sup>。用丁香、山药、陈皮配制的健胃灵糖浆治疗小儿厌食症327例，显效266例，进步47例，一般3例，无效11例<sup>[15]</sup>。

#### 【注意事项】

禁忌：热病及阴虚内热者慎用。传统认为不可与郁金配伍，但《中华人民共和国药典》未列此禁，临床可否配伍，尚待研究。

不良反应：据报道，有人因牙龈出血，用丁香作安抚治疗，引起大疱性表皮松解萎缩性药疹，终因呼吸衰竭死亡。

#### 主要参考文献

- [1] 李世祥，等. 中医杂志，1988，(11):55
- [2] 尤文俊. 广西中医药，1988，(1):13
- [3] 周午平. 新中医，1988，(4):13
- [4] 杨恒裕. 中医杂志，1988，(8):29
- [5] 孙迅，等. 中医杂志，1988，(7):53
- [6] 刘汉兴. 陕西中医，1988，(4):174
- [7] 张泉，等. 中国医药报，1988，11:24 三版
- [8] 索寿臣. 河北中医，1990，(3):6
- [9] 姜国峰，等. 福建中医药，1994，(5):10
- [10] 许水玉. 四川中医，1996，(2):50
- [11] 王亚楠，等. 黑龙江中医药，1991，(2):53

- [12] 雷载权, 等主编.《中华临床中药学》. 人民卫生出版社, 1998
- [13] 郭炎林. 河南中医, 1989, (5):41
- [14] 张天渝, 等. 云南中医杂志. 1989, (1):47
- [15] 金岚, 等主编.《新编中药药理与临床应用》. 上海科学技术出版社, 1995

## 人 参

Ren shen

本品系五加科人参属多年生草本植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的干燥根。其茎、叶、花、籽均可供药用。味甘、微苦, 性微温。归脾、肺经。功能大补元气, 补脾益气, 生津, 宁神益智。传统主要用于挽救气脱危证, 以及脾胃虚弱之食少、泄泻、呕吐; 肺虚气喘、怔忡、失眠、自汗等。一般用量为 5~10g。现代药理研究表明, 人参具有适应原样作用, 能增强机体非特异性抵抗力、促进智力、改善记忆、强心、抑制血小板聚集、降血脂、调整血糖、升高血清补体和免疫球蛋白含量、诱生干扰素和白细胞介素 II 等。此外, 尚有促进肾上腺、性腺功能, 增强免疫功能, 抗疲劳, 保肝、抗休克、抗氧化、抗突变、抗肿瘤、抗炎、抗利尿、缓解吗啡成瘾、延长寿命等广泛的作用。

### 【临床新用】

#### 一、以人参为主治疗恶性肿瘤

方一: 人参香茶片: 红参、香茶菜、枳壳制成糖衣片, 每次 5 片, 每日 3 次, 3 月后减至每次 3 片, 每日 3 次, 3 个月为 1 疗程。

据报道, 用人参香茶片治疗姑息性或根治性切除术后中晚期胃癌 101 例, 并设对照化疗组 78 例。结果: 中药组和化疗组的一年生存率分别为 82.2% 和 64.1%, 前者优于后者 ( $P < 0.05$ ), 治疗后, 一般症状明显好转, 免疫功能改善, 也以中药组为优。

方二: 人参片: 每片含蛋白合成促进因子 10mg, 每日口服 4~6 片, 3~6 个月连续给药。以后每天维持量 2~4 片。

村田勇用人参片治疗 101 例癌症病人。其中包括胃癌、胰癌、大肠癌、乳癌、甲状腺癌、肉瘤等, 大部分是手术切除癌症病灶的病例。结果证明, 连续投药 3 个月以上的 43 例病人中, 30 例见效, 有效率为 69.8%。其中胃癌 28 例中 23 例有效; 大肠癌 7 例中 5 例有效。本药与其他抗癌药合用时, 几乎看不到白细胞减少的现象。

方三: 红参粉末, 每天 5g, 分次口服。

Chang 等报道, 将 50 名放疗或根治手术后行放疗的子宫颈癌分成两组, 一组给服红参粉, 另一组给服安慰剂, 共给药 5 星期后, 治疗组血小板计数明显增加, 两组之间有显著差异。

据宋安全报道, 采用国产人参针剂或片剂, 治疗 52 例癌症患者, 证明能防止癌患者在化疗和放疗中所引起的白细胞降低, 保护癌患者能持续地完成化疗和放射治疗。还可增强机体细胞免疫功能, 其机理可能是提高癌患者抵抗力从而抑制癌的生长。

王静懿用人参皂甙片治疗肺癌、淋巴瘤、鼻咽癌、宫颈癌等晚期肿瘤患者 10 人,

剂量为每次3片，每日3次，疗程4周。治疗后，病人的咳嗽、咯血、胸疼等症状好转，睡眠改善，食欲增加。并可见白细胞上升，肝功好转，肿瘤增长似较缓慢，淋巴细胞的转化能力增强，生存时间延长。

方四：人参注射液2ml，每日2次，或用4ml，每日1次，或口服人参片3~4片，每日3次，均30天为1疗程。

薛晓民用上方治疗肿瘤患者化疗期间白细胞减少者229例，其中207例注射人参注射液，22例口服人参片。结果：显效以上者120例，有效22例，无效81例，总有效率为64.6%。有人认为，人参注射液可减轻骨髓毒性，提高机体免疫功能，改善患者生活质量及临床症状，增加体重，可作为恶性肿瘤化疗中的常规辅助药物<sup>[1]</sup>。

## 二、以人参为主治疗急性呼吸功能不全

方一：红参25g，麦冬15g，二味分别单煎当茶饮。并随证加用中药煎服。

马恩庆等用加味红参汤治疗烧伤面积在80%以上，呼吸功能不全患者6例，4例急性呼吸功能不全、症状体征消失，全身及烧伤创面状况改善。经对照观察，中药组疗效优于对照组。

方二：人参10g，白术15g，茯苓15g，陈皮12g，半夏10g，甘草10g。随症加味，水煎服，每日1剂。

罗成群等用上方治疗大面积烧伤后胃肠功能欠佳者20例，服药10日后显效15例，有效4例，无效1例，明显优于对照组<sup>[2]</sup>。

## 三、以人参为主治疗哮喘

方：参蚬散：移山参9~10g，蛤蚧一对（去头），煎服，每日1剂，连服1~2天，待症状控制后改研粉，每日6g，分服。

张镜人等用上方抢救持续哮喘重症10例，结果临床控制9例，显效3例，好转3例，总有效率达94%。

## 四、以人参为主治疗子宫颈糜烂

方：复方人参膏：人参干膏粉、蛤蚧粉、黄连素、乳香、没药、儿茶、冰片、铅丹按5:2:0.2:0.2:0.2:0.3:0.1:2的比例，分别研细过筛，取各药混匀，装入胶囊，每粒重0.5g。患者用药前，先用1:1000新洁尔灭冲洗阴道，然后将药放入阴道后穹窿部，每次2粒，隔日1次，每4次为一疗程。严禁口服。

玄明淑用上述方法治疗子宫颈糜烂311例，治愈率达93.6%，总有效率达98.7%。（人参膏是人参加工过程中的副产物）。

## 五、以人参为主治疗肝炎

方一：红参3g，三七3g，每日1~3次，口服或用鼻饲。应用红参的指征：激素按常规减量停药前3天，口服红参液5ml（3g），每日1次，服5天，可预防激素反跳现象。乏力、纳少严重者每日可口服1~2次。

陆纯用上方防治重症肝炎用激素时的不良反应，共观察100例。结果治愈78例，治愈率为78%。死亡22例，无一例死于出血。

方二：肝复康（人参茎叶皂甙，柴胡皂甙，按10:1制成片剂，每片27.5mg）每日3~6片。

据报道，用上方治疗慢性肝炎360例。结果临床控制66例，显效87例，有效166

例,无效41例。疗效优于复肝宁,且HBsAg阴转和滴度下降率也较高<sup>[3]</sup>。

方三:人参、三七、琥珀,按2:2:1比例配制,研细末,每日3次,每次3g,口服。

袁今奇用上方治疗慢性肝炎血清蛋白异常者33例,结果白蛋白增高18例,球蛋白下降22例,A/G比值升高22例<sup>[4]</sup>。

乔玉山等用人参、生乳没、三七按2:1:1共研细末,每日2次,每次5克,平均服药183天。治疗肝硬化血清蛋白异常25例,疗效显著<sup>[5]</sup>。

方四:人参3g,文火炖,分早晚两次服,第二次稍炖后连人参一起吃,水蛭粉装入胶囊(0.5g)每日2次,每次4粒。3个月为一疗程。

据报道,用上方治疗乙型肝炎病毒血清阳性者128例,其中HBsAg阴转22例,占17.8%,HBeAg阴转60例,占57.6%,治疗前后比较有显著性差异<sup>[6]</sup>。

韩国汉阳大学病理学教研室发现,高丽参对急性乙型肝炎有特殊的治疗效果。把54名急性乙型肝炎患者分成两组,让24人服用一般药物,另30人服药同时每次服用高丽参粉末5g。结果,用高丽参的患者血清中碱性磷酸酶恢复到正常值比其他患者早6~8周,转氨酶恢复正常要早2~3周。又据报道,口服人参浸膏对传染性肝炎有治疗作用,可加速肝功能恢复,减少转入慢性肝炎的可能性。

## 六、治疗心脏病

方一:红参粉胶囊(采用吉林省安图县两江镇人参场生产加工的6年红参,每粒含生药0.4g),每天15粒,分3次口服。单独使用或与地高辛0.25mg/天,联合口服。

丁大植等用上方,分别治疗按NYHA分类选择的心功能Ⅳ级患者各15例,15天为1疗程。结果提示红参对充血性心力衰竭的疗效与地高辛相仿,对心衰有效而无副作用,与地高辛有协同作用<sup>[7]</sup>。

方二:参附注射液由人参、附子组成,首次给20ml,静脉注射,3分钟内注射完毕,若心率未转复,30分钟后重复注射40ml,3分钟内注射完毕。可配合吸氧等对症处理。

王卫星等用上方治疗室上性心动过速13例,结果全部恢复窦性心律,平均转律时间为9.2分钟,转律后心率60~68次/分,未见不良反应<sup>[8]</sup>。

另据报道,用参附针对20例急性左心衰伴快速型心律失常患者的治疗提示:可使心律失常明显减慢,对血压的变化亦具有双向调节作用<sup>[9]</sup>。

方三:通补口服液(人参叶、女贞子、酒大黄等)每次20ml,每毫升含生药0.8g,每日3次。

魏汉林等用上方治疗肺心病急性发作期24例,结果显效16例(66.67%),好转6例,无效2例<sup>[10]</sup>。

方四:参附补心丸(由人参、附子、大黄等组成),每丸重3g,口服每日3次,每次2丸,2周~2个月一疗程。

马连珍等用上方治疗慢性心功能不全245例。结果其中冠心病合并心功能不全者,有效率为95.6%;风心病合并心功能不全者有效率为90.6%;高心病合并心功能不全者有效率为90.5%;肺心病合并心功能不全者有效率为75%<sup>[11]</sup>。

人参用于危重症的急救。据报道,用独参汤抢救急性肾炎引起的重度心力衰竭患儿